

25 January 2018
EMA/PRAC/35599/2018
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Kliem ġdid tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn il-8-11 ta' Jannar 2018

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test sħiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab **hawnhekk** (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtuġħ.

1. Dulaglutide – Stenoži u ostruzzjoni gastrointestinali (EPI TT nru 18931)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi gastro-intestinali

Frekwenza "mhux magħrufa": Ostruzzjoni intestinali mhux mekkanika

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Frekwenza "mhux magħrufa"

Ostruzzjoni tal-imsaren - forma severa ta' stitikezza b'sintomi addizzjonal bħaal uqīgħ fl-istonku, nefha jew rimettar



2. Methotrexate – Emorraġja alveolari pulmonari (EPITT nru 18850)

2.1. Għal prodotti medicinali li fihom methotrexate b'indikazzjonijiet mhux onkologiċi

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Valutazzjoni tas-sistema respiratorja

Mistoqsijiet l-ill-pazjent fir-rigward tad-disfunzjonijiet pulmonari possibbli, jekk ikun hemm bżonn test tal-funzjoni tal-pulmun. Tista' sseħħi pulmonite akuta jew kronika interstizjali, ħafna drabi assoċjata ma' eosinofilija tad-demm, u ġew irrappurtati mwiet. Is-sintomi normalment jinkludu dispnea, sogħla (b'mod speċjali sogħla xotta mhux prodttiva), uġiġi toraċiku u deni li għalihom, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati f'kull viżta ta' segwitu. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati bir-riskji ta' pulmonite u għandhom jiġu avžati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom immedjatamente jekk jiżviluppaw sogħla persistenti jew dispnea persistenti.

Barra minn hekk, qiet irrapportata emorraġja alveolari pulmonari b'methotrexate użat f'indikazzjonijiet reumatoloġiċi u dawk relatati. Dan l-episodju jista' jkun assoċjat ukoll ma' vaskulite u ma' komorbiditajiet oħrajn Għandhom jiġu kkunsidrati investiqazzjonijiet fil-pront meta jkun hemm suspett ta' emorraġja alveolari pulmonari biex tikkonferma dijanjoži.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Mhux magħruf: Epistassi, Emorraġja alveolari pulmonari

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu [MTX]

Twissijiet u prekawzjonijiet

Fsada akuta mill-pulmuni f'pazjenti b'marda reumatoloġika bażi qiet irrapportata b'methotrexate. Jekk tesperjenza sintomi ta' li tobżoq jew tisqħol id-demm, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.

4.Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji serji

Jekk tesperjenza kwalunkwe wieħed mill-effetti sekondarji li ġejjin, ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatamente:

- infjammazzjoni tal-pulmuni (sintomi jistgħu jkunu mard ġenerali, sogħla xotta, irritanti, qtugħi ta' nifs, qtugħi ta' nifs hekk kif il-persuna tkun wieqfa, uġiġi fis-sider, jew deni)
- tobżoq jew tisqħol id-demm

L-effetti sekondarji li ġejjin ukoll ġew irrappurtati:

Frekwenza mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli): fsada fil-pulmuni

2.2. Għal prodotti medicinali li fihom methotrexate b'indikazzjonijiet onkoloġiči

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sistema respiratorja

Tista' sseħħi pulmonite akuta jew kronika interstizjali, ħafna drabi assoċjata ma' eosinofilija tad-demm, u ġew irrapprtati mwiet. Is-sintomi normalment jinkludu dispnea, sogħla (b'mod speċjali sogħla xotta mhux proġuttiva), uġiġi toraċiku u deni li għalihom, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati f'kull viżta ta' segwit. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati bir-riskji ta' pulmonite u għandhom jiġu avžati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom immedjatament jekk jiżviluppaw sogħla persistenti jew dispnea persistenti.

Barra minn hekk, qiet irrapportata emorraġja alveolari pulmonari b'methotrexate użat f'indikazzjonijiet reumatoloġiči u dawk relatati. Dan l-episodju jista' jkun assoċjat ukoll ma' vaskulite u ma' komorbiditajiet oħrajn. Għandhom jiġu kkunsidrati investigazzjonijiet fil-pront meta jkun hemm suspett ta' emorraġja alveolari pulmonari biex tikkonferma dijanjoži.

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu [MTX]

Twissijiet u prekawzjonijiet

Fsada akuta mill-pulmuni f'pazjenti b'marda reumatoloġika bażi qiet irrapportata b'methotrexate.

2.3. Għal prodotti medicinali li fihom methotrexate b'indikazzjonijiet kemm mhux onkoloġiči kif ukoll onkoloġiči

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sistema respiratorja

Tista' sseħħi pulmonite akuta jew kronika interstizjali, ħafna drabi assoċjata ma' eosinofilija tad-demm, u ġew irrapprtati mwiet. Is-sintomi normalment jinkludu dispnea, sogħla (b'mod speċjali sogħla xotta mhux proġuttiva), uġiġi toraċiku u deni li għalihom, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati f'kull viżta ta' segwit. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati bir-riskji ta' pulmonite u għandhom jiġu avžati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom immedjatament jekk jiżviluppaw sogħla persistenti jew dispnea persistenti.

Barra minn hekk, qiet irrapportata emorraġja alveolari pulmonari b'methotrexate użat f'indikazzjonijiet reumatoloġiči u dawk relatati. Dan l-episodju jista' jkun assoċjat ukoll ma' vaskulite u ma' komorbiditajiet oħrajn. Għandhom jiġu kkunsidrati investigazzjonijiet fil-pront meta jkun hemm suspett ta' emorraġja alveolari pulmonari biex tikkonferma dijanjoži.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Mhux magħruf: Epistassi, Emorraġja alveolari pulmonari*

*(ġiet irrapportata għal methotrexate użat f'indikazzjonijiet reumatoloġiči u dawk relatati)

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu [MTX]

Twissijiet u prekawzjonijiet

Fsada akuta mill-pulmuni f'pazjenti b'marda reumatoloġika baži ġiet irrapportata b'methotrexate. Jekk tesperjenza sintomi ta' li tobżoq jew tisqħol id-demm, qħandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.

4. Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji serji

Jekk tesperjenza kwalunkwe wieħed mill-effetti sekondarji li ġejjin, ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament:

- infjammazzjoni tal-pulmuni (sintomi jistgħu jkunu mard ġenerali, sogħla xotta, irritanti, qtugħi ta' nifs, qtugħi ta' nifs hekk kif il-persuna tkun wieqfa, uġiġi fis-sider, jew deni)
- tobżoq jew tisqħol id-demm*

*(ġiet irrapportata għal methotrexate użat f'pazjenti b'marda reumatoloġika baži)

L-effetti sekondarji li ġejjin ukoll ġew irrapprtati:

Frekwenza mhux maġħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli): fsada fil-pulmuni*

*(ġiet irrapportata għal methotrexate użat f'pazjenti b'marda reumatoloġika baži).

3. Pemetrexed – Insipidus ta' dijabete nefroġenika (EPITT nru 18930)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Episodji renali serji, inkluż indeboliment renali akut, ġew irrapportati b'pemetrexed waħdu jew f'assoċjazzjoni ma' sustanzi kemoterapewtiċi oħra. Hafna mill-pazjenti li fihom seħħew dawn l-episodji kellhom fatturi ta' riskju baži għall-iżvilupp ta' episodji renali inkluż deidratazzjoni jew pressjoni għolja pre-eżistenti jew dijabete. Insipidus tad-dijabete nefroġenika u nekroži tubulari renali ġew irrapportati wkoll f'ambjent ta' wara t-tqeġħid fis-suq bi pemetrexed waħdu jew ma' sustanzi kemoterapewtiċi oħra. Hafna minn dawn l-episodji għaddew hekk kif pemetrexed ġie rtirat. Il-pazjenti qħandhom jiġu mmonitorjati regolarment għal nekroži tubulari akuta, funzjoni renali indebolita u sinjal u sintomi ta' insipidus tad-dijabete nefroġenika (eż. ipernatremija).

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Kažijiet mhux komuni ta' indeboliment renali akut ġew irrapportati b'pemetrexed waħdu jew f'assoċjazzjoni ma' sustanzi kemoterapewtiċi oħra (ara sejjon 4.4). Insipidus tad-dijabete

nefroġenika u nekroži tubulari renali ġew irrapportati f'ambient ta' wara t-tqeħħid fis-suq bi frekwenza mhux magħrufa.

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Mhux magħruf: ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

Żieda fl-ammont ta' produzzjoni ta' awrina

Għatx u żieda fil-konsum tal-ilma

Ipernatremija - żieda fl-ammont ta' sodju fid-demm