

31 May 2021<sup>1</sup>  
EMA/PRAC/275355/2021 Corr<sup>2</sup>  
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

## Kliem ġodda tal-informazzjoni dwar il-prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn it-3-6 ta' Mejju 2021

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab **hawnhekk** (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżidied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħ.

### 1. Alemtuzumab – Sarkojdoži (EPITT nru 19638)

#### Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Awtōimmunità

[...] Kundizzonijiet awtoimmuni rrappurtati, jinkludu disturbi fit-tirojde, purpura tromboċitopenika immuni (*Immune Thrombocytopenic Purpura - ITP*), nefropatiji (eż. marda tal-membrana basement antiglomerulari), epatite awtoimmuni (*Autoimmune Hepatitis - AIH*), emofilja A akkwiżita, u sarkojdoži [...]

[...]

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fis-sistema immuni

Frekwenza mhux komuni: Sarkojdoži

<sup>1</sup> Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).

<sup>2</sup> Section 4.4 of the summary of product characteristics for clindamycin was revised by PRAC on 22 July 2021 (see page 2).



## Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata LEMTRADA

[...]

- **Kundizzjonijiet awtoimmuni**

[...]

o Sarkoħdoži

Kien hemm rapporti ta' disturb fis-sistema immuni (sarkoħdoži) f'pazjenti ttrattati b'LEMTRADA. Is-sintomi jistgħu jinkludu soġħla xotta persistenti, qtugħ ta' nifs, uqigh fis-sider, deni, nefha fil-limfonodi, telf fil-piż, raxx tal-ċilda, u vista mċajpra.

[...]

4. Effetti sekondarji possibbi

[...]

L-effetti sekondarji l-aktar importanti huma l-kundizzjonijiet awtoimmuni deskritti fis-sezzjoni 2 li jinkludu:

[...]

- Sarkoħdozi (mhux komuni - tista' taffettwa sa persuna waħda minn kull 100) Is-sintomi jistgħu jinkludu soġħla xotta persistenti, qtugħ ta' nifs, uqigh fis-sider, deni, nefha fil-limfonodi, telf fil-piż, raxx tal-ċilda, u vista mċajpra.

[...]

Dawn huma l-**effetti sekondarji** li tista' tesperjenza:

**Mhux komuni** (jistgħu jaffettaww sa persuna 1 minn kull 100)

- Sarkoħdoži
- [...]

## 2. Clindamycin għall-użu sistemiku – Insuffiċjenza akuta fil-kliewi (EPITT nru 19647)

### Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu<sup>3</sup>

Jekk it-terapija tiġi mtawla, għandhom jitwettqu testijiet dwar il-funzjonijiet tal-fwied u tal-kliewi.

Koriment akut fil-kliewi, inkluż insuffiċjenza akuta fil-kliewi, ġie irrapportat b'mod mhux frekwenti. F'pazjenti li jsofru minn disfunzjoni fil-kliewi eżistenti minn qabel jew li jkunu qiegħdin jieħdu medicini tosċiċi għall-kliewi fl-istess hin, qħandu jiġi kkunsidrat il-monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 4.8).

<sup>3</sup> Section 4.4 was revised by PRAC on 22 July 2021.

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

##### Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Frekwenza "mhux magħruf": Koriment akut fil-kliewi

# Ara sezzjoni 4.4

##### **Fuljett ta' tagħrif**

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>

Twissijiet u prekawzjonijiet

Jista' jkun hemm disturbi akuti fil-kliewi. Jekk jogħġibok informa lit-tabib tiegħek dwar xi medicina li qed tieħu u jekk għandek xi problemi eżistenti fil-kliewi. Jekk tesperjenza tnaqqis fil-produzzjoni tal-awrina, żamma ta' fluwidi li tikkawża nefha f'rīglejk, fl-qħekiesi jew f'saqajk, qtugħi ta' nifs, jew dardir għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.

#### 4. Effetti sekondarji possibbli

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiżviluppa:

- żamma ta' fluwidi li tikkawża nefha f'rīglejk, fl-qħekiesi jew f'saqajk, qtugħi ta' nifs jew dardir

### **3. Vaċċin mRNA<sup>4</sup> kontra I-COVID-19 (nucleoside-modified) (Comirnaty) – Nefha lokalizzata f'persuni li kellhom storja ta' injezzjonijiet ta' filler dermali (EPITT nru 19674)**

##### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Mhux magħruf: Nefha fil-wiċċ\*

\*Giet irrapportata nefha fil-wiċċ f'persuni bi storja ta' injezzjonijiet ta' filler dermali li ngħataw il-vaċċin fil-faži ta' wara t-tqegħid fis-suq.

##### **Fuljett ta' tagħrif**

#### 4. Effetti sekondarji possibbli

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

Nefha fil-wiċċ (neħha fil-wiċċ tista' sseħħi f'pazjenti li kellhom fillers dermali tal-wiċċ)

---

<sup>4</sup>aċċidu ribonuklejku messaġġier

## **4. Secukinumab – Henoch-Schonlein purpura (EPITT nru 19640)**

### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

#### **4.8. Effetti mhux mixtieqa**

Sistema tal-Klassifika tal-Organji	Frekwenza	Reazzjoni avversa
Disturbi fil-Ġilda u fit-Tessut ta' Taħt il-Ġilda	Rari	<u>Vaskulite ipersensittiva</u>

### **Fuljett ta' tagħrif**

#### **4. Effetti sekondarji possibbli**

Effetti sekondarji oħra

Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1,000)

Infjammazzjoni ta' važi żgħar, li tista' twassal għal raxx fil-ġilda b'boċċi żgħar ħomor jew vjola (vaskulite)

## **5. Sulfamethoxazole, trimethoprim (co-trimoxazole) – Sindromu ta' diffikultà respiratorja akuta (Acute respiratory distress syndrome - ARDS) (EPITT nru 19625)**

Dawn il-kliem jaapplikaw għall-prodotti mediciinali kollha li fihom co-trimoxazole. Jekk ikun hemm referenza għall-infiltrazzjoni tal-pulmun jew tossiċità respiratorja diġà inkluża fis-sezzjoni 4.4, ir-rakkomandazzjoni proposta dwar l-ARDS għandha tieħu post il-kliem li hemm fis-seħħi attwalment. Listess jaapplika għall-fuljett ta' tagħrif.

### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

#### **4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu**

##### Tossiċità respiratorja

Każjiet rari ħafna u severi ta' tossiċità respiratorja, li kultant iwasslu qħas-Sindrom ta' Diffikultà Respiratorja Akuta (Acute respiratory distress syndrome - ARDS), qew irrapportati matul trattament b'co-trimoxazole. Il-bidu ta' sinjal pulmonari bħal soġħla, deni, u qtugħi ta' nifs b'rabbta ma' sinjalir radjoloġici ta' infiltrati pulmonari, u deterjorazzjoni fil-funzjoni pulmonari jistgħu jkunu sinjalir preliminari ta' ARDS. F'ċirkostanzi bħal dawn, co-trimoxazole għandu jitwaqqaf u jingħata t-trattament meħtieġ.

### **Fuljett ta' tagħrif**

#### **2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>**

Twissijiet u prekawzjonijiet

Jekk tiżviluppa aggravar mhux mistenni tas-soġħla u qtugħi ta' nifs, informa lit-tabib tiegħek mill-ewwel.

## **6. Sulfamethoxazole, trimethoprim (co-trimoxazole) – Limfoistjocitoži emofagoċitika (EPITT nru 19655)**

### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

#### Limfoistjocitoži emofagoċitika (*Haemophagocytic lymphohistiocytosis - HLH*)

Każijiet ta' HLH ġew irrapportati b'mod rari ħafna f'pazjenti ttrattai b'co-trimoxazole. HLH huwa sindromu ta' periklu għall-ħajja tal-attivazzjoni immuni patoloġika kkaratterizzata minn sinjalji u sintomi kliniči ta' infjammazzjoni sistemika eċċessiva (eż. deni, epatosplenomegalija, ipertrigliceridemija, ipofibrinoġenemija, livell għoli fis-serum tal-ferritin, cītopenji u emofagoċitoži). Pazjenti li jiżviluppaw manifestazzjonijiet bikrin ta' attivazzjoni immuni patoloġika għandhom jiġu evalwati minnufih. Jekk tiġi stabilita dijanjoži ta' HLH, it-trattament b'co-trimoxazole għandu jitwaqqaf.

### **Fuljett ta' tagħrif**

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>

Twissijiet u prekawzjonijiet

#### Limfoistjocitoži emofagoċitika

Kien hemm rapporti rari ħafna dwar reazzjonijiet immuni eċċessivi minħabba attivazzjoni mhux ikkontrollata ta' ċelloli bojod tad-demm li jwasslu qħal infjammazzjonijiet (limfoistjocitoži emofagoċitika), li jistgħu jkunu ta' periklu għall-ħajja jekk ma jiġu iddijanostikati u ttrattati kmieni. Jekk tesperjenza sintomi multipli bħal deni, glandoli minfuhi, thossok dgħajnejf, sturdament, qtugħi ta' nifs, tbenġil, jew raxx tal-ċilda fl-istess īn jew b'dewmien żgħir, ikkuntattja lit-tabib tieqħek minnufih.

## **7. Tramadol; tramadol, dexketoprofen; tramadol, paracetamol – Sindromu ta' serotonin (EPITT nru 19635)**

Minħabba d-differenzi fis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u l-Fuljetti ta' Tagħrif nazzjonali, huwa rikonoxxut li t-test ulterjuri li digħi jinsab fl-informazzjoni dwar il-prodott sejkollu jiġi mmodifikat/agġustat sabiex jakkomoda t-test il-ġdid li jinsab f'din ir-rakkmandazzjoni tal-PRAC.

### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

#### Sindromu ta' serotonin

Is-sindromu ta' serotonin, kundizzjoni li potenzjalment tista' tkun ta' periklu għall-ħajja, ġie rrappurtat f'pazjenti li kienu qed jirċievu tramadol flimkien ma' sustanzi serotonerġiċi oħra jew tramadol waħdu (ara sezzjonijiet 4.5, 4.8 u 4.9).

Jekk it-trattament konkomitanti ma' aġenti serotonerġiċi oħra jkun klinikament meħtieġ, hija rakkmandata osservazzjoni bir-reqqa tal-pazjent, b'mod partikolari waqt il-bidu tat-trattament u židiet fid-doża.

Is-sintomi tas-sindromu ta' serotonin jistgħu jinkludu bidliet fl-istatus mentali, instabbiltà awtonomika, anormalitajiet newromuskolari, u/jew sintomi gastrointestinali.

Jekk ikun hemm suspectt ta' sindromu ta' serotonin, qħandu jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża jew twaqqif tat-terapija, skont is-severità tas-sintomi. It-twaqqif tal-medicini serotonergici normalment iwassal għal titjib rapidu.

#### 4.5. Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

L-užu terapewtiku konkomitanti ta' tramadol u medicini serotonergici, bħal inibituri selettivi tal-assorbiment mill-ġdid ta' serotonin (SSRIs, *selective serotonin reuptake inhibitors*), inibituri tal-assorbiment mill-ġdid ta' serotonin-norepinephrine (SNRIs, *serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors*), inibituri ta' MAO (ara sezzjoni 4.3), antidepressanti triċikliċi u mirtazapine, jista' jikkawża tessiċċi tas-sindromu ta' serotonin, kundizzjoni li potenzjalment tista' tkun ta' periklu għall-ħajja (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8). Sindromu ta' serotonin huwa probabbli meta jiġi osservat wieħed minn dawn li ġejjin:

- Klonus spontanju
- Klonus inducibbi jew-okulari b'aġitazzjoni jew-djaforeżi
- Rogħda u iperriflessija
- Ipertermija u temperatura tal-ġisem > 38 °C u klonus inducibbi jew-okulari

It-twaqqif tal-medicini serotonergici normalment iwassal għal titjib rapidu. It-trattament jiddependi fuq it-tip u s-severità tas-sintomi.

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux magħruf: Sindromu ta' serotonin

#### 4.9. Doża eċċessiva

Gie rrappurtat ukoll is-sindromu ta' serotonin.

### Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu <isem il-prodott> jekk inti:

Tbat minn dipressjoni u qed tieħu l-antidipressanti peress li xi wħud minnhom jistgħu jinteraqixxu ma' tramadol (ara "Medicini oħra u <isem il-prodott>").

[...]

Hemm riskju żgħir li tista' tesperjenza l-hekk imsejja ġi sindromu ta' serotonin, li jista' jseħħi wara li tkun hadt tramadol flimkien ma' certi antidipressanti jew tramadol waħdu. Fittex parir mediku minnufih

jekk għandek kwalunkwe wieħed mis-sintomi relatati ma' dan is-sindromu serju (ara sezzjoni 4 "Effetti sekondarji possibbli").

Mediċini oħra u <isem il-prodott>

[...]

Ir-riskju ta' effetti sekondarji jiżdied,

[...]

- jekk qed tieħu čerti antidipressanti, <isem il-prodott> jista' jkollu interazzjoni ma' dawn il-mediċini u jista' jkollok is-sindromu ta' serotonin (ara sezzjoni 4 "Effetti sekondarji possibbli"). sintomi bħal kontrazzjonijiet involontarji u ritmiċi tal-muskoli, inkluži l-muskoli li jikkontrollaw il-moviment tal-ghajnejn, agitazzjoni, hruġ ta' għaraq eċċessiv, roghda, esaġerazzjoni tar-riflessi, żieda fit-tensioni tal-muskoli, temperatura tal-ġisem oħla minn 38°C.

#### 4. Effetti sekondarji possibbli

Mhux magħruf: ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

Is-sindromu ta' serotonin, li jista' jimmanifesta bħala bidliet fl-i-status mentali (eż. agitazzjoni, alluċinazzjonijiet, koma), u effetti oħrajn, bħal deni, żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb, pressjoni tad-demm instabbi, ċaqliq involontarju tal-muskoli, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea) (ara sezzjoni 2 "X'għandek tkun taf qabel ma tieħu <isem il-prodott>").