

| Številka (EU) dovoljenja za promet | (Izmišljeno) ime | Jakost | Farmacevtska oblika | Pot uporabe | Stična ovojnina | Vsebina (koncentracija) | Velikost pakiranja |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|
| EU/1/21/1612/001 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 1 napolnjena injekcijska brizga |
| EU/1/21/1612/002 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 1 napolnjena injekcijska brizga + 1 igla |
| EU/1/21/1612/003 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 10 napolnjenih injekcijskih brizg |
| EU/1/21/1612/004 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 10 napolnjenih injekcijskih brizg + 10 igel |
| EU/1/21/1612/005 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 50 napolnjenih injekcijskih brizg |
| EU/1/21/1612/006 | Prevenar 20 | -- ¹ | suspenzija za injiciranje | intramuskularna uporaba | napolnjena injekcijska brizga (steklo) | 0,5 ml | 50 napolnjenih injekcijskih brizg + 50 igel |

--¹ --²

En odmerek (0,5 ml) vsebuje:

| | |
|--|--------|
| pnevkokokni polisaharid serotip 1 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 3 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 4 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 5 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 6A ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 6B ^{1 2} | 4,4 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 7F ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 8 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 9V ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 10A ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 11A ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 12F ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 14 ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 15B ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 18C ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 19A ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 19F ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 22F ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 23F ^{1 2} | 2,2 µg |
| pnevkokokni polisaharid serotip 33F ^{1 2} | 2,2 µg |

¹ konjugiran na nosilno beljakovino CRM₁₉₇ (približno 51 µg na odmerek)

² adsorbiran na aluminijev fosfat (0,125 mg aluminija na odmerek)