

| <u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u> | <u>(Επινοηθείσα) ονομασία</u> | <u>Περιεκτικότητα</u> | <u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u> | <u>Οδός χορήγησης</u> | <u>Στοιχειώδης Συσκευασία</u> | <u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u> | <u>Συσκευασία</u> |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| EU/1/18/1340/001 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | Φιαλίδιο (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 1 φιαλίδιο + 1 σύριγγα + 2 βελόνες |
| EU/1/18/1340/002 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | Φιαλίδιο (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 2 (2 x 1) φιαλίδια + 2 (2 x 1) σύριγγες + 4 (2 x 2) βελόνες (πολυσυσκευασία) |
| EU/1/18/1340/003 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | Φιαλίδιο (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 6 (6 x 1) φιαλίδια + 6 (6 x 1) σύριγγες + 12 (6 x 2) βελόνες (πολυσυσκευασία) |
| EU/1/18/1340/004 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/18/1340/005 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 2 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/18/1340/006 | TAKHZYRO | 300 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 2 ml (150 mg/ml) | 6 (3 x 2) προγεμισμένες σύριγγες (πολυσυσκευασία) |
| EU/1/18/1340/007 | TAKHZYRO | 150 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 1 ml (150 mg/ml) | 1 προγεμισμένη σύριγγα |
| EU/1/18/1340/008 | TAKHZYRO | 150 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 1 ml (150 mg/ml) | 2 προγεμισμένες σύριγγες |
| EU/1/18/1340/009 | TAKHZYRO | 150 mg | Ενέσιμο διάλυμα | Υποδόρια χρήση | προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί) | 1 ml (150 mg/ml) | 6 (3 x 2) προγεμισμένες σύριγγες (πολυσυσκευασία) |