

<b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b>	<b><u>(Kereskedelmi) név</u></b>	<b><u>Hatáserősség</u></b>	<b><u>Gyógyszerforma</u></b>	<b><u>Az alkalmazás módja</u></b>	<b><u>Közvetlen csomagolás</u></b>	<b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b>	<b><u>Kiszerezés</u></b>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db injekciós üveg + 1 db fecskendő + 2 db tű
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db (2 x 1) injekciós üveg + 2 db (2 x 1) fecskendő + 4 db (2 x 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (6 x 1) injekciós üveg + 6 db (6 x 1) fecskendő + 12 db (6 x 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (3 x 2) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	1 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	Előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	6 db (3 x 2) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomagolás)