

<b><u>Numero AIC (UE)</u></b>	<b><u>Nome (di fantasia)</u></b>	<b><u>Dosaggio</u></b>	<b><u>Forma farmaceutica</u></b>	<b><u>Via di somministrazione</u></b>	<b><u>Confezionamento primario</u></b>	<b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b>	<b><u>Numero di unità posologiche</u></b>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	1 flaconcino + 1 siringa + 2 aghi
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	2 (2 X 1) flaconcini + 2 (2 X 1) siringhe + 4 (2 X 2) aghi (confezione multipla)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	6 (6 X 1) flaconcini + 6 (6 X 1) siringhe + 12 (6 X 2) aghi (confezione multipla)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	1 siringa preriempita
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	2 siringhe preriempite
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	2 mL (150 mg/mL)	6 (3 X 2) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	1 mL (150 mg/mL)	1 siringa preriempita
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	1 mL (150 mg/mL)	2 siringhe preriempite
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa preriempita (vetro)	1 mL (150 mg/mL)	6 (3 X 2) siringhe preriempite (confezione multipla)