

ANNEX I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni
PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni

Kull mL ta' soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)
sprej 1 (100 mikrolitru) fih 100 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)

Fliexken fihom:

0.95 mL (950 micrograms fentanyl) - Fliexkun b'2 sprejs
jew

1.55 mL (1.550 mikrogrammi ta' fentanyl – Fliexkun bi 8 sprejs

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni

Kull mL ta' soluzzjoni fih 4,000 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)
Sprej 1 (100 mikrolitru) fih 400 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)

Kull fliexkun fih 1.55 mL (6.200 mikrogrammi ta' fentanyl)

Eċċipjenti b'effett magħruf

Kull sprej fih 0.02 mg ta' propyl parahydroxybenzoate (E216).

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Sprej għall-immieher, soluzzjoni (sprej nażali)

Soluzzjoni akweja, minn ċara sa prattikament ċara u mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

PecFent huwa indikat għall-immuniġġjar ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda (*breakthrough pain* - BTP) f'adulti li diġà qed jirċievu terapija ta' manteniment bl-opjojdi għal uġiġh kroniku tal-kanċer. Uġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda hu aggravament temporanju ta' wġiġh li jseħh fi sfond ta' uġiġh persistenti li jkun ikkontrollat b'xi mod ieħor.

Pazjenti li jkunu qed jirċievu terapija ta' manteniment bl-opjojdi huma dawk li jkunu qed jieħdu mill-inqas 60 mg ta' morfina orali kuljum, mill-inqas 25 mikrogramma ta' fentanyl li jgħaddi minn ġol-ġilda kull siegħa, mill-inqas 30 mg ta' oxycodone kuljum, mill-inqas 8 mg ta' hydromorphone orali kuljum jew doża ekwianalġesika ta' opjojd ieħor għal ġimġha jew aktar.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda minn, u titkompli taħt is-supervizjoni ta' tabib li għandu esperjenza fl-immuniġġjar ta' terapija bl-opjojdi f'pazjenti bil-kanċer. It-tobba għandhom jzommu f'moħħhom il-potenzjal għal abbuż ta' fentanyl.

Požoloġija

PecFent għandu jiġi ttitrat għal doża “effettiva” li tipprovdi analġesija adegwata u timminimizza reazzjonijiet avversi mingħajr ma tikkawża reazzjonijiet avversi eċċessivi (jew intollerabbli), għal żewġ episodji ta’ BTP kkurati konsekuttivament. L-effikaċja ta’ doża mogħtija għandha tiġi evalwata fuq il-perjodu ta’ 30 minuta ta’ wara.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa sakemm tintlaħaq doża effettiva.

PecFent hu disponibbli f’żewġ qawwiet: 100 mikrogramma/sprej u 400 mikrogramma/sprej.

Doża waħda ta’ PecFent tista’ tinkludi l-għoti ta’ sprej 1 (doži ta’ 100 mikrogramma jew 400 mikrogramma) jew 2 sprejs (doži ta’ 200 mikrogramma jew 800 mikrogramma) tal-istess qawwa (jew qawwa ta’ 100 mikrogramma jew qawwa ta’ 400 mikrogramma).

Il-pazjenti m’għandhomx jużaw iktar minn 4 doži kuljum. Il-pazjenti għandhom jistennu mill-inqas 4 sigħat wara li jieħdu doża qabel ma jikkuraw episodju ieħor ta’ BTP b’PecFent.

PecFent jista’ jforni doži ta’ 100, 200, 400 u 800 mikrogrammi kif ġej:

Doża meħtieġa (mikrogrammi)	Qawwa tal-prodott (mikrogrammi)	Ammont
100	100	Sprej wieħed f’minfes wieħed
200	100	Sprej wieħed f’kull minfes
400	400	Sprej wieħed f’minfes wieħed
800	400	Sprej wieħed f’kull minfes

Doża tal-bidu

- Id-doża tal-bidu ta’ PecFent għall-kura ta’ episodji ta’ BTP hi dejjem ta’ 100 mikrogramma (sprej wieħed), anki f’pazjenti li jaqilbu minn prodotti oħrajn li jkun fihom fentanyl għal BTP tagħhom.
- Il-pazjent irid jistenna mill-inqas 4 sigħat qabel ma jikkura episodju ieħor ta’ BTP b’PecFent.

Metodu ta’ titrazzjoni

- Il-pazjenti għandhom jingħataw riċetta ta’ provvista ta’ titrazzjoni inizjali ta’ titrazzjoni provvista ta’ flixxun wieħed (2 sprejs jew 8 sprejs) ta’ PecFent 100 mikrogramma/sprej.
- Pazjenti li d-doża tal-bidu tagħhom tkun ta’ 100 mikrogramma u li jeħtieġu li jittitraw għal doża oġhla minhabba nuqqas ta’ effett jistgħu jingħataw parir biex jużaw żewġ sprejs ta’ 100 mikrogramma (wieħed f’kull minfes) għall-episodju li jmiss ta’ BTP. Jekk din id-doża ma tirnexxix, il-pazjent jista’ jingħata riċetta għal flixxun ta’ PecFent 400 mikrogramma/sprej u jingħata parir biex jaqleb għal sprej wieħed ta’ 400 mikrogramma għall-episodju ta’ wġiġh li jkun imiss. Jekk din id-doża ma tirnexxix, il-pazjent jista’ jingħata parir biex iżid id-doża għal żewġ sprejs ta’ 400 mikrogramma (wieħed f’kull minfes).
- Mill-bidu tal-kura, il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib u d-doża tiġi ttitrata sakemm tintlaħaq doża effettiva u tiġi kkonfermata għal żewġ episodji ta’ BTP kkurati konsekuttivament.

Titrazzjoni f’pazjenti li jkunu qed jaqilbu bejn prodotti li jkun fihom fentanyl li jerħu b’mod immedjat
Jista’ jkun hemm differenzi sostanzjali fil-profil farmakokinetiku ta’ prodotti mediċinali b’fentanyl li jerħu b’mod immedjat, li jirriżultaw f’ differenzi klinikament importanti fir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ fentanyl. Għalhekk, meta jkunu qed jaqilbu bejn prodotti mediċinali b’fentanyl indikati għal kura ta’ wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda, li jinkludi formulazzjonijiet intranażali, hu essenzjali li l-pazjenti jiġu ttitrati mill-ġdid bil-prodott mediċinali l-ġdid, u mhux jaqilbu fuq bażi ta’ doża b’doża (mikrogramma b’mikrogramma).

Terapija ta' manteniment

Ġaladarba tkun giet stabbilita doża effettiva waqt it-tirazzjoni, il-pazjent għandu jkompli jieħu din id-doża sa massimu ta' 4 doži kuljum.

Aġġustament mill-ġdid tad-doża

Ġeneralment, id-doża ta' manteniment ta' PecFent għandha tiżdied biss fejn id-doża kurrenti ma jirnexx ilhiex tikkura b'mod adegwat il-BTP għal diversi episodji konsekuttivi.

Evalwazzjoni tad-doża tat-terapija bl-opjojdi fl-isfond tista' tkun meħtieġa jekk il-pazjenti jkollhom b'mod konsistenti iktar minn erba' episodji ta' BTP kull 24 siegħa.

Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġħ, il-possibbiltà ta' iperalġeżija, it-tolleranza u l-progressjoni tal-marda sottostanti għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjoni 4.4).

Jekk ir-reazzjonijiet avversi ikunu intollerabbli jew persistenti, id-doża għandha titnaqqas jew il-kura b'PecFent tinbidel b'analġesiku ieħor.

Tul u għanijiet tat-trattament

Qabel ma jinbeda t-trattament b'PecFent, għandu jkun hemm qbil dwar strateġija ta' trattament inkluż it-tul tat-trattament u l-għanijiet tat-trattament, u pjan għat-tmim tat-trattament, flimkien mal-pazjent, f'konformità mal-linji gwida għall-ġestjoni tal-uġiġħ. Waqt it-trattament, għandu jkun hemm kuntatt frekwenti bejn it-tabib u l-pazjent sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' trattament kontinwu, jiġi kkunsidrat it-twaqqif u jiġu aġġustati d-dożaġġi jekk ikun meħtieġ. Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġħ, għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' iperalġeżija, tolleranza u progressjoni tal-marda sottostanti (ara sezzjoni 4.4). PecFent m'għandux jintuza għal aktar żmien milli meħtieġ.

It-twaqqif tal-kura

PecFent għandu jitwaqqaf immedjatament jekk il-pazjent ma jkollux iżjed episodji ta' uġiġħ temporanju li jseħħ għal għarrieda. Il-kura għal uġiġħ persistenti fl-isfond għandha tinzamm skont kif ingħatat ir-riċetta.

Jekk it-twaqqif tat-terapija tal-opjojdi kollha jkun meħtieġ, il-pazjent għandu jiġi segwit mit-tabib, għax tirazzjoni gradwali 'l isfel tat-terapija bl-opjojdi hi meħtieġa sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta' effetti ta' twaqqif f'daqqa meta tieqaf tieħu l-medicina.

Popolazzjonijiet speċjali

Persuni anzjani (li għandhom iktar minn 65 sena)

Fil-programm ta' provi klinici b'PecFent, 104 (26.1%) tal-pazjenti kellhom iktar minn 60 sena, 67 (16.8%) kellhom iktar minn 65 sena u 15 (3.8%) iktar minn 75 sena. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li pazjenti aktar anzjani kellhom tendenza li jittitraw għal doži iktar baxxi jew kellhom iktar reazzjonijiet avversi. Madankollu, minħabba l-importanza tal-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied fil-metabolizmu u fit-tneħħija ta' fentanyl, għandu jkun hemm attenzjoni addizzjonali fl-użu ta' PecFent f'persuni anzjani. M'hemmx dejta disponibbli dwar il-farmakokinetika ta' PecFent.

Indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi

PecFent għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment moderat jew sever tal-fwied jew tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' PecFent fit-tfal u adolexxenti li jkollhom inqas minn 18-il sena ma għewx determinati s'issa.

M'hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta' kif għandu jingħata

PecFent hu għall-użu fl-immieħer biss.

Il-flixxkun għandu jitneħħa mill-kontenitur rezistenti għat-tfal immedjatement qabel ma jintuża u l-għatu protettiv jitneħħa. Il-flixxkun jrid jiġi pprajmjat qabel l-ewwel użu billi żżommu jħares 'il fuq u sempliċement tagħfas u terhi l-finger grips fuq kull naħa tan-nozzle sakemm tidher bar ħadra fil-counting window (dan għandu jseħħ wara erba' sprejs).

Flixxkun b'2 sprejs:

Il-flixxkun b'2 sprejs ma jistax jerga' jiġi pprajmjat u ladarba ż-żewġ dozi jintużaw, jew jekk ikunu għaddew aktar minn 5 ijiem minn meta jkun sar il-prajming, il-flixxkun u l-kontenut għandhom jintremew kif deskritt fis-sezzjoni 6.6.

Flixxkun bi 8 sprejs:

Jekk il-prodott ma jkunx intuża għal 5 ijiem, għandu jerga' jiġi pprajmjat billi tisprejja darba. Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikteb id-data tal-ewwel użu fl-ispazju pprovdut fuq it-tikketta tal-kontenitur rezistenti għat-tfal.

Biex tagħti PecFent, iż-żennuna titpoġġa distanza qasira (madwar 1 ċm) għol-minfes u ppuntata ftit lejn il-bridge tal-imnieher. Imbagħad jingħata sprej billi tagħfas u terhi l-finger grips fuq kull naħa taż-żennuna. Ser jinstema' klikk u n-numru li jidher fil-counter ser jiżdied b'wieħed.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jistgħu ma jhossux l-isprej li jkun qed jingħata, u li għalhekk, huma għandhom jiddependu fuq il-klikk li jinstema' u n-numru fuq il-counter li jkun qed jiżdied biex jikkonfermaw li l-isprej ikun ġie fornut.

Il-qtar tal-isprej ta' PecFent jiffurmaw ġel għol-imnieher. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jnaddfux imneħhirhom immedjatement wara l-għoti ta' PecFent.

L-għatu protettiv għandu jitpoġġa lura f'postu wara kull użu u l-flixxkun jitpoġġa fil-kontenitur rezistenti għat-tfal għal hażna mingħajr periklu.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti mingħajr terapija ta' manteniment b'opiojdi minħabba li hemm riskju miżjud ta' depressjoni respiratorja.

Tnaqqis respiratorju sever jew kundizzjonijiet ostruttivi severi fil-pulmun.

Kura ta' uġiġħ akut minbarra uġiġħ li jinħass.

Pazjenti li qed jingħataw kura bi prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minħabba r-riskji, inkluż l-eżitu fatali, assoċjati ma' esponiment aċċidentali, użu hażin, u abbuż, il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu avżati biex iżommu PecFent f'post sikur u sigur, mhux aċċessibbli minn oħrajn.

Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom jridu jingħataw parir li PecFent fih sustanza attiva f'ammont li jista' jkun fatali għal tifel/tifla.

Sabiex jiġu mminimizzati r-riskji ta' reazzjonijiet avversi marbuta mal-opjojdi u biex tiġi identifikata d-doża effettiva, hu essenzjali li l-pazjenti jiġu mmonitorjati mill-qrib minn persuni professjonali fil-qasam tas-saħħa matul il-proċess tat-titrazzjoni.

Hu importanti li l-kura b'opjojdi li jaġixxu għal żmien twil li tintuża biex tikkura l-uġiġħ persistenti ta' pazjent tkun giet stabbilita qabel ma tinbeda t-terapija b'PecFent.

Iperalġeżija

Bħal fil-każ ta' opjojdi oħrajn, fil-każ ta' kontroll insuffiċjenti tal-uġiġħ *b'risposta* għal żieda fid-doża ta' fentanyl, il-possibbiltà ta' iperalġeżija kkawżata mill-opjojdi għandha tiġi kkunsidrata. Jistgħu jiġu indikati t-tnaqqis fid-doża ta' fentanyl jew it-twaqqif tal-kura b'fentanyl jew reviżjoni tal-kura b'fentanyl.

Tnaqqis respiratorju

Hemm riskju ta' tnaqqis respiratorju klinikament sinifikanti assoċjat mal-użu ta' fentanyl. Pazjenti li jkollhom uġiġħ u li jirċievu terapija kronika bl-opjojdi, jiżviluppaw tolleranza għal tnaqqis respiratorju, u għaldaqstant ir-riskju ta' tnaqqis respiratorju f'dawn il-pazjenti jitnaqqas. L-użu fl-istess hin ta' mediċini li jnaqqsu l-attività tas-sistema nervuża ċentrali jista' jżid ir-riskju ta' tnaqqis respiratorju (ara sezzjoni 4.5).

Mard pulmonari kroniku

F'pazjenti b'mard pulmonari ostruttiv kroniku, fentanyl jista' jikkawża reazzjonijiet avversi aktar serji. F'dawn il-pazjenti, l-opjojdi jistgħu jnaqqsu l-impuls li wiehed jieħu n-nifs u jżidu r-reżistenza fil-passaġġ tan-nifs.

Żieda fil-pressjoni intrakranjali

PecFent għandu jingħata biss b'kawtela estrema f'pazjenti li jistgħu jkun partikularment suxxettibbli għall-effetti intrakranjali taż-żamma ta' CO₂, bħal dawk b'evidenza ta' żieda fil-pressjoni intrakranjali jew koxjenza indebolita. L-opjojdi jistgħu jaħbu l-kors kliniku ta' pazjenti b'feriti fir-ras u għandhom jintużaw biss jekk ikunu klinikament meħtieġa.

Mard kardijaku

Fentanyl jista' jipproduċi bradikardija. PecFent, għalhekk, għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkollhom bradiarritmija preċedenti jew diġà eżistenti.

Ħsara fil-funzjoni tal-fwied jew tal-kliewi

Flimkien ma' dan, PecFent għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. L-influenza ta' indeboliment tal-fwied u tal-kliewi fuq il-farmakokinetika tal-prodott mediċinali ma kinitx evalwata; madankollu, meta li jingħata minn ġol-vina, intwera li t-tneħħija ta' fentanyl tinbidel meta jkun hemm indeboliment tal-fwied u tal-kliewi minhabba tibdil fit-tneħħija metabolika u proteini tal-plażma. Għalhekk, għandha tingħata attenzjoni speċjali matul il-proċess ta' titrazzjoni f'pazjenti li jkollhom indeboliment moderat jew sever tal-fwied jew tal-kliewi.

Għandha tingħata konsiderazzjoni bir-reqqa lil pazjenti b'ipovolemija u pressjoni baxxa.

Tolleranza u disturb minhabba l-użu ta' opjojdi (abbuż u dipendenza)

It-tolleranza u d-dipendenza fiżika u/jew psikoloġika jistgħu jiżviluppaw wara l-ġhoti ripetut ta' opjojdi bħal fentanyl.

L-użu ripetut ta' PecFent jista' jwassal għal Disturb tal-Użu tal-Opjojdi (OUD - *Opioid Use Disorder*). Doża oġhla u tul itwal ta' trattament bl-opjojdi jistgħu jżidu r-riskju li tiżviluppa OUD. L-abbuż jew l-użu hażin ta' PecFent li jsir b'mod intenzjonali jista' jirriżulta f'doża eċċessiva u/jew mewt. Ir-riskju li wiehed jiżviluppa OUD huwa oġhla f'pazjenti bi storja personali jew tal-familja (ġenituri jew aħwa) ta' disturbi tal-użu ta' sustanzi (inkluż disturb tal-użu tal-alkoħol), f'utenti li attwalment jużaw it-tabakk jew f'pazjenti bi storja personali ta' disturbi oħra ta' saħħa mentali (eż. depressjoni maġġuri, ansjetà jew disturbi fil-personalità).

Qabel jinbeda t-trattament b'PecFent u matul it-trattament, għandu jintlahaq qbil dwar l-għanijiet tat-trattament u pjan ta' twaqqif (ara sezzjoni 4.2). Qabel u waqt it-trattament, il-pazjent għandu jiġi

infurmat ukoll dwar ir-riskji u s-sinjali ta' OUD. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk isehhu dawn is-sinjali.

Il-pazjenti jkunu jehtieġu monitoraġġ għal sinjali ta' mgħiba fejn qed ifittxu l-medicini (eż. jitolbu riċetti godda malajr wisq). Dan jinkludi li jiġu rreveduti l-opjojdi u l-medicini psikoattivi li jkunu qed jintużaw fl-istess hin (bħal benzodiazepines). Għal pazjenti b'sinjali u sintomi ta' OUD, għandha tiġi kkunsidrata konsulta ma' speċjalista tad-dipendenza.

L-atleti għandhom jiġu infurmati li l-kura b'fentanyl tista' twassal għal testijiet tad-doping b'riżultat pożittiv.

Sindrome tas-Serotonin

Hija rakkomandata kawtela meta PecFent jingħata fl-istess hin ma' prodotti medicinali li jaffettwaw is-sistemi tan-newrotrasmittituri serotoninergici.

L-iżvilupp ta' sindrome tas-serotonin li jista' jkun ta' periklu għall-hajja jista' jsehh bl-użu konkomitanti ta' prodotti medicinali serotoninergici bħall-Inibituri Selettivi tat-Tehid mill-Gdid tas-Serotonin (SSRIs) u l-Inibituri tat-Tehid mill-Gdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRIs), u ma' prodotti medicinali li jdgħajfu l-metaboliżmu tas-serotonin (inklużi l-Inibituri tal-Monoamine Oxidase [MAOIs]). Dan jista' jsehh fi hdan id-doża rakkomandata (ara sezzjoni 4.5).

Is-sindrome tas-serotonin jista' jinkludi bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), instabilità awtonomika (eż. takikardija, pressjoni tad-demem instabbli, ipertermija), abnormalitajiet newromuskolari (eż. iperrifleksija, nuqqas ta' koordinazzjoni, riġidità), u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea).

Jekk ikun issuspettat is-sindrome tas-serotonin, il-kura b'PecFent għandha titwaqqaf.

Mnejn jingħata

PecFent hu maħsub għall-użu fl-immieher biss, u m'għandux jingħata minn xi post ieħor. Minhabba l-proprietajiet fiziko-kimici ta' eċċipjenti inklużi fil-formulazzjoni, injezzjoni ġol-vini jew intra-arterjali trid tiġi evitata b'mod partikulari.

Kundizzjonijiet nażali

Jekk il-pazjent ikollu episodji rikorrenti ta' hruġ ta' demm mill-immieher jew skonfort jew nażali waqt li jkun qed jieħu PecFent, metodu alternattiv ta' għoti għal kura ta' wgiġh temporanju li jsehh għal għarrieda għandu jiġi kkunsidrat.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

L-opjojdi jistgħu jikkawżaw disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad, inklużi apnea tal-irqad ċentrali (CSA - *central sleep apnoea*) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. L-użu tal-opjojdi jżid ir-riskju ta' CSA b'mod li jiddependi mid-doża. F'pazjenti li jkollhom CSA, ikkunsidra li tnaqqas id-dożaġġ totali ta' opjojdi.

L-użu fl-istess hin ma' sedattivi

L-użu ta' PecFent flimkien ma' medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati jista' jirriżulta f'sedazzjoni, tnaqqis respiratorju, koma u mewt. Minhabba dawn ir-riskji, l-għoti ta' riċetta għal PecFent flimkien ma' dawn il-medicini sedattivi għandu jkun riservat għal pazjenti li m'għandhomx il-possibbiltà li jagħzlu kuri alternattivi. Jekk tittiehed deċizjoni biex PecFent jingħata fl-istess hin ma' medicini sedattivi, għandha tintuża l-inqas doża effettiva, u l-perjodu tal-kura għandu jkun qasir kemm jista' jkun.

Il-pazjenti għandhom jiġu segwiti b'attenzjoni għal sinjali u sintomi ta' tnaqqis respiratorju u sedazzjoni.

F'dan ir-rigward, huwa rakkomandat hafna li l-pazjenti u dawk li jieħdu hsiebbhom ikunu infurmati biex joqogħdu attenti għal dawn is-sintomi (ara sezzjoni 4.5).

Eċċipjenti ta' PecFent

PecFent fih propyl parahydroxybenzoate (E216). Propyl parahydroxybenzoate jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi (li jistgħu jittardjaw) u f'każijiet ta' eċċezzjoni, bronkospażmu (jekk il-prodott mediċinali ma jingħatax b'mod korrett).

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra u forom ohra ta' interazzjoni

L-użu ta' prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate fl-istess hin ma' fentanyl huwa kontraindikati (ara sezzjoni 4.3). Il-kura b'sodium oxybate għandha titwaqqaf qabel ma tinbeda l-kura b'PecFent.

Fentanyl jiġi metabolizzat primarjament permezz tas-sistema ta' isoenzimi ta' ċitokrom uman P450 3A4 (CYP3A4), għalhekk interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu meta PecFent jingħata fl-istess hin ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw l-attività ta' CYP3A4. L-għoti flimkien ma' prodotti mediċinali li jikkawgħunaw zieda fl-attività ta' 3A4, jista' jnaqqas l-effikaċja ta' PecFent. L-użu fl-istess hin ta' PecFent ma' inibituri qawwija ta' CYP3A4 (eż. ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, u nelfinavir) jew inibituri moderati ta' CYP3A4 (eż. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, meraq tal-grejpfrut, u verapamil), jista' jirriżulta f'zieda fil-koncentrazzjonijiet ta' fentanyl fil-plażma, li potenzjalment tista' tikkawża reazzjonijiet avversi serji tal-mediċina, li jinkludu tnaqqis respiratorju fatali. Pazjenti li jkunu qed jirċievu PecFent fl-istess hin ma' inibituri moderati jew qawwija ta' CYP3A4, għandhom jiġu mmonitorjati b'kawtela għal perjodu twil ta' zmien. It-tnaqqis fid-doża għandu jsir b'kawtela.

L-użu fl-istess hin ta' mediċini li jnaqqsu l-attività tas-sistema nervuża ċentrali, li jinkludu opjojdi oħrajn, sedattivi jew mediċini ipnotiċi, anestetiki ġenerali, phenothiazines, trunkwillanti, rilassanti tal-muskoli skelettriċi, gabapentinoids (gabapentin u pregabalin) antistamini sedattivi u alkoħol jistgħu jipproduċu effetti addizzjonali li jnaqqsu l-attività. L-użu ta' opjojdi fl-istess hin ma' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jżid ir-riskju ta' sedazzjoni, tnaqqis respiratorju, koma u mewt minħabba effetti addizzjonali li jnaqqsu l-attività tas-CNS. Għandha tintuża l-inqas doża effettiva tal-mediċini sedattivi u l-perjodu tal-użu fl-istess hin għandu jkun wieħed limitat (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali serotoninergici:

L-għoti fl-istess hin ta' fentanyl ma' prodott mediċinali serotoninergiku, bħal Inibitur Selettiv tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRI) jew Inibitur tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRI) jew Inibitur tal-Monoamine Oxidase (MAOI), jista' jżid ir-riskju tas-sindrome tas-serotonin, li hija kundizzjoni li tista' tkun ta' periklu għall-ħajja.

PecFent mhuwiex rakkomandat għall-użu f'pazjenti li rċievew Inibituri ta' Monoamine Oxidase (MAO) fl-14-il ġurnata ta' qabel minħabba li potenzjament sever u imprevedibbli minn inibituri ta' MAO ġie rrapportat b'analgeziċi opjojdi.

L-użu fl-istess hin ta' agonisti/antagonisti parzjali tal-opjojdi (eż. buprenorphine, nalbuphine jew pentazocine) mhuwiex rakkomandat. Għandhom affinità għolja għal riċetturi tal-opjojdi b'attività intrinsika relattivament baxxa u, għalhekk, parzjalment jantagonizzaw l-effett analġesiku ta' fentanyl u jistgħu jikkawgħunaw sintomi ta' meta wieħed jieqaf jieħu l-mediċina f'pazjenti dipendenti fuq l-opjojdi.

Intwera li l-użu fl-istess hin ta' oxymetazoline mogħti mill-immieher inaqqas l-assorbiment ta' PecFent (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, l-użu fl-istess hin ta' dikongestanti li jdejqu l-vini li jingħataw mill-immieher waqt it-tirazzjoni mhuwiex rakkomandat, għax dan jista' jwassal għal pazjenti li jittitraw għal doża li hi oghla minn dik meħtieġa. Il-kura ta' manteniment b'PecFent tista' wkoll tkun inqas effettiva f'pazjenti b'rinite meta tingħata fl-istess hin ma' dikongestant li jdejjaq il-vini. Jekk dan iseħħ, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu d-dikongestant tagħhom.

L-użu fl-istess hin ta' PecFent u prodotti mediċinali oħrajn (minbarra oxymetazoline) li jingħataw minn ġol-immieher ma ġiex evalwat fil-provi kliniċi. Kuri oħrajn mogħtija minn ġol-immieher għandhom jiġu evitati fi żmien 15-il minuta mid-dożaġġ b'PecFent.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu ta' fentanyl f'nisa tqal. Studji f'animali wrew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. PecFent m'għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun hemm bżonn ċar.

Wara kura fit-tul, fentanyl jista' jikkawża sintomi ta' meta wieħed jieqaf jieħu din il-mediċina fit-tarbija tat-twelid. Hu rakkomandat li fentanyl ma jintużax waqt l-uġiġħ tal-ħlas u l-ħlas (li jinkludi Ċesarja), għax fentanyl jgħaddi minn ġol-plaċenta u jista' jikkawża tnaqqis respiratorju fil-fetu. Jekk PecFent jingħata, antidot għat-tifel/tifla għandu jkun disponibbli fil-pront.

Treddigh

Fentanyl jiġi eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem u jista' jikkawża sedazzjoni u tnaqqis respiratorju fit-tarbija li tkun qed terda'. Fentanyl hu kontra-indikat waqt it-treddigh, u t-treddigh m'għandux jerga' jinbeda sa mill-inqas 5 ijiem wara l-aħħar għoti ta' fentanyl.

Fertilità

M'hemm l-ebda dejta klinika dwar l-effett ta' fentanyl fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Opjojdi analġesiċi jistgħu jindebolixxu l-hila mentali u/jew fiżika meħtieġa biex issuq jew thaddem makkinarju.

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew ihaddmu makkinarju jekk ikollhom ngħas, sturdament, jew disturb tal-vista jew reazzjonijiet avversi oħrajn li jistgħu jindebolixxu l-hila tagħhom li jsuqu jew ihaddmu makkinarju.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi tipiċi tal-opjojdi għandhom ikunu mistennija b'PecFent. B'mod frekwenti, dawn ser jieqfu jew jonqsu fl-intensità bit-tkomplija tal-użu tal-prodott mediċinali, hekk kif il-pazjent jiġi ttitrat għall-iktar doża adattata. Madankollu, l-iktar reazzjonijiet avversi serji huma tnaqqis respiratorju (li potenzjalment jwasslu għal apnea jew waqfien respiratorju), tnaqqis ċirkulatorju, pressjoni baxxa u xokk, u l-pazjenti kollha għandhom jiġu mmonitorjati għal dawn il-kundizzjonijiet.

L-istudji kliniċi ta' PecFent kienu maħsuba biex jevalwaw is-sigurtà u l-effikaċja fil-kura ta' BTP, u l-pazjenti kollha kienu wkoll fuq terapija bl-opjojdi fl-isfond, bħal morfina li tintreħa b'mod sostnut jew fentanyl li jgħaddi minn ġol-ġilda, għall-uġiġħ persistenti tagħhom. Għalhekk mhuwiex possibbli li wieħed jifred b'mod definittiv l-effetti ta' PecFent waħdu.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu irrapportati b'PecFent **u/jew komposti oħra li fihom fentanyl** waqt studji kliniċi u fl-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq (frekwenzi definiti bħala komuni ħafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1,000$ sa $< 1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1,000$); rari ħafna ($< 1/10,000$); mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli)).

	Komuni	Mhux komuni	Mhux maghruf
Infezzjonijiet u infestazzjonijiet		Pnewmonja Nazofaringite Faringite Rinite	
Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika		Newtropa	
Disturbi fis-sistema immunitarja		Sensittività eċċessiva	
Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni		Deidrazzjoni Iperglicemija Nuqqas ta' aptit Żieda fl-aptit	
Disturbi psikjatriċi	Dizorjentament.	Delirju Allucinazzjoni Stat ta' konfużjoni Dipressjoni Nuqqas ta' attenzjoni/disturbi ta' iperattività Ansjetà Burdata ewforika Nervożità	Insomnja Dipendenza fuq id-drogi (vizzju) Abbuż mid-droga
Disturbi fis-sistema nervuża	Indeboliment fis-sens tat-togħma Sturdament Ngħas Ugħigh ta' ras	Tintilef minn sensik Livell baxx ta' koxjenza Konvulżjoni Telf tas-sens tat-togħma Anosmija Indeboliment tal-memorja Parosmija Disturb fid-diskors Sedazzjoni Letargija Rogħda	
Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika		Mejt	
Disturbi fil-qalb		Ċijanosi	
Disturbi vaskulari		Insuffiċjenza kardjovaskulari Limfedema Pressjoni baxxa Fwawar jaħarqu	Fwawar

	Komuni	Mhux komuni	Mhux maghruf
Disturbi respiratorji, toraċi u medjastinali	Tinfaraġ Ħruġ ta' likwidu mill-imnieher Skonfort nażali (bħal "sensazzjoni ta' ħruq fl-imnieher")	Ostruzzjoni fin-naħa ta' fuq tal-pajp tan-nifs Ugħigh faringolaringeali Rinalġja Disturb fil-mukuża nażali Sogħla Dispnea Għatis Kongestjoni fin-naħa ta' fuq tal-apparat respiratorju Kongestjoni nażali Ipoestesija intranażali Irritazzjoni fil-gerżuma Postnasal drip Nixfa nażali	Waqfien respiratorju
Disturbi gastro-intestinali	Rimettar Nawseja Stitikezza	Perforazzjoni intestinali Peritonite Ipoestesija orali Parestesija orali Dijarea Dardir Ugħigh addominali Disturb fl-ilsien Ulċerazzjoni tal-ħalq Dispepsja Ħalq niexef	
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda	Ħakk tal-ġilda	Għaraq eċċessiv Urtikarja	
Disturbi muskolu-skelettriċi u tat-tessuti konnettivi		Artralġja Kontrazzjonijiet tal-muskoli	
Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja		Anurja Disurja Proteinurja Eżitazzjoni urinarja	
Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider		Emorragija vaġinali	
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata		Ugħigh mhux kardijaku fis-sider Astenja Tertir ta' bard Edema tal-wiċċ Edema periferali Disturb fil-mod kif timxi Deni Għeja kbira Telqa Għatx	Sindrome ta' meta titwaqqaf il-medicina* Sindromu ta' meta wiehed jiegħaf jiegħu l-medicina fit-trabi tat-twelid, tolleranza għall-medicina
Investigazzjonijiet		Tnaqqis fl-għadd tal-plejtlits Żieda fil-piż	

	Komuni	Mhux komuni	Mhux maghruf
Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta' xi procedura		Waqgħat Użu hażin tal-mediċina b'mod intenzjonali Żball fil-mediċina	

* Sintomi ta' meta wieħed iwaqqaf l-oppojdi bħal dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u għaraq ġew osservati b'fentanyl transmukożali

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Tolleranza

Tista' tiżviluppa tolleranza mal-użu ripetut.

Dipendenza fuq il-mediċina

L-użu ripetut ta' PecFent jista' jwassal għal dipendenza fuq il-mediċina, anki f'dozi terapewtiċi. Ir-riskju ta' dipendenza fuq il-mediċina jista' jvarja skont il-fatturi ta' riskju individwali tal-pazjent, id-dożagġ, u t-tul tat-trattament bl-oppojdi (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Is-sintomi ta' doża eċċessiva ta' fentanyl mogħti minn ġol-immieher huma mistennija li jkunu simili fin-natura tagħhom għal dawk ta' fentanyl mogħti ġol-vini u opjojdi oħrajn, u huma estensjoni tal-azzjonijiet farmakoloġiċi tiegħu, bl-iktar effett sinifikanti serju jkun dak ta' tnaqqis respiratorju. Huwa magħruf ukoll li sseħħ koma.

L-immaniġġjar immedjat ta' doża eċċessiva ta' opjojdi jinkludi li jiġi żgurat passaġġ tan-nifs mingħajr ostakoli, stimolazzjoni fiżika u verbali tal-pazjent, evalwazzjoni tal-livell ta' koxxjenza, stat ventilatorju u ċirkolatorju, u ventilazzjoni assistita (sapport ventilatorju) jekk meħtieġ.

Ġiet osservata wkoll lewkoencefalopatija tossika b'doża eċċessiva ta' fentanyl.

Għal kura ta' doża eċċessiva (bliġh aċċidentali) f'persuna li qatt ma ħadet opjojdi fil-passat, għandu jinkiseb aċċess ġol-vini, u naloxone jew antagonist oħrajn tal-opjojdi għandhom jintużaw kif klinikament indikat. It-tul ta' żmien ta' tnaqqis respiratorju wara doża eċċessiva jista' jkun itwal mill-effetti tal-azzjoni tal-antagonist tal-opjojdi (eż. il-half life ta' naloxone tvarja minn 30 sa 81 minuta) u l-għoti ripetut jista' jkun meħtieġ. Għal dettalji dwar użu bħal dan, is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott tal-antagonist tal-opjojd individwali għandu jiġi kkonsultat.

Għal kura ta' doża eċċessiva f'pazjenti li jkollhom kura ta' manteniment bl-opjojdi, għandu jinkiseb aċċess ġol-vini. L-użu prudenti ta' naloxone jew antagonist ieħor tal-opjojdi jista' jkun meħtieġ f'xi każijiet, iżda ġie assoċjat mar-riskju li jikkawża sindrome akut ta' meta wieħed jieqaf tiegħu l-mediċina.

Għandu jkun innutat li għalkemm żidiet statistikament sinifikanti fil-livell tas-C_{max} kienu osservati wata t-tieni doża ta' PecFent mogħtija jew siegħa jew sagħtejn wara d-doża tal-bidu, din iż-żieda mhijiex ikkunsidrata li hi kbira biżżejjed biex tissuggerixxi li akkumulazzjoni li hi klinikament ta' tħassib jew espożizzjoni eċċessiva ser isseħħ, u tipprovdi margni wiesgħa ta' sigurtà għall-intervall rakkomandat tad-doża ta' erba' sigħat.

Għalkemm ebusija tal-muskoli li tintferixxi mar-respirazzjoni ma ġietx osservata wara l-użu ta' PecFent, dan hu possibbli b'fentanyl u opjojdi oħrajn. Jekk isseħħ, għandha tiġi mmaniġġjata bl-użu

ta' ventilazzjoni assistita, minn antagonist tal-opjojdi, u bhala alternattiva finali, minn sustanza ta' mblukkar newromuskolari.

Kazijiet ta' respirazzjoni ta' Cheyne–Stokes ġew osservati f'każ ta' doża eċċessiva ta' fentanyl, partikolarment f'pazjenti bi storja ta' insuffiċjenza tal-qalb.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Analġesici; opjojdi, derivattivi ta' phenylpiperidine; Kodiċi ATC: N02AB03.

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Fentanyl hu analġesiku opjojd li jinteraġixxi fil-biċċa l-kbira tiegħu mar-riċettur- μ tal-opjojdi. L-azzjonijiet terapewtiċi primarji tiegħu huma analġesija u sedazzjoni. L-effetti farmakoloġiċi sekondarji huma tnaqqis respiratorju, bradikardija, ipotermija, stitikezza, mijosi, dipendenza fiżika u ewforija.

L-opjojdi jistgħu jinfluwenzaw l-assi ipotalamika-pitwitarja-adrenali jew -gonadali. Xi bidliet li jistgħu jiġu osservati jinkludu żieda tal-prolactin fis-serum, u tnaqqis ta' cortisol u testosterone fil-plażma. Sinjali u sintomi kliniċi jistgħu jidhru minn dawn il-bidliet ormonali.

Effetti farmakodinamiċi


Sar studju double-blind, li fih il-partecipanti ntgħażlu b'mod każwali, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip crossover, li fih 114-il pazjent li kellhom bhala medja minn 1 sa 4 episodji ta' wġiġh temporanju li jsehh għal għarrieda (BTP – break through pain) kuljum waqt li kienu qed jiehdur terapija ta' manteniment bil-opjojdi, ġew irregistrati f'fażi inizjali ta' titrazzjoni open-label sabiex tiġi identifikata doża effettiva ta' PecFent (Studju CP043). Il-pazjenti li jkunu ser jibdew il-fażi double-blind kienu kkurati sa 10 episodji ta' BTP jew b'PecFent (7 episodji) jew bi plaċebo (3 episodji) f'ordni każwali.

Mill-pazjenti li daħlu fil-fażi ta' titrazzjoni, 7 (6.1%) biss ma kinux kapaċi jiġu ttitrati għal doża effettiva minhabba n-nuqqas ta' effikaċja, u 6 (5.3%) irtiraw mill-istudju minhabba avvenimenti avversi.

Il-punt aħhari primarju kien il-paragun bejn it-total ta' differenza ta' intensità tal-uġiġh wara 30 minuta mid-dożaġġ (SPID₃₀), li kien 6.57 fl-episodji kkurati b'PecFent meta mqabbel ma' 4.45 għal plaċebo ($p < 0.0001$). L-SPID għal episodji kkurati b'PecFent kien ukoll differenti b'mod sinifikanti għal plaċebo wara 10, 15, 45 u 60 minuta wara l-ġhoti.

Il-medja tal-punteġġi tal-intensità tal-uġiġh (73 pazjent) għall-episodji kollha kkurati b'PecFent (459 episodji) meta mqabbla ma' dawg ikkurati bi plaċebo (200 episodju) kienu iktar baxxi b'mod sinifikanti wara 5, 10, 15, 30, 45 u 60 minuta wara l-ġhoti (ara Figura 1).


Figura 1: Medja (\pm SE) ta' Punteggi tal-Intensità tal-Ugigh f'Kull Punt ta' Hin (Popolazzjoni mITT)



Nota: Punteggi ta' Intensità tal-Ugigh (medja tal-medja tal-persuni) wara l-għoti ta' PecFent u Placebo
 * Tnaqqis sinifikanti kien osservat fl-alpha (livell ta' ≤ 0.05 bejn PecFent u Placebo f'dak il-punt ta' hin.
 ** Tnaqqis sinifikanti kien osservat fl-alpha (livell ta' ≤ 0.01 bejn PecFent u Placebo f'dak il-punt ta' hin.

L-effikaċja superjuri ta' PecFent fuq il-placebo kienet appoggjata minn dejta minn riżultati aħħarin sekondarja li jinkludu n-numru ta' episodji ta' BTP b'solliev minn ugigh klinikament sinifikanti, definit bhala t-tnaqqis fil-puntegg tal-intensità tal-ugigh ta' mill-inqas 2 (Figura 2).

Figura 2: Solliev minn Ugigh Klinikament Sinifikanti – PecFent vs placebo: % ta' Episodji ta' Pazjenti Bi Tnaqqis ta' ≥ 2 Punti fl-Intensità tal-Ugigh



** p=0.011 vs placebo
 *** p<0.0001 vs placebo

Fi studju double-blind, li fih il-partecipanti ntgħażlu b'mod każwali, ikkontrollat b'komparatur (Studju 044), li kien infassal bhal Studju 043 li twettaq fuq pazjenti tolleranti għall-opjojdi li kellhom ugigh temporanju tal-kanċer li jseħh għal għarrieda, li kienu fuq dozi stabbli ta' opjojdi skedati regolarment, intwera li PecFent kien superjuri għal morphine sulfat li jintreha b'mod immedjat (IRMS). Is-superjorità ntweriet mill-punt aħħari primarju, id-Differenza ta' Intensità tal-Ugigh fi żmien 15-

il minuta, li kienet ta' 3.02 f'pazjenti kkurati b'PecFent meta mqabbla ma' 2.69 f'pazjenti kkurati b'IRMS (p=0.0396).

Fi studju fit-tul, open-label, dwar is-sigurtà (Studju 045), 355 pazjent ipparteċipaw fil-fażi ta' kura ta' 16-il ġimgħa, li matulha 42,227 episodju ta' wġiġh temporanju tal-kanċer li seħħ għal għarrieda (BTP) kienu kkurati b'PecFent. Mija minn dawn il-pazjenti komplew il-kura sa 26 xahar f'fażi ta' estensjoni. Mit-355 pazjent ikkurati fil-fażi ta' kura open-label, 90% ma kellhom bżonn l-ebda zieda fid-doża.

Fl-istudju (CP043) li fih il-parteeipanti ntgħażlu b'mod każwali, ikkontrollat bi placebo, 9.4% ta' 459 episodji ta' BTP ikkurati b'PecFent fi 73 pazjent kienu jeħtieġu l-użu ta' xi prodotti mediċinali (ta' salvataġġ) addizzjonali fi żmien 60 minuta mid-dożaġġ. Matul l-istudju open-label (CP045) li sar fuq perjodu ta' żmien itwal dan kien ta' 6.0% minn 42,227 episodju fi 355 pazjent ikkurati b'PecFent matul sa 159 jum ta' kura.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Introduzzjoni ġenerali

Fentanyl hu lipofiliku ħafna u jistgħu jiġi assorbit malajr ħafna minn ġol-mukuża nażali u iktar bil-mod mir-rotta gastrointestinali. Hu sugġett għal metabolizmu first pass fil-fwied u intestinali u l-metaboliti ma jikkontribwixxux għall-effett terapewtiċi ta' fentanyl.

PecFent juża s-sistema ta' forniment nażali tal-mediċina PecSys biex jimmodula l-forniment u l-assorbiment ta' fentanyl. Is-sistema PecSys tippermetti li l-prodott jiġi sprejjet fiż-żona ta' quddiem tal-kavità nażali bħala raxx fin ta' qtar, li jsir ġel hekk kif imiss mal-joni tal-calcium li jkun hemm fil-mukuża nażali. Fentanyl jiġi diffuż mill-ġel u jiġi assorbit minn ġol-mukuża nażali; dan l-assorbiment ta' fentanyl immodulat mill-ġel, irażżan il-livell massimu ta' konċentrazzjoni fil-plażma (C_{max}), filwaqt li jippermetti l-kisba ta' hin bikri għal dak il-massimu (T_{max}).

Assorbiment

Fi studju farmakokinetiku li qabbel PecFent (100, 200, 400 u 800 mikrogramma) ma' fentanyl citrate orali transmukożali (OTFC, 200 mikrogramma), intwera li fentanyl ġie assorbit malajr wara l-ghoti ta' doża waħda intranażali ta' PecFent, b'medjan tat- T_{max} li varja minn 15 sa 21 minuta (T_{max} għal OTFC kien ta' madwar 90 minuta). Il-varjabilità tal-farmakokinetika ta' fentanyl kienet konsiderevoli wara l-kura kemm b'PecFent kif ukoll b'OTFC. Il-bijodisponibilità relattiva ta' fentanyl mill-kura b'PecFent meta mqabbla mal-OTFC ta' 200 mikrogramma kienet ta' madwar 120%.

Il-parametri farmakokinetiċi ewlenin huma muriġa fit-tabella li jmiss:


Parametri farmakokinetiċi f'persuni adulti li jkunu qed jirċievu PecFent u OTFC

Parametri farmakokinetiċi (medja (%CV))	PecFent				OTFC
	100 mikrogramma	200 mikrogramma	400 mikrogramma	800 mikrogramma	200 mikrogramma
T_{max} (siġhat)*	0.33 (0.08-1.50)	0.25 (0.17-1.60)	0.35 (0.25-0.75)	0.34 (0.17-3.00)	1.50 (0.50-8.00)
C_{max} (pg/mL)	351.5 (51.3)	780.8 (48.4)	1552.1 (26.2)	2844.0 (56.0)	317.4 (29.9)
AUC (pg.sieġha/mL)	2460.5 (17.9)	4359.9 (29.8)	7513.4 (26.7)	17272 (48.9)	3735.0 (32.8)
$t_{1/2}$ (sieġha)	21.9 (13.6)	24.9 (51.3)	15.0 (24.7)	24.9 (92.5)	18.6 (31.4)

*Dejta għat- T_{max} ippreżentata bħala medjan (medda).

Il-kurvi għal kull livell ta' doża huma simili fil-forma, b'livelli ta' doża li tiżdied jipproduċu livelli jiżdiedu ta' fentanyl fil-plażma. Il-proporzjonalità mad-doża ntweriet għas- C_{max} u ż-żona taħt il-kurva (AUC) fil-medda tad-doża ta' 100 mikrogramma sa 800 mikrogramma (ara Figura 3). Jekk wieħed jaqleb għal PecFent minn prodott ieħor li fih fentanyl għal BTP, hemm bżonn ta' titrazzjoni indipendenti mid-doża b'PecFent għax il-bijodisponibilità bejn il-prodotti tvarja b'mod sinifikanti.

Figura 3: Medja ta' konċentrazzjonijiet ta' fentanyl fil-plażma wara doži waħidhom ta' PecFent u OTFC f'persuni b'saħħithom



Twettaq studju farmakokinetiku biex jevalwa l-assorbiment u t-tollerabilità ta' doża waħda ta' PecFent f'pazjenti li kellhom rinite allergika staġjonali kkaġunata mill-polline, meta tqabblu l-istati unchallenged, l-istat challenged b'mod akut (riniktiku) u mbagħad ikkurat b'oxymetazoline.

Ma kien hemm kien l-ebda effett klinikament sinifikanti ta' rinite akuta fuq is- C_{max} , it- T_{max} jew l-espożizzjoni totali għal fentanyl, meta tqabblu l-istati unchallenged mal-istati challenged b'mod akut. Wara l-kura ta' stat rinitiku akut b'oxymetazoline, kien hemm tnaqqis fis- C_{max} u fl-espożizzjoni, u żidiet fit- T_{max} li kienu statistikament, u possibbilment klinikament, sinifikanti.

Distribuzzjoni

Fentanyl hu lipofiliku ħafna u hu ddistribwit tajjeb lil hemm mis-sistema vaskulari, b'volum apparenti kbir ta' distribuzzjoni. Dejta miksuba mill-animals wriet li, wara l-assorbiment, fentanyl jiġi ddistribwit malajr lill-moħħ, il-qalb, il-pulmun, il-kliewi u l-milsa, segwit minn distribuzzjoni mill-ġdid aktar bil-mod lil muskoli u xaħam.

It-twaħħil tal-proteini mal-plażma ta' fentanyl hu ta' 80 – 85%. Il-proteina ewlenija tat-twaħħil hi glikoproteina alpha-1-acid, iżda kemm l-albumina kif ukoll il-lipoproteini jikkontribwixxu b'xi mod. Il-porzjon hieles ta' fentanyl jiżidiet mal-aċidoži.

Bijotrasformazzjoni

Il-passaġġi metabolici wara l-ġhoti nażali ta' PecFent ma kinux ikkaratterizzati fl-istudji klinici. Fentanyl jiġi metabolizzat fil-fwied għal norfentanyl minn isoform ta' ċitokrom CYP3A4. Norfentanyl mhuwiex attiv farmakologikament fi studji li saru fuq l-animals. Iktar minn 90% minnu jiġi eliminat permezz ta' bijotrasformazzjoni għal N-dealkylated u hydroxylated metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Id-dispożizzjoni ta' fentanyl wara l-ġhoti intranażali ta' PecFent ma kinitx ikkaratterizzati fi studju dwar il-bilanċ tal-piż. Inqas minn 7% ta' doża mogħtija ta' fentanyl titnehħa mhux mibdula fl-awrina u

madwar 1% biss titneħħa mhux mibdula fl-ippurgar. Il-metaboliti jitneħħew primarjament fl-awrina, waqt li t-tneħħija fl-ippurgar hi inqas importanti.

It-tneħħija totali ta' fentanyl mill-plażma wara l-ghoti ġol-vini hi ta' madwar 42 L/sieġha.

Linearità/nuqqas ta' linearità

Il-proporzjonalità mad-doża ntweriet għal C_{max} u AUC fid-medda tad-doża ta' 100 mikrogramma sa 800 mikrogramma.

L-effett ta' indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta' PecFent ma ġiex studjat.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn doži ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta' kanċer, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji dwar it-tossiċità embrijo-fetali waqt l-iżvilupp li saru fuq il-firien u l-fniek ma żvelaw l-ebda malformazzjonijiet kkaġunati mill-kompost jew varjazzjonijiet waqt l-iżvilupp meta ngħataw matul il-perjodu ta' organogenezi.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp embrijoniku bikri li sar fuq il-firien, kien osservat effett medjat mill-irġiel f'doži għoljin (300 mcg/kg/jum, s.c.) u dan hu konsistenti mal-effetti sedattivi ta' fentanyl fi studji li saru fuq l-animali.

Fi studji dwar l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid li saru fuq il-firien, ir-rata ta' sopravivenza tal-frieħ tnaqqset b'mod sinifikanti f'doži li jikkawżaw tossiċità materna severa. Sejbiet addizzjonali f'doži li kienu tossiċi għall-omm fi frieħ F1, kienu dewmien fl-iżvilupp fiżiku, funzjonijiet sensorjali, riflessi u mġiba. Dawn l-effetti jistgħu jkunu jew effetti indiretti minħabba attenzjoni materna mibdula u/jew tnaqqis fir-rata ta' treddiġ jew effett dirett ta' fentanyl fuq il-frieħ.

Studji dwar ir-riskju ta' kanċer (bijoassaġġ alternattiv tal-ġilda li dam 26 ġimgħa fi ġrieden transġeniċi Tg.AC; studji dwar ir-riskju ta' kanċer taħt il-ġilda fuq il-firien li dam sentejn) b'fentanyl ma kkaġuna l-ebda sejbiet li jindikaw potenzjal onkoġeniku. Evalwazzjoni ta' slides tal-moħħ mill-istudju dwar il-karċinoġeniċità żvelat leżjonijiet fil-moħħ fl-animali li ngħataw doži għoljin ta' fentanyl citrate. Mhix magħrufa r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Pectin (E440)

Mannitol (E421)

Phenylethyl alcohol

Propyl parahydroxybenzoate (E216)

Sucrose

Hydrochloric acid 0.36% jew sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Flixkun b'2 sprejs:

18-il xahar

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

Flixxun bi 8 sprejs:

3 snin

Wara li jintuża għall-ewwel darba: 60 jum

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-hażna

Taħzinx f' temperatura 'l fuq minn 25 °C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-flixxun fil-kontenitur rezistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.

Aħżen il-flixxun fil-kontenitur rezistenti għat-tfal il-hin kollu, anki meta jispiċċa.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Flixxun (hġieg ċar ta' Tip I) mġhammar b' metering pump li tinkorpora dose counter li jinstema' u għatu protettiv (għatu abjad solidu għaż-2 sprejs u għatu translucidu għat-8 sprejs). F'kull każ, il-prodott jiġi ppakkjat f' kontenitur rezistenti għat-tfal qisu qoxra ta' arzella.

Fliexken fihom:

0.95 mL li jiżguraw l-għoti ta' 2 sprejs shaħ

jew

1.55 mL li jiżguraw l- għoti ta' 8 sprejs shaħ.

Il-fliexken fil-kontenituri tagħhom rezistenti għat-tfal huma fornuti f' kaxxi tal-kartun li jkun fihom:

Għal flixxun ta' 2 sprejs: flixxun wiehed

Għal flixxun ta' 8 sprejs: flixxun wiehed, 4 jew 12-il flixxun.

Jista' jkun li mhux il-preżentazzjonijiet jew il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Fliexken parzjalment użati ta' PecFent jista' jkun fihom biżżejjed medičina biex jagħmlu l-ħsara jew ikunu ta' periklu għall-ħajja għal tifel/tifla. Anki jekk ikun fadal ftit jew l-ebda medičina fil-flixxun, PecFent irid jintrema kif suppost, billi jiġu segwiti l-passi li ġejjin:

- Pazjenti u persuni li jieħdu ħsieb il-pazjenti jridu jingħataw parir biex jarmu kif suppost il-fliexken kollha mhux użati, parzjalment użati u użati ta' PecFent. Il-pazjent għandu jingħata istruzzjonijiet dwar kif jagħmel dan b' mod korrett.
- Jekk ikun fadal xi sprejs terapewtiċi mhux mixtieqa fil-flixxun, il-pazjent għandu jingħata istruzzjonijiet biex joħroġhom kif ġej:

Flixxun ta' 2 sprejs:

- Jimmira l-isprej 'il bogħod minnu nnifsu (u kwalunkwe nies oħrajn) u joħroġ l-isprej li jkun fadal sakemm jidher in-numru "2" bl-aħmar fil-counting window u ma jkunx fadal iktar sprejs terapewtiċi shaħ x'joħroġu minn ġol-flixxun.
- Wara li l-counter ikun wasal sa "2", il-pazjent għandu jkompli jimbotta 'l isfel fuq l-imqabad tal-iswaba' (ser ikun hemm xi žieda fir-reżistenza) għal total ta' erba' darbiet biex joħroġ kwalunkwe medičina residwa minn ġol-flixxun.
- Wara li 2 sprejs terapewtiċi jkunu ġew sprejjati, il-pazjent mhux ser jisma' klikk u l-counter mhux ser juri iktar minn "2"; sprejs addizzjonali li joħroġu mhux ser ikunu sprejs shaħ u **m'għandhomx** jintużaw b' mod terapewtiku.

Flixxun ta' 8 sprejs:

- Jimmira l-isprej 'il bogħod minnu nnifsu (u kwalunkwe nies oħrajn) u joħroġ l-isprej li jkun fadal sakemm jidher in-numru "8" bl-aħmar fil-counting window u ma jkunx fadal iktar sprejs terapewtiċi shaħ x'joħroġu minn ġol-flixxun.
- Wara li l-counter ikun wasal sa "8", il-pazjent għandu jkompli jimbotta 'l isfel fuq l-imqabad tal-iswaba' (ser ikun hemm xi žieda fir-reżistenza) għal total ta' erba' darbiet biex joħroġ kwalunkwe medičina residwa minn ġol-flixxun.

- Wara li 8 sprejs terapewtiċi jkunu ġew sprejjati, il-pazjent mhux ser jisma' klikk u l-counter mhux ser juri iktar minn "8"; sprejs addizzjonali li johorġu mhux ser ikunu sprejs shaħ u **m'għandhomx** jintużaw b'mod terapewtiku.

Hekk kif PecFent ma jkunx meħtieġ aktar, il-pazjenti u membri tal-familja tagħhom għandhom jingħataw parir biex jarmu sistematikament kwalunkwe flixxkun li jkun fadal kemm jista' jkun malajr billi jpoġġuhom lura ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal u jarmuhom, skont ir-rekwiżiti lokali jew jeħduhom lura l-ispizerija.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/10/644/007

EU/1/10/644/001
EU/1/10/644/002
EU/1/10/644/005

EU/1/10/644/003
EU/1/10/644/004
EU/1/10/644/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 31 ta' Awwissu 2010
Data tal-aħħar tiġdid: 17 Lulju 2015

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>.

ANNESS II

- A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-
LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD
IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-
AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-
RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT
MEDIĊINALI**

A. MANIFATTUR RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

L. Molteni & C dei F. LLi Alitti Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67
Tosco Romagnola
Fraz. Granatieri
IT-50018 Scandicci (FI)
L-Italja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta speċjali u ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

- **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).
- **Miżuri addizzjonali għall-minimizzazzjoni tar-riskji**

Qabel it-tnedija jew l-użu ta' PecFent f'kull Stat Membru, id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq (MAH) irid jaqbel dwar il-kontenut u l-format tal-Programm edukattiv, inklużi l-mezzi tal-komunikazzjoni, il-modalitajiet ta' distribuzzjoni, u kwalunkwe aspett ieħor tal-programm, mal-Awtorità Nazzjonali Kompetenti. Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq għandu jiżgura li t-tobba, l-ispiżjara u l-pazjenti kollha li mistennija jippreskrivu/jagħtu/jużaw PecFent jingħataw materjal edukattiv dwar l-użu korrett u sikur tal-prodott.

Materjal edukattiv għall-pazjenti se jinkludi dan li ġej:

- Fuljett ta' informazzjoni għall-pazjent
- Gwida għall-pazjenti/persuna li tiegħu hsiebhom
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għall-pazjenti/persuna li tiegħu hsiebhom

- PecFent għandu jintuża biss jekk il-pazjenti/persuni li jiehdu hsiebhom ikunu rċevew l-informazzjoni xierqa dwar l-użu tal-apparat u l-prekawzjonijiet ta' sigurtà.
- Spjegazzjoni tal-indikazzjoni.
- Spjegazzjoni ta' Wgigh għal Għarrieda, tal-Perċezzjoni li għandhom il-pazjenti dwar l-uġigh u t-trattament tiegħu.
- Spjegazzjoni tal-użu mhux skont it-tikketta, tal-użu hażin, tal-abbuż, tal-iżball fil-medikazzjoni, tad-doża eċċessiva, tal-mewt u tad-dipendenza fuq il-medicina.
- Definizzjoni ta' pazjent li jinsab f'riskju ta' doża eċċessiva, abbuż, użu hażin, dipendenza u vizzju sabiex jiġu mgħarrfa l-persuni li jagħtu r-riċetti/l-ispizjara.
- Biex PecFent ma jintużax għall-kura ta' kwalunkwe wgigh iehor jew stat ta' wgigh fuq perjodu ta' zmien qasir u/jew għall-kura ta' aktar minn 4 episodji ta' wgigh tal-kanċer li jiddied f'daqqa kuljum (sezzjoni 3 PIL).
- Il-formulazzjonijiet mhumiex interkambjabbli.
- Il-bżonn li jirreferu għal min tahom ir-riċetta/l-ispizjara f'każ ta' xi mistoqsija.
- Kif tuża PecFent.

Materjal edukattiv għat-tobba se jkun fih dan li ġej:

- Is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott u Fuljett ta' tagħrif
- Gwida għat-Tobba
- Lista ta' verifika għal min jagħti r-riċetta
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għat-Tobba

- It-trattament għandu jinbeda/jsir taħt is-supervizjoni ta' tabib li għandu esperjenza fl-immaniġġar ta' terapija bl-opiojdi f'pazjenti bil-kanċer, b'mod partikolari fit-tranżizzjoni mill-isptar għad-dar.
- Spjegazzjoni tal-użi mhux skont it-tikketta (jiġifieri: indikazzjoni, età) u tar-riskji serji marbutin mal-użu hażin, mal-abbuż, mal-iżball fil-medikazzjoni, ma' doża eċċessiva, mewt u mad-dipendenza fuq il-medicina.
- Il-bżonn ta' komunikazzjoni mal-pazjenti/persuni li jiehdu hsiebhom:
 - Immaniġġar tat-trattament u r-riskji ta' abbuż u dipendenza fuq il-medicina.
 - Il-bżonn ta' revizjoni perjodika mill-persuni li jagħtu r-riċetta.
 - Inkoraġġiment biex tiġi rrapportata kwalunkwe problema fl-immaniġġar tat-trattament.
- L-identifikazzjoni u l-monitoraġġ ta' pazjenti li jinsabu f'riskju ta' abbuż u użu hażin qabel u waqt it-trattament biex jiġu identifikati l-karatteristiċi ewlenin ta' disturb minhabba l-użu tal-opiojdi (*opioid use disorder*, OUD): karatteristiċi distinti ta' effetti sekondarji relatati mal-opiojdi u ta' disturb minhabba l-użu tal-opiojdi.
- L-importanza li jiġu rrapportati l-użu mhux skont it-tikketta, l-użu hażin, l-abbuż, id-dipendenza fuq il-medicina u doża eċċessiva.
- Il-bżonn li tiġi ppersonalizzata t-terapija jekk jiġi identifikat OUD.

Il-persuni li jagħtu riċetta għal PecFent għandhom jagħzlu l-pazjenti b'mod kritiku, u jagħtuhom pariri dwar:

- L-istruzzjonijiet dwar l-użu ta' PecFent.
- Li qatt m'għandhom jaqsmu l-medicini tagħhom jew jużawhom għal skopijiet oħra.
- Informazzjoni tat-tikketti li tkun aġġornata u li tinkludi iperalġeżija, l-użu fit-tqala, interazzjonijiet bejn medicina u oħra bħal dawk ma' benzodiazepines, vizzju jatroġeniku, rtirar u dipendenza.

Lista ta' verifika għal min jagħti r-riċetta

Azzjonijiet meħtieġa qabel ma tingħata r-riċetta għal PecFent. Jekk jogħġbok ara li tagħmel dawn il-passi kollha li ġejjin qabel ma tagħti riċetta għal PecFent:

- Żgura li jiġu sodisfatti l-elementi kollha għall-indikazzjoni approvata.
- Ipprovi l-istruzzjonijiet għall-użu ta' PecFent lill-pazjenti u/jew lill-persuni li jiehdu hsiebhom.
- Żgura li l-pazjent jaqra' l-fuljett ta' tagħrif li hemm gol-kaxxa ta' PecFent.
- Lill-pazjent ipprovdih bil-fuljett ta' PecFent għall-pazjent li jkopri dawn t'hawn taħt:

- Kanċer u Wġiġh.
- PecFent. X' inhu? Kif nużah?
- PecFent. Riskji ta' użu hażin.
- Spjega r-riskji assoċjati ma' użu ta' ammont ta' PecFent li jaqbeż l-ammont rakkomandat.
- Spjega l-użu tal-kards għall-monitoraġġ tad-doża.
- Informa lill-pazjent bis-sinjali ta' doża eċċessiva ta' fentanyl u l-bżonn ta' assistenza medika immedjata.
- Spjega dwar il-ħażna sigura u l-bżonn biex jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
- Fakkar lill-pazjenti/persuna li tiegħu ħsiebhom li għandhom isaqsu lit-tabib tagħhom jekk ikollhom xi mistoqsija jew tħassib dwar kif għandhom jużaw PecFent jew dwar ir-riskji assoċjati mal-użu hażin u l-abbuż.

Materjal edukattiv għall-ispizjara se jkun fih dan li ġej:

- Is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott u l-Fuljett ta' Tagħrif
- Gwida għall-Ispizjara
- Lista' ta' verifika għall-għoti
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għall-Ispizjara

- It-trattament għandu jinbeda/jsir taħt is-superviżjoni ta' tabib li għandu esperjenza fl-immaniġġar ta' terapija bl-opiojdi f'pazjenti bil-kanċer, b'mod partikolari fit-tranzizzjoni mill-isptar għad-dar.
- Spjegazzjoni tal-użi mhux skont it-tikketta (jiġifieri: indikazzjoni, età) u tar-riskji serji marbutin mal-użu hażin, mal-abbuż, mal-iżball fil-medikazzjoni, ma' doża eċċessiva, mewt u mad-dipendenza fuq il-medicina.
- Il-bżonn ta' komunikazzjoni mal-pazjenti/persuni li jieħdu ħsiebhom:
 - Immaniġġar tat-trattament u r-riskji ta' abbuz u dipendenza fuq il-medicina.
 - Il-bżonn ta' revizjoni perjodika mill-persuni li jagħtu r-ricetta.
 - Inkoraġġiment biex tiġi rrapportata kwalunkwe problema fl-immaniġġar tat-trattament.
- Il-monitoraġġ ta' pazjenti li jinsabu f'riskju ta' abbuz u użu hażin waqt it-trattament biex jiġu identifikati l-karatteristiċi ewlenin ta' disturb minħabba l-użu tal-opiojdi (OUD): karatteristiċi distinti ta' effetti sekondarji relatati mal-opiojdi u ta' disturb minħabba l-użu tal-opiojdi.
- L-importanza li jiġu rrapportati l-użu mhux skont it-tikketta, l-użu hażin, l-abbuż, id-dipendenza fuq il-medicina u doża eċċessiva.
- Jekk jiġi identifikat OUD, għandu jiġi kkuntattjat it-tabib.
- L-ispizjar għandu jkun familjari mal-materjali edukattivi qabel ma jingħata lill-pazjent.

L-ispizjara li jagħtu PecFent lill-pazjenti jridu jagħtuhom pariri dwar:

- Istruzzjonijiet dwar l-użu ta' PecFent.
- L-ispizjar għandu jgħarraf lill-pazjenti li sabiex jevitaw is-serq u l-użu mhux korrett ta' PecFent, huma għandhom iżommuh f'post sigur sabiex jevitaw l-użu mhux korrett u d-diverżjoni.
- L-ispizjar għandu juża l-lista ta' verifika għall-ispizjara.

Lista' ta' verifika għall-għoti

Azzjonijiet meħtieġa qabel ma ttiprovdi PecFent. Jekk jogħġbok ara li tagħmel dawn il-passi kollha li ġejjin qabel ma ttiprovdi PecFent:

- Żgura li jiġu sodisfatti l-elementi kollha għall-indikazzjoni approvata.
- Ipprovdi l-istruzzjonijiet għall-użu ta' PecFent lill-pazjenti u/jew lil persuni li jieħdu ħsiebhom.
- Żgura li l-pazjent jaqra' l-fuljett ta' tagħrif fil-kaxxa tal-kartun ta' PecFent.
- Lill-pazjent ipprovdi bil-fuljett ta' PecFent għall-pazjent li jkopri dawn t'hawn taħt:
 - Kanċer u Wġiġh.
 - PecFent. X' inhu? Kif nużah?
 - PecFent. Riskji ta' użu hażin.
- Spjega r-riskji assoċjati ma' użu ta' ammont ta' PecFent li jaqbeż l-ammont rakkomandat.
- Spjega l-użu tal-kards għall-monitoraġġ tad-doża.
- Informa lill-pazjent bis-sinjali ta' doża eċċessiva ta' fentanyl u l-bżonn ta' assistenza medika immedjata.

- Spjega dwar il-hażna sigura u l-bżonn biex jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aċċess diġitali għal materjal edukattiv

L-aċċess diġitali għall-aġġornamenti kollha tal-materjal edukattiv se jittejjeb. Materjali edukattivi għal min jagħti r-riċetta (tabib), l-ispizjar u l-pazjent se jkunu aċċessibbli permezz ta' sit elettroniku, u se jkunu disponibbli biex jitniżżlu. Vidjows ta' istruzzjoni dwar l-użu tal-prodott se jkunu aċċessibbli wkoll permezz ta' sit elettroniku. Dettalji ta' aċċessibilità diġitali mtejba se jiġu diskussi mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti u l-EMA, kif xieraq.

ANNEX III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 100 mg ta' fentanyl (bħala citrate).
Kull mL ta' soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-immieher, soluzzjoni

[Flixxun b'2 sprejs:]

1 flixxun – 0.95 mL (2 sprejs) kull flixxun

[Flixxun bi 8 sprejs:]

flixxun 1 – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun
4 flixxun – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun
12 flixxun – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu għall-immieher

[Flixxun b'2 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.

[Flixxun bi 8 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Biex jintuża biss minn persuni li jkunu diġà qed jieħdu mediċini opjojdi ohra kuljum għall-uġiġh kostanti tal-kanċer.
L-użu aċċidentali jista' jikkawża hsara jew ikun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

[Flixxun b'2 sprejs:]

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

[Flixxun bi 8 sprejs:]

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f' temperatura 'l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-flixxun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.

Aħżen il-flixxun ta' PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-hin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/10/644/007 100 mikrogramma, 2 sprejs, 1 flixxun

EU/1/10/644/001 100 mikrogramma, 8 sprejs, 1 flixxun

EU/1/10/644/002 100 mikrogramma, 8 sprejs, 4 flixxen

EU/1/10/644/005 100 mikrogramma, 8 sprejs, 12-il flixxun

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

PecFent 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-KONTENITUR REŻISTENTI GHAT-TFAL (CRC)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 100 mg ta' fentanyl (bħala citrate).

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għall-imnieher
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

[Flixxun b'2 sprejs:]

Jekk l-isprej ma jkunx intuża fi żmien 5 ijiem wara l-prajming, dan għandu jintrema.

[Flixxun bi 8 sprejs:]

Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

[Tikketta fuq is-CRC li tingibed 'il barra] [Qoxra ta' quddiem]: L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

[Tikketta ta' fuq il-kontenitur]: L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

[Fuq in-naħa ta' ġewwa tat-tikketta]: Biex jintuża biss minn persuni li jkunu diġà qed jieħdu mediċini opjojdi ohra kuljum għall-uġigh kostanti tal-kanċer. L-użu aċċidentali jista' jikkawża hsara serja jew ikun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

Flixxun b'2 sprejs:

Wara l-prajming, uża fi żmien 5 ijiem.

Data tal-prajming:

Flixxun bi 8 sprejs:

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

Data tal-ewwel użu:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f' temperatura 'l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-flixxun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.

Ahżen il-flixxun ta' PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE****17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D**

Mhux applikabbli

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM*

Mhux applikabbli

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.95 mL – 2 sprejs
1.55 mL – 8 sprejs

6. OHRAJN

L-użu aċċidentali jista' jkun fatali

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 400 mg ta' fentanyl (bħala citrate)
Kull mL ta' soluzzjoni fih 4,000 mikrogramma ta' fentanyl (bħala citrate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni
flixxun 1 – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun
4 fliexken – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun
12 fliexken – 1.55 mL (8 sprejs) f'kull flixxun

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu għall-imnieher
Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Biex jintuza biss minn persuni li jkunu diġà qed jiehdu mediċini opjojdi ohra kuljum għall-uġiġh kostanti tal-kanċer.
L-użu aċċidentali jista' jikkawża hsara jew ikun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

Wara l-ewwel użu, użah fi żmien 60 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f' temperatura 'l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-flixxun fil-kontenitur rezistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.

Ahżen il-flixxun ta' PecFent fil-kontenitur rezistenti għat-tfal il-hin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ**

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

EU/1/10/644/003 400 mikrogramma, 8 sprejs, 1 flixxun

EU/1/10/644/004 400 mikrogramma, 8 sprejs, 4 fliexken

EU/1/10/644/006 400 mikrogramma, 8 sprejs, 12-il flixxun

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGħATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

PecFent 400

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-KONTENITUR REŻISTENTI GHAT-TFAL (CRC)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull sprej fih 400 mg ta' fentanyl (bħala citrate)

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid (0.36%) jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH. Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar tagħrif.

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għall-imnieher
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

[Tikketta fuq is-CRC li tingibed 'il barra] [Qoxra ta' quddiem]: L-użu aċċidentali jista' jkun fatali .

[Tikketta ta' fuq il-kontenitur]: L-użu aċċidentali jista' jkun fatali .

[Fuq in-naħa ta' ġewwa tat-tikketta]: Biex jintuża biss minn persuni li jkunu diġà qed jiehdu mediċini opjojdi ohra kuljum għall-uġigh kostanti tal-kanċer. L-użu aċċidentali jista' jikkawża hsara serja jew ikun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

Wara l-ewwel użu, użah fi zmien 60 jum
Data tal-ewwel użu:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Taħżinx f' temperatura 'l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friza.

Żomm il-flixxun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.

Ahżen il-flixxun ta' PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA TAL-FLIXKUN**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.55 mL - 8 sprejs

6. OHRAJN

L-użu aċċidentali jista' jkun fatali

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni (sprej nażali)
PecFent 400 mikrogramma/sprej għall-imnieher, soluzzjoni (sprej nażali)
Fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina giet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu PecFent u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża PecFent
3. Kif għandek tuża PecFent
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen PecFent
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu PecFent u għalxiex jintuża

X'inhu PecFent

PecFent fih fentanyl, li hi medicina qawwija li ttaffi l-uġiġh magħrufa bħala opjojd li jtaffi l-uġiġh.

Għalxiex jintuża PecFent

PecFent jintuża f'persuni adulti li jkollhom kanċer, għal tip ta' wġiġh imsejjaħ uġiġh 'temporanju li jseħh għal għarrieda'.

- Dan l-uġiġh temporanju jiġi għal għarrieda.
- Iseħh anki meta tkun ħadt id-doża tas-soltu tal-opjojd li jtaffi l-uġiġh (bħal morfina, fentanyl, oxycodone jew hydromorphone) biex tikkontrolla l-uġiġh fl-isfond kostanti tiegħek.

PecFent għandu jintuża biss minn persuni adulti li jkunu diġà qed jieħdu medicini opjojdi oħra kuljum għall-uġiġh kostanti tal-kanċer tagħhom.

Kif jahdem PecFent

PecFent hu soluzzjoni ta' sprej nażali.

- Meta tisprejja PecFent ġo imniehrek, il-qtar zġħar ħafna tal-isprej jiffurmaw ġel irqiġ.
- Fentanyl jiġi assorbitt malajr minn ġol-kisja ta' mniehrek u fiċ-ċirkolazzjoni tad-demmm.
- Dan ifisser li l-medicina tidhol malajr fis-sistema tiegħek biex ittaffi l-uġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda.

2. X'ghandek tkun taf qabel ma tuża PecFent

Tużax PecFent jekk:

- jekk inti allerġiku għal fentanyl jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).
- jekk m'intix qed tuża b'mod regolari medicina opioid (eż codeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine) preskritta kuljum fuq skeda regolari, għal ta' l-inqas ġimgħa, għall-kontroll tal-uġiġh persistenti tiegħek. Jekk ma kontx qed tuża dawn il-medicini, **m'ghandekx** tuża PecFent, minhabba li dan jista' jżid ir-riskju li n-nifs jista' jsir bil-mod u/jew baxx b'mod perikoluż, jew anki jieqaf.
- jekk issofri minn uġiġh li jdum għal tul ta' żmien qasir minbarra uġiġh li jinħass
- għandek problema serja biex tieħu n-nifs jew problema fil-pulmun.
- jekk qed tingħata kura b'medicini li fihom sodium oxybate.

Tużax PecFent jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik. Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Ahżen din il-medicina f'post sikur u sigur fejn persuni oħrajn ma jistgħux jaċċessawha (ara sezzjoni 5. 'Kif taħzen PecFent' għal aktar informazzjoni).

Kif iżzomm PecFent biex ma jmissuhx it-tfal

- Għandek iżzomm PecFent ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal meta ma tkunx qed tużah, anki jekk tkun użajt it-8 sprejs kollha. Dan hu għax PecFent jista' jkun ta' periklu għall-ħajja jekk jittiehed minn tifel/tifla b'mod aċċidentali.

Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek qabel tuża PecFent jekk:

- tkun ilek xi żmien ma tieħu l-istess doża tal-medicina opjojdi ta' kuljum għall-kura tal-uġiġh kostanti tiegħek
- ikollok problemi biex tieħu n-nifs, bħal azzma, tharhir jew qtugħ ta' nifs
- taħbat rasek b'mod sever
- Jekk għandek problemi b'qalbek speċjalment rata tal-qalb bil-mod ħafna
- għandek pressjoni tad-demmm baxxa jew ammont baxx ta' fluwidu fiċ-ċirkolazzjoni tiegħek
- jekk għandek problemi tal-fwied jew tal-kliwi. Dan hu minhabba li jista' jaffettwa l-mod li bih ġismek jipproċessa l-medicina.
- Jekk tieħu antidipressanti jew antipsikotiċi, jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni '**Medicini oħra u PecFent**'.

Jekk kwalunkwe minn dawn t'hawn fuq japplikaw għalik (jew jekk m'intix ċert), kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

- Jekk inti atleta, l-użu ta' PecFent jista' jirriżulta f'testijiet tad-doping li jkollhom riżultat pożittiv.

Ikkonsulta lit-tabib tiegħek waqt li qed tuża PecFent, jekk:

- tbatu minn ħruġ ta' demm rikorrenti mill-imnieher - jista' jagħtik parir biex tuża kura alternattiva.
- tħoss li PecFent qed isir inqas effettiv biex jikkura l-episodji ta' wġiġh temporanju li jseħħ għal għarrieda
- ikollok uġiġh jew zieda fis-sensittività għall-uġiġh (iperallergija) li ma tirrispondix għal doża oġhla tal-medicina tiegħek kif mogħtija b'ricetta mit-tabib tiegħek
- taħseb li qed issir dipendenti fuq PecFent
- ikollok tahlita tas-sintomi li ġejjin: dardir, rimettar, anoressija, għeja, dgħufija, sturdament u pressjoni tad-demmm baxxa. Flimkien, dawn is-sintomi jistgħu jkun sinjal ta' kundizzjoni

potenzjalment ta' periklu għall-hajja msejha insuffiċjenza adrenali. Din hi kundizzjoni li fiha l-glandoli adrenali ma jipproduċux biżżejjed ormoni

- qatt żviluppajt insuffiċjenza adrenali jew nuqqas ta' ormoni tas-sess (defiċjenza ta' androgen) bl-użu tal-opjojdi

Użu fit-tul u tolleranza

Din il-medicina fiha fentanyl li huwa medicina oppjojde. L-użu ripetut ta' medicini oppjojdi li jtaffu l-uġiġh jista' jirriżulta f'li l-medicina tkun inqas effettiva (tidraha, magħrufa bħala tolleranza tal-medicina). Tista' ssir aktar sensitiv għall-uġiġh waqt li tkun qed tuża PecFent. Dan huwa magħruf bħala iperalgeżija. Iż-żieda fid-doża ta' PecFent tista' tgħin sabiex ikompli jitnaqqas l-uġiġh tiegħek għal ftit żmien, iżda tista' tkun ta' ħsara wkoll. Jekk tinnota li l-medicina tiegħek issir inqas effettiva, kellek lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk huwiex aħjar għalik li żżid id-doża jew li tnaqqas gradwalment l-użu tiegħek ta' PecFent.

Dipendenza

L-użu ripetut ta' PecFent jista' jwassal ukoll għal dipendenza u abbuż li jistgħu jirriżultaw f' doża eċċessiva ta' periklu għall-hajja. Ir-riskju ta' dawn l-effetti sekondarji jista' jiżdied b' doża oġhla u tul ta' żmien itwal ta' użu. Id-dipendenza tista' gġiegħlek thoss li m'għadekx tikkontrolla kemm għandek bżonn tuża medicina jew kemm għandek bżonn tużaha ta' spiss. Tista' thoss li għandek bżonn tkompli tuża l-medicina tiegħek, anke meta ma tgħinx ittaffi l-uġiġh tiegħek.

Ir-riskju li persuna ssir dipendenti jvarja minn persuna għal oħra. Jista' jkollok riskju akbar li ssir dipendenti fuq PecFent jekk:

- inti jew xi hadd fil-familja tiegħek qatt abbuża jew kien dipendenti fuq l-alkohol, medicini bir-riċetta jew medicina illegali (“dipendenza”).
- inti persuna li tpejjep.
- inti qatt kellek problemi bil-burdata tiegħek (dipressjoni, ansjetà jew disturb tal-personalità) jew ġejt ittrattat minn psikjatra għal mard mentali ieħor.

Jekk tinnota xi wieħed mis-sinjali li ġejjin waqt li qed tuża PecFent, jista' jkun sinjal li inti sirt dipendenti jew vizzjat.

- għandek bżonn tuża l-medicina għal żmien itwal minn dak irrakkomandat mit-tabib tiegħek
- għandek bżonn tuża aktar mid-doża rakkomandata
- qed tuża l-medicina għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk preskritti, pereżempju, “biex tibqa' kalm” jew “tgħinek torqod”
- għamilt tentattivi ripetuti, mingħajr suċċess biex tieqaf jew tikkontrolla l-użu tal-medicina
- meta tieqaf tiegħu l-medicina thossok ma tiflaħx (eż. dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġhda, u hrug ta' għaraq), u thossok aħjar ladarba terġa' tuża l-medicina (“effetti tat-twaqqif”)

Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sinjali, kellek lit-tabib tiegħek biex tiddiskuti l-aħjar mod ta' trattament għalik, inkluż meta jkun xieraq li tieqaf u kif tieqaf b' mod sikur.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

PecFent jista' jikkawża disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad bħal apnea tal-irqad (pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. Is-sintomi jistgħu jinkludu pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad, qawmien matul il-lejl minħabba qtugħ ta' nifs, diffikultajiet biex tibqa' rieqed jew hedla eċċessiva matul il-ġurnata. Jekk inti jew persuna oħra tosservaw dawn is-sintomi, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jikkunsidra li jnaqqas id-doża.

Tfal u adolexxenti

PecFent mhuwiex approvat għall-użu fi tfal taħt it-18-il sena.

Medicini oħra u PecFent

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiegħu, hadt dan l-aħhar jew tista' tiegħu xi medicini oħra. B' mod partikulari, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent, jekk qieghed tiegħu jew hadt dan l-aħhar kwalunkwe minn dawn il-medicini li ġejjin:

- mediċini li jistgħu jraqqduk, bħal pilloli tal-irqad, kalmanti, mediċini li jirilassaw il-muskoli, mediċini għall-ansjetà bħal benzodiazepines (eż. diazepam), jew mediċini għall-allergiji (anti-istamini). L-użu ta' PecFent fl-istess hin ma' mediċini li jgħegħluk thossok bi ngrhas iżid ir-riskju li jaqbdok in-ngrhas, diffikultajiet biex tieħu n-nifs (tnaqqis respiratorju), koma u jista' jkun ta' periklu għall-ħajja. **Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi wiehed minn dawn is-sintomi.** Għal din ir-raġuni, l-użu ta' PecFent flimkien mas-sedattivi għandu jigi kkunsidrat biss meta ma jkunx hemm possibbiltà ta' għażla ta' kuri alternattivi. Madankollu, jekk it-tabib tiegħek jagħżel li jikteb riċetta għal PecFent flimkien ma' mediċini sedattivi, id-doża u t-tul tal-kura għandhom ikunu determinati mit-tabib tiegħek. **Għid lit-tabib tiegħek dwar il-mediċini sedattivi kollha li qed tieħu, u segwi l-istruzzjonijiet rigward id-doża li tak it-tabib tiegħek mill-qrib.** Jista' jkun ta' benefiċċju jekk tinforma lill-ħbieb jew qrafa biex joqogħdu attenti għas-sinjali u s-sintomi msemmija hawn fuq.
- mediċini għad-dipressjoni msejha 'inibituri ta' monoamine-oxidase' (MAOI). Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk tkun ħadt mediċina MAOI matul l-aħħar ġimagħtejn qabel ma tuża PecFent. Ir-riskju ta' effetti sekondarji jizdied jekk qiegħed tieħu mediċini bħal ċerti antidipressanti jew antipsikotiċi. PecFent jista' jinteraġixxi ma' dawn il-mediċini u jista' jkollok bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, alluċinazzjonijiet, koma), u effetti oħra bħal temperatura tal-ġisem oġhla minn 38°C, żieda fir-rata tat-taħbita tal-qalb, pressjoni tad-demmi instabbli, u esaġerazzjoni tar-riflessi, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea). It-tabib tiegħek se jgħidlek jekk PecFent huwiex tajjeb għalik.
- sprejs nażali għall-kura ta' mnieħer misdud (li jkun fihom dikongestant bħal oxymetazoline)
- mediċini li jistgħu jaffettwaw il-modli ġismek jipproċessa PecFent. Dawn jinkludu:
 - mediċini għal infezzjoni bl-HIV (bħal ritonavir, nelfinavir, amprenavir jew fosamprenavir)
 - mediċini għal infezzjonijiet fungali (bħal ketoconazole, itraconazole jew fluconazole)
 - mediċini għal infezzjonijiet batterjali (bħal troleandomycin, clarithromycin jew erythromycin)
 - 'aprepitant' - jintuża biex ma jħallikx thossok imdardar
 - 'diltiazem' u 'verapamil' - jintużaw kontra pressjoni tad-demmi għolja jew problemi tal-qalb.
 - mediċini oħrajn kontra l-uġiġħ imsejha agonist/antagonist parzjali bħal buprenorphine, nalbuphine, pentazocine. Jista' jkollok sintomi ta' meta wiehed iwaqqaf il-mediċina (dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġhda, u għaraq) waqt li tkun qed tuża dawn il-mediċini.
 - xi painkillers għal uġiġħ fin-nervituri (gabapentin u pregabalin).

Jekk kwalunkwe minn dawn t'hawn fuq japplikaw għalik (jew jekk m'intix ċert), kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

M'għandek tuża l-ebda tip ieħor ta' sprej nażali għal mill-inqas 15-il minuta wara li tuża PecFent.

PecFent ma' ikel u xorb

- Tixrobx alkoħol meta tkun qed tuża PecFent. Dan jista' jżid ir-riskju li jkollok effetti sekondarji serji.
- Tixrobx meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tuża PecFent. Dan jista' jaffettwa l-mod li bih ġismek jipproċessa PecFent.

Tqala, treditgħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredra, taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

- Tużax PecFent jekk inti tqila jew jekk tista' toħroġ tqila, ħlief jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li tista' tużah.
- Tużaħx PecFent waqt it-twelid tat-tarbija. Dan għaliex jista' jikkawża problemi lit-tarbija tiegħek biex tieħu n-nifs.

- Tużax PecFent jekk tkun qed tredda'. Dan għaliex il-medicina tista' tghaddi gol-halib tas-sider u tista' tikkawża effetti sekondarji fit-tarbija li tkun qed terda'.
- M'għandekx tibda t-treddigh qabel 5 ijiem wara l-ahħar doża ta' PecFent.

Sewqan u thaddim ta' magni

- Kellem lit-tabib tiegħek dwar jekk hemmx xi periklu għalik li ssuq jew tuża għodda jew magni wara li tuża PecFent.
- Tista' thossok bi ngħas, stordut jew ikollok problemi tal-vista wara li tuża PecFent. Jekk dan jiġri, issuqx u tużax għodda jew magni.
- Issuqx u tużax tagħmir jew magni sakemm tkun taf kif din il-medicina ser taffettwak.

PecFent fih propylhydroxybenzoate (E216)

Jista' jikkawża reazzjonijiet allergici (possibbilment li jseħħu wara ċertu żmien), u b'mod rari hafna, bronkospazmu (jekk inti ma tużax l-isprej nażali b'mod korrett).

3. Kif għandek tuża PecFent

Qabel tibda t-trattament u regolarment matul it-trattament, it-tabib tiegħek se jiddiskuti wkoll miegħek x'tista' tistenna mill-użu ta' PecFent, meta u kemm għandek bżonn toħodha, meta tikkuntattja lit-tabib tiegħek, u meta għandek bżonn twaqqafha (ara wkoll sezzjoni 2).

Dejjem għandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

PecFent jiġi f'żewġ qawwiet differenti: flixxun ta' 100 mikrogramma f'kull sprej u flixxun ta' 400 mikrogramma f'kull sprej. Aċċerta ruħek li tuża l-qawwa li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha.

Kemm għandek tużah

- Doża biex tikkura episodju ta' wġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda tista' tkun jew ta' 1 sprej jew 2 sprejs (wiehed f'kull minfes). It-tabib tiegħek ser jgħidek kemm sprejs (1 jew 2) għandek tuża biex tikkura episodju ta' wġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda.
- **Tużax iktar mid-doża li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha biex tikkura kwalunkwe episodju wiehed ta' wġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda.**
- Tużax PecFent aktar minn 4 darbiet kuljum.
- Stenna mill-inqas 4 sigħat biex tieħu d-doża ta' PecFent li jkun imiss.

Doża tal-bidu

- Id-doża tal-bidu hi ta' 100 mikrogramma.
- Din tkun sprej wiehed go minfes wiehed mill-flixxun ta' 100 mikrogramma f'kull sprej.
- Ara 'Kif tuża l-flixxun ta' PecFent' għal istruzzjonijiet dwar kif tuża doża.

Kif issib id-doża korretta

- Imbagħad, it-tabib tiegħek ser jgħinek issib id-doża korretta biex ittaffi l-uġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda. Hu importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek.
- Għid lit-tabib tiegħek dwar l-uġigh li jkollok u kif PecFent qed jaħdem. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk hemmx bżonn li d-doża tiegħek ta' PecFent għandhiex tinbidel.
- Tibdilx id-doża inti stess.


Meta tkun sibt id-doża korretta

- Għid lit-tabib tiegħek jekk id-doża tiegħek ta' PecFent ma ttaffix l-uġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk hemmx bżonn li d-doża tiegħek tinbidel. **Tibdilx id-doża ta' PecFent jew tal-medicini l-oħra tiegħek kontra l-uġigh inti stess.**
- Għid lit-tabib tiegħek immedjatment jekk ikollok iktar minn 4 episodji kuljum ta' wġigh temporanju li jseħħ għal għarrieda. It-tabib tiegħek jista' jibdel il-medicina għall-uġigh kostanti tiegħek. Għadarba l-uġigh kostanti tiegħek jiġi kkontrollat, it-tabib tiegħek jista' mbagħad jibdel id-doża tiegħek ta' PecFent.

Jekk m'intix ċert dwar id-doża korretta jew kemm PecFent ghandek tuża, staqsi it-tabib tiegħek.

Kif tuża l-flixxun ta' PecFent

Istruzzjonijiet dwar kif tiftah u taghlaq il-kontenitur rezistenti għat-tfal






Kif tipprepara l-flixxun ta' PecFent għall-użu

Qabel ma tuża flixxun ġdid ta' PecFent jehtieg li tipprepara għall-użu. Dan jissejjaħ 'priming'.

Biex tipprajmja l-flixxun, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet t'hawn taħt:

1. Flixxun ġdid ta' PecFent ser juri żewġ linji homor fil-counting window fit-top abjad tal-plastik fuq il-flixxun (Figura 1 u Figura 3a).
2. Nehhi l-għatu protettiv magħmul minn plastik ċar minn fuq in-nozzle (Figura 1).
3. Immira l-isprej nażali lil hemm minnek (u lil hemm minn kwalunkwe nies oħra).
4. Żomm l-isprej nażali PecFent iħares 'il fuq bis-saba' l-kbir fuq il-qiegħ tal-flixxun u sebgħek il-werrej u dak tan-nofs fuq il-finger grips fuq kull naħa tan-nozzle (Figura 2).
5. Aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-finger grips sakemm tisma' 'klikk' u mbagħad erħi l-grips (Figura 2). Ser tisma' t-tieni 'klikk' u issa għandu jkun hemm bar waħda kbira hamra fil-counting window (Figura 3b).
6. Irrepeti pass 5 tliet darbiet. Kif tkun qed tirrepeti pass 5, il-bar hamra ser tiċkien kontinwament sakemm tara tara bar ħadra fil-counting window (Figura 3b-e). Il-bar ħadra tfisser li PecFent sprej nażali jkun lest biex jintuża.
7. Imsaħ in-nozzle b'tissue u ifflaxxa t-tissue fit-tojlit.
8. Jekk ma tkunx ser tuża l-medicina tiegħek immedjatment, poġġi l-għatu protettiv lura f'postu. Imbagħad poġġi l-flixxun ta' PecFent ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal. Jekk PecFent ma jkunx intuża għal 5 ijiem, erga' pprajmja billi tisprejja darba.



Kif tuża PecFent



PecFent għandu jintuża biss billi tisprejja ġol-minfes tiegħek.

1. Iċċekkja li jkun hemm bar ħadra jew numru fil-counting window (Figura 4); dan jikkonferma li l-flixxun ta' PecFent ikun ġie ipprajmjat (ara 'Kif tipprepara l-flixxun ta' PecFent għall-użu' hawn fuq).
2. Naddaf imniehrek jekk thoss li għandek tagħmel dan.
3. Oqgħod bilqiegħda b'rasek thares 'il fuq.
4. Nehħi l-għatu protettiv minn fuq iż-żennuna.
5. Żomm il-flixxun ta' PecFent bis-saba' l-kbir fuq il-qiegħ tal-flixxun u sebgħek il-werrej u dak tan-nofs fuq il-finger grips (Figura 4).
6. Poġġi ż-żennuna f'tit 'il ġewwa (madwar 1 ċm) ġol-minfes tiegħek. Ippuntah 'il ġewwa lejn il-ġenb ta' mniehrek. Dan ser imejjel il-flixxun bi f'tit (Figura 5).
7. Aghlaq il-minfes l-iehor b'seba' minn idek l-oħra (Figura 5).
8. Aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-finger grips biex b'hekk PecFent jisprejja ġol-minfes tiegħek. Meta tisma' klikk, erħi l-grips. Innota: Tista' ma thoss xejn jġri f'imniehrek – taħsibx li dan ifisser li l-isprej ma ħadimx – afda fuq il-klikk u number counter.
9. Hu n-nifs bil-mod 'il ġewwa minn go mniehrek u 'l barra minn go ħalqek.
10. In-number counter ser javvanza wara kull użu u juri kemm sprejs ikunu ntużaw.
11. Jekk it-tabib tiegħek ikun tak riċetta għal sprej ieħor, irrepeti passi 5 sa 9, billi tuża l-minfes l-iehor.

Tużax iktar mid-doża li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha biex tikkura kwalunkwe episodju wiehed ta' wġiħ.

12. Poġġi l-flixxun lura ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal wara kull użu. Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal (Figura 6)

13. Oqgħod bilqiegħda għal mill-inqas minuta wara li tuża l-isprej nażali.



Numru ta' sprejs fi flixkun ta' PecFent

Hemm 8 sprejs sħaħ f'kull flixkun ta' PecFent

- Wara l-ewwel sprej, in-numru 1 ser tidher fil-counting window. Dan ser jawnza kull darba li jintuża l-isprej.
- Meta tara 8 aħmar fil-counting window, il-flixkun ikun spiċċa u mhux se tkun tista' tieħu sprej sħiħ minnu aktar.

Kif tarmi PecFent mhux użat

Jekk tara numru, minbarra 8 fil-counting window, ikun għadek **MA UŻAJTX** it-8 sprejs kollha fil-flixkun. Ikun għad fadal doži ta' PecFent ġol-flixkun.

Trid tiżvojta d-doži ta' PecFent li jkun fadal minn ġol-flixkun billi timmira l-isprej nażali 'l bogħod minnek (u minn kwalunkwe nies) u billi tagħfas u terhi l-grips sakemm in-numru "8" aħmar jidher fil-counting window.

Meta tara n-numru "8" fil-counting window, xorta jkun għad fadal il-medicina ġol-flixkun li inti trid tbattal.

- Ser ikollok bżonn tagħfas 'l isfel u terhi l-finger grips 4 darbiet aktar waqt li timmira l-isprej nażali 'l bogħod minnek (u minn kwalunkwe nies oħrajn).
- Ser thoss zieda żgħira fir-reżistenza meta tagħfas 'l isfel u l-imqabad tas-swaba ser jiċċaqilqu f'it biss.
- **M'INTIX** ser tisma' klikk meta tagħfas 'l isfel.
- Il-counter ser jibqa' fuq in-numru "8".
- Poġġi l-għatu protettiv lura fuq il-flixkun tal-isprej.
- Poġġi l-flixkun lura ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal.
- Kellem lill-ispjertant lokali tiegħek dwar ir-rimi ta' flixkun vojta (ara '**Kif taħzen PecFent**').

Jekk l-isprej nażali PecFent ikun imblukkat jew ma jisprejjax kif suppost

- Jekk l-isprej ikun imblukkat, immira l-isprej lil hemm minnek (u lil hemm minn kwalunkwe nies oħra) u aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-pompa. Dan għandu jneħhi kwalunkwe imblukkar.
- Jekk l-isprej nażali tiegħek xorta jibqa' ma jahdimx kif suppost, armi l-flixkun li jkun fih il-ħsara u ibda wieħed ġdid. Għid lit-tabib tiegħek x'għara. **Qatt m'għandek tipprova tirroranġa l-isprej nażali inti stess jew iżzarmah.** Dan għax jista' jkun li mbagħad jagħtik doża hażina.
- **Armi l-flixkun ta' PecFent u ibda wieħed ġdid jekk:** Ikunu għaddew 60 jum jew iżjed minn meta tkun ipprajmjajt jew użajt il-flixkun tiegħek għall-ewwel darba.

Jekk tuża PecFent aktar milli suppost

- Tista' thossok bi nġhas, imdardar, stordut jew tieħu n-nifs bil-mod jew bil-hatfa. F'każijiet gravi t-tehid iżzejjed ta' PecFent jista' jwassal ukoll għal koma. Jekk thossok stordut hafna, bi nġhas

ħafna jew tieħu n-nifs bil-ħatfa, ċempel għal ambulanza jew għid lil xi ħadd ieħor biex iċempel immedjatment.

- Doża eċċessiva tista' tirriżulta wkoll f' disturb tal-moħħ magħruf bħala lewkoenċefalopatija tossika.

Jekk tieqaf tuża PecFent

Jekk ma jkollokx aktar uġiġħ temporanju li jseħħ għal għarrieda, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma twaqqaf PecFent u segwi l-parir tiegħu/tagħha. Madankollu, għandek tkompli tieħu l-mediċina opjojdi l-oħra tiegħek biex tikkura l-uġiġħ kostanti tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jiċċekkja d-doża.

Jista' jkollok sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina simili għall-effetti sekondarji possibbli ta' PecFent meta twaqqaf PecFent. Jekk ikollok sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jevalwa jekk hux se jkollok bżonn il-mediċina biex tnaqqas jew telimina s-sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f' kulhadd.

Ċempel għal ambulanza jew għid lil xi ħadd ieħor biex iċempel immedjatment jekk:

- thossok stordut ħafna jew ikun ser iħossok ħażin
- thossok bi ngħas ħafna
- tieħu n-nifs bil-mod jew bil-ħatfa
- ikollok gilda kiesħa mdellka, tidher musfar, ikollok polz dgħajjed jew sinjali oħrajn ta' xokk.

Jekk inti jew il-persuna li qed tieħu ħsiebek tiegħek tinnotaw kwalunkwe mill-effetti sekondarji msemmija hawn fuq, ċemplu għal ambulanza immedjatment.

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 10 persuni):

- ma tkunx taf fejn int (diżorjentament)
- tibdil fis-sens tat-togħma
- thossok stordut
- thossok imdardar jew tirremetti
- thossok bi ngħas, uġiġħ ta' ras
- tinfaraġ, skonfort fl-immieher (bħal sensazzjoni ta' ħruq fl-immieher), immieher inixxi
- stitikezza,
- ħakk fil-gilda

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw minn 1 sa 100 persuna):

- infezzjoni fis-sider
- gerżuma jew immieher bl-uġiġħ, misluħin jew infjammati
- sogħla, għatis, katarru jew riħ, tibdil fil-fluwidu prodott minn immiehrek
- reazzjoni allergika, raxx
- telf ta' jew żieda fl-aptit, żieda fil-piż
- deidratazzjoni, thossok bil-għatx
- tuża ħażin il-mediċina
- tara jew tisma' affarijiet li mhumiex hemm fil-verità (alluċinazzjonijiet/delirju), thossok konfuż
- thossok dipress, inkwetat, taġixxi bil-mod jew nervuż
- nuqqas ta' konċentrazzjoni jew żieda fl-attività fiżika
- telf ta' memorja

- thossok “ewforiku”
- tkun inqas konxju jew tirreagixxi bil-mod, tintilef minn sensik
- konvulzjoni (aċċessjonijiet)
- konvulzjonijiet fil-muskoli jew roġħda
- telf fis-sens tat-togħma, telf jew tibdil fis-sens tax-xamm
- diffikultà biex titkellem
- kulur blu tal-ġilda
- mejt, taqa’, telqa
- sħana u ċirkolazzjoni ma jaħdmux kif suppost, fwawar jaħarqu jew deni, tertir ta’ bard, għaraq eċċessiv
- nefħa tat-tessut artab
- pressjoni tad-demmm baxxa
- imblukkar fil-pajp tan-nifs
- qtugħ ta’ nifs
- ħruġ ta’ demmm mill-vaġina
- tiċrita fl-imsaren jew infjammazzjoni fil-kisja tal-istonku
- tmewwit jew tmemnim fil-halq, fl-ilsien, jew fl-immieħer, jew problemi oħra fl-ilsien, ulċeri tal-halq, halq xott
- dijarea
- dardir, uġiġħ fl-istonku, indigestjoni
- uġiġħ jew dulur fil-ġogi
- diffikultà biex, jew ma tkunx tkunx kapaċi tagħmel l-awrina
- uġiġħ fis-sider
- thossok għajjen jew dgħajjef, problemi biex tiċċaqlaq
- tibdil fiċ-ċelluli tad-demmm (osservat mit-testijiet tal-laboratorju)
- Żieda ta’ zokkor fid-demmm
- Proteina fl-awrina

Effetti sekondarji oħra (frekwenza mhux magħrufa (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli))

- problemi severi biex tieħu n-nifs
- fwawar
- Nuqqas ta’ rqađ
- Sindrome ta’ meta wieħed iwaqqaf il-medicina (dan jista’ jidher permezz tal-effetti sekondarji li ġejjin: dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta’ bard, roġħda, u għaraq)
- tolleranza għall-medicina, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga (ara sezzjoni 2)

It-trattament fit-tul b’fentanyl waqt it-tqala jista’ jikkawża sintomi ta’ meta wieħed jieqaf jieħu l-medicina fit-tarbija tat-twelid, u dan jista’ jkun ta’ periklu għall-hajja (ara sezzjoni 2).

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’ [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-medicina.

5. Kif taħzen PecFent

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal. PecFent jista' jkun ta' periklu għall-hajja jekk jittiehed minn tifel/tifla b'mod aċċidentali.

Aħżen din il-mediċina f'post sikur u sigur fejn il-persuni l-oħra ma jkunux jistgħu jaċċessawha. Tista' tikkawża ħsara serja u tkun fatali għal nies li jistgħu jieħdu din il-mediċina bi żball, jew intenzjonalment meta ma tkunx ingħatat riċetta għalihom.

- Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-flixxkun wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.
- Tahżinx PecFent f'temperatura 'l fuq minn 25°C.
- Tagħmlux fil-friża.
- Żomm il-flixxkun fil-kontenitur reżistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.
- Aħżen il-flixxkun ta' PecFent fil-kontenitur reżistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.
- Tużax għal aktar minn 60 jum wara l-ewwel użu (jew priming jew tużah biex tikkura episodju ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda)
- PecFent li jkun skada jew li ma jkunx meħtieġ aktar, jista' xorta jibqa' fih biżżejjed mediċina li tista' tkun ta' ħsara għal nies oħrajn, speċjalment it-tfal. PecFent m'għandux jintrema ma' l-ilma tad-dranagg jew ma' l-iskart domestiku. Kwalunkwe PecFent mhux mixtieq għandu jintrema malajr kemm jista' jkun billi ssegwi l-istruzzjonijiet li hemm taht ***Kif tarmi PecFent mhux użat***. Kwalunkwe fliexken vojta għandhom jitpoġġew lura fil-kontenituri tagħhom reżistenti għat-tfal u jintremew billi tehodhom lura l-ispizerija jew skont ir-rekwiziti lokali.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih PecFent

Is-sustanza attiva hi fentanyl.

- *PecFent 100 mikrogramma/sprej soluzzjoni ta' sprej nażali*
Kull mL ta' soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).
1 sprej (100 mikrolitri) fih 100 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).
- *PecFent 400 mikrogramma/sprej soluzzjoni ta' sprej nażali*
Kull mL ta' soluzzjoni fih 4,000 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).
1 sprej (100 mikrolitri) fih 400 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).

Is-sustanzi mhux attivi l-oħra (eċċipjenti) huma: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH.

Kif jidher PecFent u l-kontenut tal-pakkett

Il-mediċina hi sprej nażali, soluzzjoni, minn ċara sa kważi ċara u bla kulur. Tinsab fi flixxkun ta' hġieġ ċar, mgħammar b'pompa metering. Il-pompa għandha spray counter li jikklikkja, biex b'hekk tkun tista' tisma' kif ukoll tara li l-isprej ikun ingħata, u għatu protettiv. Wara li l-flixxkun ta' PecFent ikun ġie pprajmjat (ippreparat għall-użu), dan iforni 8 sprejs shaħ. Kull flixxkun ta' PecFent hu fornut f'kontenitur reżistenti għat-tfal.

Il-fliexken PecFent fil-kontenituri tagħhom reżistenti għat-tfal huma fornuti f'kaxxi li jkun fihom flixxkun wiehed, 4 jew 12-il flixxkun.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen

Il-Ġermanja

Manifattur

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67 Tosco Romagnola,
Fraz. Granatieri – 50018 Scandicci (FI)
L-Italja

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Sorsi ohra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

PecFent 100 mikrogramma/sprej għall-immieher, soluzzjoni (sprej nażali), flixxun b'2 sprejs Fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok b'zonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina giet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum PecFent u għalxiex jintuża
3. X'għandek tkun taf qabel ma tuża PecFent
3. Kif għandek tuża PecFent
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen PecFent
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum PecFent u għalxiex jintuża

X'inhum PecFent

PecFent fih fentanyl, li hi medicina qawwija li ttaffi l-uġiġ magħrufa bħala opjojd li jtaffi l-uġiġ.

Għalxiex jintuża PecFent

PecFent jintuża f'persuni adulti li jkollhom kanċer, għal tip ta' wġiġ imsejjah uġiġ 'temporanju li jseħħ għal għarrieda'.

- Dan l-uġiġ temporanju jiġi għal għarrieda.
- Iseħħ anki meta tkun ħadt id-doża tas-soltu tal-opjojd li jtaffi l-uġiġ (bħal morfina, fentanyl, oxycodone jew hydromorphone) biex tikkontrolla l-uġiġ fl-isfond kostanti tiegħek.

PecFent għandu jintuża biss minn persuni adulti li jkunu diġà qed jieħdu medicini opjojdi oħra kuljum għall-uġiġ kostanti tal-kanċer tagħhom.

Kif jaħdem PecFent

PecFent hu soluzzjoni ta' sprej nażali.

- Meta tisprejja PecFent go imniehrek, il-qtar zġhar ħafna tal-isprej jiffurmaw gel irqiq.
- Fentanyl jiġi assorbit malajr minn ġol-kisja ta' mniehrek u fiċ-ċirkolazzjoni tad-demem.
- Dan ifisser li l-medicina tidhol malajr fis-sistema tiegħek biex ittaffi l-uġiġ temporanju li jseħħ għal għarrieda.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża PecFent

Tużax PecFent jekk:

- jekk inti allergiku għal fentanyl jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżzla fis-sezzjoni 6).
- jekk m'intix qed tuża b'mod regolari medicina opioid (eż codeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine) preskritta kuljum fuq skeda regolari, għal ta' l-inqas ġimgħa, għall-kontroll tal-uġiġ persistenti tiegħek. Jekk ma kontx qed tuża dawn il-medicini, **m'għandekx** tuża PecFent, minħabba li dan jista' jżid ir-riskju li n-nifs jista' jsir bil-mod u/jew baxx b'mod perikoluż, jew anki jieqaf.

- jekk issofri minn uġiġh li jdum għal tul ta' żmien qasir minbarra uġiġh li jinħass
- għandek problema serja biex tiegħu n-nifs jew problema fil-pulmun.
- jekk qed tingħata kura b'mediċini li fihom sodium oxybate.

Tużax PecFent jekk xi waħda minn dawn t'hawn fuq tapplika għalik. Jekk m'intix ċert, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Ahżen din il-mediċina f'post sikur u sigur fejn persuni oħrajn ma jistgħux jaċċessawha (ara sezzjoni 5. 'Kif taħzen PecFent' għal aktar informazzjoni).

Kif iżzomm PecFent biex ma jmissuhx it-tfal

- Għandek iżzomm PecFent għol-kontenitur rezistenti għat-tfal meta ma tkunx qed tużah, anki jekk tkun użajt it-2 sprejs kollha. Dan hu għax PecFent jista' jkun ta' periklu għall-hajja jekk jittiehed minn tifel/tifla b'mod aċċidentali.

Icċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek qabel tuża PecFent jekk:

- tkun ilek xi żmien ma tiegħu l-istess doża tal-mediċina opjojdi ta' kuljum għall-kura tal-uġiġh kostanti tiegħek
- ikollok problemi biex tiegħu n-nifs, bħal azzma, tharhir jew qtugħ ta' nifs
- taħbat rasek b'mod sever
- Jekk għandek problemi b'qalbek speċjalment rata tal-qalb bil-mod hafna
- għandek pressjoni tad-demmm baxxa jew ammont baxx ta' fluwidu fiċ-ċirkolazzjoni tiegħek
- jekk għandek problemi tal-fwied jew tal-kliewi. Dan hu minħabba li jista' jaffettwa l-mod li bih gismek jipproċessa l-mediċina.
- Jekk tiegħu antidipressanti jew antipsikotiċi, jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni '**Mediċini oħra u PecFent**'.

Jekk kwalunkwe minn dawn t'hawn fuq japplikaw għalik (jew jekk m'intix ċert), kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

- Jekk inti atleta, l-użu ta' PecFent jista' jirriżulta f'testijiet tad-doping li jkollhom riżultat pożittiv.

Ikkonsulta lit-tabib tiegħek waqt li qed tuża PecFent, jekk:

- tbatu minn hrug ta' demm rikorrenti mill-immieher - jista' jagħtik parir biex tuża kura alternattiva.
- tħoss li PecFent qed isir inqas effettiv biex jikkura l-episodji ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda
- ikollok uġiġh jew żieda fis-sensittività għall-uġiġh (iperallergija) li ma tirrispondix għal doża oġhla tal-mediċina tiegħek kif mogħtija b'riċetta mit-tabib tiegħek
- taħseb li qed issir dipendenti fuq PecFent
- ikollok tahlita tas-sintomi li ġejjin: dardir, rimettar, anoressija, għeja, dgħufija, sturdament u pressjoni tad-demmm baxxa. Flimkien, dawn is-sintomi jistgħu jkunu sinjal ta' kundizzjoni potenzjalment ta' periklu għall-hajja msejha insuffiċjenza adrenalni. Din hi kundizzjoni li fiha l-glandoli adrenalni ma jipproduċux biżżejjed ormoni
- qatt żviluppajt insuffiċjenza adrenalni jew nuqqas ta' ormoni tas-sess (defiċjenza ta' androgen) bl-użu tal-opjojdi

Użu fit-tul u tolleranza

Din il-mediċina fiha fentanyl li huwa mediċina oppjojde. L-użu ripetut ta' mediċini oppjojdi li jtaffu l-uġiġh jista' jirriżulta f'li l-mediċina tkun inqas effettiva (tidraha, magħrufa bħala tolleranza tal-mediċina). Tista' ssir aktar sensittiv għall-uġiġh waqt li tkun qed tuża PecFent. Dan huwa magħruf bħala iperalgija. Iż-żieda fid-doża ta' PecFent tista' tgħin sabiex ikompli jitnaqqas l-uġiġh tiegħek għal ftit żmien, iżda tista' tkun ta' ħsara wkoll. Jekk tinnota li l-mediċina tiegħek issir inqas effettiva,

kellem lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk huwiex aħjar għalik li żżid id-doża jew li tnaqqas gradwalment l-użu tiegħek ta' PecFent.

Dipendenza

L-użu ripetut ta' PecFent jista' jwassal ukoll għal dipendenza u abbuż li jistgħu jirriżultaw f' doża eċċessiva ta' periklu għall-hajja. Ir-riskju ta' dawn l-effetti sekondarji jista' jiżdied b' doża oġġla u tul ta' żmien itwal ta' użu. Id-dipendenza tista' gġiegħlek thoss li m'għadekx tikkontrolla kemm għandek bżonn tuża medicina jew kemm għandek bżonn tużaha ta' spiss. Tista' thoss li għandek bżonn tkompli tuża l-medicina tiegħek, anke meta ma tgħinx ittaffi l-uġiġh tiegħek.

Ir-riskju li persuna ssir dipendenti jvarja minn persuna għal oħra. Jista' jkollok riskju akbar li ssir dipendenti fuq PecFent jekk:

- inti jew xi hadd fil-familja tiegħek qatt abbuża jew kien dipendenti fuq l-alkoħol, medicini bir-riċetta jew medicina illegali (“dipendenza”).
- inti persuna li tpejjep.
- inti qatt kellek problemi bil-burdata tiegħek (dipressjoni, ansjetà jew disturb tal-personalità) jew ġejt ittrattat minn psikjatra għal mard mentali ieħor.

Jekk tinnota xi wiehed mis-sinjali li ġejjin waqt li qed tuża PecFent, jista' jkun sinjal li inti sirt dipendenti jew vizzjat.

- għandek bżonn tuża l-medicina għal żmien itwal minn dak irrakkomandat mit-tabib tiegħek
- għandek bżonn tuża aktar mid-doża rakkomandata
- qed tuża l-medicina għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk preskritti, pereżempju, “biex tibqa' kalm” jew “tgħinek torqod”
- għamilt tentattivi ripetuti, mingħajr suċċess biex tieqaf jew tikkontrolla l-użu tal-medicina
- meta tieqaf tiehu l-medicina thossok ma tiflaħx (eż. dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u hrug ta' għaraq), u thossok aħjar ladarba terġa' tuża l-medicina (“effetti tat-twaqqif”)

Jekk tinnota xi wiehed minn dawn is-sinjali, kellem lit-tabib tiegħek biex tiddiskuti l-aħjar mod ta' trattament għalik, inkluż meta jkun xieraq li tieqaf u kif tieqaf b' mod sikur.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

PecFent jista' jikkawża disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad bħal apnea tal-irqad (pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. Is-sintomi jistgħu jinkludu pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad, qawmien matul il-lejl minhabba qtugh ta' nifs, diffikultajiet biex tibqa' rieqed jew hedla eċċessiva matul il-gurnata. Jekk inti jew persuna oħra tosservaw dawn is-sintomi, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jikkunsidra li jnaqqas id-doża.

Tfal u adolexxenti

PecFent mhuwiex approvat għall-użu fi tfal taħt it-18-il sena.

Medicini oħra u PecFent

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qed tiehu, hadt dan l-aħħar jew tista' tiehu xi medicini oħra. B' mod partikulari, għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent, jekk qiegħed tiehu jew hadt dan l-aħħar kwalunkwe minn dawn il-medicini li ġejjin:

- medicini li jistgħu jraqqduk, bħal pilloli tal-irqad, kalmanti, medicini li jirilassaw il-muskoli, medicini għall-ansjetà bħal benzodiazepines (eż. diazepam), jew medicini għall-allergiji (anti-istamini). L-użu ta' PecFent fl-istess hin ma' medicini li jgħegħluk thossok bi nġhas iżid ir-riskju li jaqbdok in-nġhas, diffikultajiet biex tiehu n-nifs (tnaqqis respiratorju), koma u jista' jkun ta' periklu għall-hajja. **Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi wiehed minn dawn is-sintomi.** Għal din ir-raġuni, l-użu ta' PecFent flimkien mas-sedattivi għandu jiġi kkunsidrat biss meta ma jkunx hemm possibbiltà ta' għażla ta' kuri alternattivi. Madankollu, jekk it-tabib tiegħek jagħżel li jikteb riċetta għal PecFent flimkien ma' medicini sedattivi, id-doża u t-tul tal-kura għandhom ikunu determinati mit-tabib tiegħek. **Għid lit-tabib tiegħek dwar il-medicini sedattivi kollha li qed tiehu, u segwi l-istruzzjonijiet rigward id-doża li tak it-tabib tiegħek**

mill-qrib. Jista' jkun ta' benefiċċju jekk tinforma lill-hbieb jew qrafa biex joqogħdu attenti għas-sinjali u s-sintomi msemija hawn fuq.

- mediċini għad-dipressjoni msejha 'inibituri ta' monoamine-oxidase' (MAOI). Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk tkun ħadt mediċina MAOI matul l-aħħar ġimagħtejn qabel ma tuża PecFent.
Ir-riskju ta' effetti sekondarji jżdid jekk qiegħed tiegħu mediċini bħal ċerti antidipressanti jew antipsikotiċi. PecFent jista' jinteraġixxi ma' dawn il-mediċini u jista' jkollok bidliet fl-istat mentali (eż. agitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), u effetti oħra bħal temperatura tal-gisem oghla minn 38°C, żieda fir-rata tat-taħbita tal-qalb, pressjoni tad-demmi instabbli, u esagerazzjoni tar-riflessi, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea). It-tabib tiegħek se jgħidlek jekk PecFent huwiex tajjeb għalik.
- sprejs nażali għall-kura ta' mniefer misdud (li jkun fihom dikongestant bħal oxymetazoline)
- mediċini li jistgħu jaffettwaw il-modli ġismek jipproċessa PecFent. Dawn jinkludu:
 - mediċini għal infezzjoni bl-HIV (bħal ritonavir, nelfinavir, amprenavir jew fosamprenavir)
 - mediċini għal infezzjonijiet fungali (bħal ketoconazole, itraconazole jew fluconazole)
 - mediċini għal infezzjonijiet batterjali (bħal troleandomycin, clarithromycin jew erythromycin)
 - 'aprepitant' - jintuża biex ma jhallikx thossok imdardar
 - 'diltiazem' u 'verapamil' - jintużaw kontra pressjoni tad-demmi għolja jew problemi tal-qalb.
 - mediċini oħrajn kontra l-uġiġħ imsejha agonist/antagonist parzjali bħal buprenorphine, nalbuphine, pentazocine. Jista' jkollok sintomi ta' meta wieħed iwaqqaf il-mediċina (dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u għaraq) waqt li tkun qed tuża dawn il-mediċini.
 - xi painkillers għal uġiġħ fin-nervituri (gabapentin u pregabalin).

Jekk kwalunkwe minn dawn t'hawn fuq japplikaw għalik (jew jekk m'intix ċert), kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel ma tuża PecFent.

M'għandek tuża l-ebda tip ieħor ta' sprej nażali għal mill-inqas 15-il minuta wara li tuża PecFent.

PecFent ma' ikel u xorb

- Tixrobx alkoħol meta tkun qed tuża PecFent. Dan jista' jżid ir-riskju li jkollok effetti sekondarji serji.
- Tixrobx meraq tal-grejpfrut waqt li tkun qed tuża PecFent. Dan jista' jaffettwa l-mod li bih ġismek jipproċessa PecFent.

Tqala, treddiġ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tiegħu din il-mediċina.

- Tużax PecFent jekk inti tqila jew jekk tista' toħroġ tqila, hlief jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li tista' tużah.
- Tużahx PecFent waqt it-twelid tat-tarbija. Dan għaliex jista' jikkawża problemi lit-tarbija tiegħek biex tiegħu n-nifs.
- Tużax PecFent jekk tkun qed tredda'. Dan għaliex il-mediċina tista' tgħaddi ġol-halib tas-sider u tista' tikkawża effetti sekondarji fit-tarbija li tkun qed terda'.
- M'għandekx tibda t-treddiġ qabel 5 ijiem wara l-aħħar doża ta' PecFent.

Sewqan u thaddim ta' magni

- Kellem lit-tabib tiegħek dwar jekk hemmx xi periklu għalik li ssuq jew tuża għodda jew magni wara li tuża PecFent.
- Tista' thossok bi nġhas, stordut jew ikollok problemi tal-vista wara li tuża PecFent. Jekk dan jiġri, issuqx u tużax għodda jew magni.
- Issuqx u tużax tagħmir jew magni sakemm tkun taf kif din il-mediċina ser taffettwak.

PecFent fih propylhydroxybenzoate (E216)

Jista' jikkawża reazzjonijiet allergiċi (possibbilment li jseħhu wara ċertu żmien), u b'mod rari hafna, bronkospazmu (jekk inti ma tużax l-isprej nażali b'mod korrett).

3. Kif ghandek tuża PecFent

Qabel tibda t-trattament u regolarment matul it-trattament, it-tabib tiegħek se jiddiskuti wkoll miegħek x'tista' tistenna mill-użu ta' PecFent, meta u kemm ghandek bżonn toħodha, meta tikkuntattja lit-tabib tiegħek, u meta ghandek bżonn twaqqafha (ara wkoll sezzjoni 2).

Dejjem ghandek tuża din il-medicina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispizjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

PecFent jiġi f'żewġ qawwiet differenti: flixxun ta' 100 mikrogramma f'kull sprej u flixxun ta' 400 mikrogramma f'kull sprej. Aċċerta ruhek li tuża l-qawwa li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha.

Kemm ghandek tużah

- Doża biex tikkura episodju ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda tista' tkun jew ta' 1 sprej jew 2 sprejs (wiehed f'kull minfes). It-tabib tiegħek ser jgħidlek kemm sprejs (1 jew 2) ghandek tuża biex tikkura episodju ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda.
- **Tużax iktar mid-doża li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha biex tikkura kwalunkwe episodju wiehed ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda.**
- Tużax PecFent aktar minn 4 darbiet kuljum.
- Stenna mill-inqas 4 sigħat biex tieħu d-doża ta' PecFent li jkun imiss.

Doża tal-bidu

- Id-doża tal-bidu hi ta' 100 mikrogramma.
- Din tkun sprej wiehed ġo minfes wiehed mill-flixxun ta' 100 mikrogramma f'kull sprej.
- Ara 'Kif tuża l-flixxun ta' PecFent' għal istruzzjonijiet dwar kif tuża doża.

Kif issib id-doża korretta

- Imbagħad, it-tabib tiegħek ser jgħinek issib id-doża korretta biex ittaffi l-uġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda. Hu importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet tat-tabib tiegħek.
- Għid lit-tabib tiegħek dwar l-uġiġh li jkollok u kif PecFent qed jaħdem. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk hemmx bżonn li d-doża tiegħek ta' PecFent għandhiex tinbidel.
- Tibdilx id-doża inti stess.


Meta tkun sibt id-doża korretta

- Għid lit-tabib tiegħek jekk id-doża tiegħek ta' PecFent ma ttaffix l-uġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk hemmx bżonn li d-doża tiegħek tinbidel. **Tibdilx id-doża ta' PecFent jew tal-medicini l-oħra tiegħek kontra l-uġiġh inti stess.**
- Għid lit-tabib tiegħek immedjatment jekk ikollok iktar minn 4 episodji kuljum ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda. It-tabib tiegħek jista' jibdel il-medicina għall-uġiġh kostanti tiegħek. Galadarba l-uġiġh kostanti tiegħek jiġi kkontrollat, it-tabib tiegħek jista' mbagħad jibdel id-doża tiegħek ta' PecFent.

Jekk m'intix ċert dwar id-doża korretta jew kemm PecFent ghandek tuża, staqsi it-tabib tiegħek.

Kif tuża l-flixxun ta' PecFent

Istruzzjonijiet dwar kif tiftah u taghlaq il-kontenitur rezistenti ghat-tfal





Kif tipprepara l-flixxun ta' PecFent għall-użu

Qabel ma tuża flixxun ġdid ta' PecFent jehtieg li tipprepara għall-użu. Dan jissejjaħ 'priming'. Huwa rrakkomandat li inti tipprajmja l-flixxun minnufih qabel l-użu milli minn qabel. (Nota: Dan il-flixxun b'2 sprejs ma jistax jerga' jiġi pprajmjat. Jekk l-isprej ma jkunx intuża fi żmien 5 ijiem wara l-prajming, il-flixxun għandu jintrema.)

Biex tipprajmja l-flixxun, jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet t'hawn taht:

1. Flixxun ġdid ta' PecFent ser juri żewġ linji homor fil-counting window fit-top abjad tal-plastik fuq il-flixxun (Figura 1 u Figura 3a).
2. Nehhi l-għatu protettiv abjad tal-plastik minn fuq in-nozzle (Figura 1).
3. Immira l-isprej nażali lil hemm minnek (u lil hemm minn kwalunkwe nies oħra).
4. Żomm l-isprej nażali PecFent iħares 'il fuq bis-saba' l-kbir fuq il-qiegħ tal-flixxun u sebgħek il-verrej u dak tan-nofs fuq il-finger grips fuq kull naħa tan-nozzle (Figura 2).
5. Aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-finger grips sakemm tisma' 'klikk' u mbagħad erħi l-grips (Figura 2). Ser tisma' t-tieni 'klikk' u issa għandu jkun hemm bar waħda kbira hamra fil-counting window (Figura 3b).
6. Irrepeti pass 5 tliet darbiet. Kif tkun qed tirrepeti pass 5, il-bar hamra ser tiċkien kontinwament sakemm tara tara bar hadra fil-counting window (Figura 3b-e). Il-bar hadra tfisser li PecFent sprej nażali jkun lest biex jintuża.
7. Imsah in-nozzle b'tissue u ifflaxxa t-tissue fit-tojlit.





Kif tuża PecFent

PecFent ghandu jintuża biss billi tisprejja ġol-minfes tiegħek.

1. Iċċekkja li jkun hemm bar ħadra jew numru fil-counting window (Figura 4): dan jikkonferma li l-flixxkun ta' PecFent ikun ġie ipprajmjat (ara 'Kif tipprepara l-flixxkun ta' PecFent għall-użu' hawn fuq).
2. Naddaf imniehrek jekk thoss li għandek tagħmel dan.
3. Oqgħod bilqiegħda b'rasek thares 'il fuq.
4. Nehhi l-għatu protettiv minn fuq iż-żennuna.
5. Żomm il-flixxkun ta' PecFent bis-saba' l-kbir fuq il-qiegħ tal-flixxkun u sebgħek il-werrej u dak tan-nofs fuq il-finger grips (Figura 4).
6. Poġġi ż-żennuna ftit 'il ġewwa (madwar 1 ċm) ġol-minfes tiegħek. Ippuntah 'il ġewwa lejn il-ġenb ta' mniehrek. Dan ser imejjel il-flixxkun bi ftit (Figura 5).
7. Aghlaq il-minfes l-iehor b'seba' minn idek l-oħra (Figura 5).
8. Aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-finger grips biex b'hekk PecFent jisprejja ġol-minfes tiegħek. Meta tisma' klikk, erħi l-grips. Innota: Tista' ma thoss xejn jġri f'imniehrek – taħsibx li dan ifisser li l-isprej ma ħadimx – afda fuq il-klikk u number counter.
9. Hu n-nifs bil-mod 'il ġewwa minn go mniehrek u 'l barra minn go ħalqek.
10. In-number counter ser javvanza wara kull użu u juri kemm sprejs ikunu ntuzaw.
11. Jekk it-tabib tiegħek ikun tak riċetta għal sprej iehor, irrepeti passi 5 sa 9, billi tuża l-minfes l-iehor.

Tużax iktar mid-doża li t-tabib tiegħek ikun tak riċetta għaliha biex tikkura kwalunkwe episodju wiehed ta' wġiġh.

12. Poġġi l-flixxkun lura ġol-kontenitur rezistenti għat-tfal wara kull użu. Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal (Figura 6)
13. Oqgħod bilqiegħda għal mill-inqas minuta wara li tuża l-isprej nażali.



Numru ta' sprejs f'dan il-flixxkun ta' PecFent

Hemm 2 sprejs sħaħ f'kull flixxkun ta' PecFent

- Wara l-ewwel sprej, in-numru 1 ser tidher fil-counting window. Dan ser javvanza kull darba li jintuża l-isprej. Dan jitle' għan-numru 2 meta l-isprej jerga' jintuża.
- Meta tara 2 aħmar fil-counting window, il-flixxkun ikun spiċċa u mhux se tkun tista' tieħu sprej sħiħ minnu aktar.

Kif tarmi PecFent mhux użat

Jekk tara numru, minbarra 2 fil-counting window, ikun għadek **MA UŻAJTX** it-2 sprejs kollha fil-flixxkun. Ikun għad fadal doži ta' PecFent ġol-flixxkun.

Trid tiżvojta d-doži ta' PecFent li jkun fadal minn ġol-flixxkun billi timmira l-isprej nażali 'l bogħod minnek (u minn kwalunkwe nies) u billi tagħfas u terħi l-grips sakemm in-numru "2" aħmar jidher fil-counting window.

Meta tara n-numru "2" fil-counting window, xorta jkun għad fadal il-mediċina ġol-flixxkun li inti trid tbattal.

- Ser ikollok bżonn tagħfas 'l isfel u terħi l-finger grips 4 darbiet aktar waqt li timmira l-isprej nażali 'l bogħod minnek (u minn kwalunkwe nies oħrajn).
- Ser thoss zieda żgħira fir-reżistenza meta tagħfas 'l isfel u l- imqabad tas-swaba ser jiċċaqilqu ffit biss.
- **M'INTIX** ser tisma' klikk meta tagħfas 'l isfel.
- Il-counter ser jibqa' fuq in-numru "2".
- Poġġi l-għatu protettiv lura fuq il-flixxkun tal-isprej.
- Poġġi l-flixxkun lura ġol-kontenitur reżistenti għat-tfal.
- Kellem lill-ispizjerija lokali tiegħek dwar ir-rimi ta' fliexen vojta (ara '**Kif taħzen PecFent**')

Jekk l-isprej nażali PecFent ikun imblukkat jew ma jisprejjax kif suppost

- Jekk l-isprej ikun imblukkat, immira l-isprej lil hemm minnek (u lil hemm minn kwalunkwe nies oħra) u aghfas 'l isfel b'mod sod fuq il-pompa. Dan għandu jneħhi kwalunkwe imblukkar.
- Jekk l-isprej nażali tiegħek xorta jibqa' ma jahdimx kif suppost, armi l-flixxkun li jkun fih il-ħsara u ibda wiehed ġdid. Għid lit-tabib tiegħek x'għara. **Qatt m'għandek tipprowa tirroranġa l-isprej nażali inti stess jew iżzarmah.** Dan għax jista' jkun li mbağħad jağhtik doża ħażina.

Armi l-flixxkun ta' PecFent u ibda wiehed ġdid jekk:

- Ikunu għaddew aktar minn 5 ijiem minn meta tkun ipprajmjajt il-flixxkun tiegħek għall-ewwel darba.

Jekk tuża PecFent aktar milli suppost

- Tista' thossok bi ngħas, imdardar, stordut jew tieħu n-nifs bil-mod jew bil-ħatfa. F'każijiet gravi t-tehid iżżejjed ta' PecFent jista' jwassal ukoll għal koma. Jekk thossok stordut ħafna, bi ngħas ħafna jew tieħu n-nifs bil-ħatfa, ċempel għal ambulanza jew għid lil xi hadd iehor biex iċempel immedjatment.
- Doża eċċessiva tista' tirriżulta wkoll f'disturb tal-moħħ magħruf bħala lewkoenċefalopatija tossika.

Jekk tieqaf tuża PecFent

Jekk ma jkollokx aktar uġiġħ temporanju li jseħħ għal għarrieda, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma twaqqaf PecFent u segwi l-parir tiegħu/tagħha. Madankollu, għandek tkompli tieħu l-mediċina opjoidi l-oħra tiegħek biex tikkura l-uġiġħ kostanti tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jiċċekkja d-doża.

Jista' jkollok sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina simili għall-effetti sekondarji possibbli ta' PecFent meta twaqqaf PecFent. Jekk ikollok sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jevalwa jekk hux se jkollok bżonn il-mediċina biex tnaqqas jew telimina s-sintomi ta' meta tieqaf tieħu l-mediċina.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

Ċempel għal ambulanza jew għid lil xi hadd iehor biex iċempel immedjatment jekk:

- thossok stordut hafna jew ikun ser ihossok hażin
- thossok bi nghan hafna
- tieħu n-nifs bil-mod jew bil-hatfa
- ikollok ġilda kiesħa mdellka, tidher musfar, ikollok polz dgħajjed jew sinjali oħrajn ta' xokk.

Jekk inti jew il-persuna li qed tieħu ħsiebek tiegħek tinnotaw kwalunkwe mill-effetti sekondarji msemmija hawn fuq, ċemplu għal ambulanza immedjatment.

Effetti sekondarji komuni (jistghu jaffettwaw minn 1 sa 10 persuni):

- ma tkunx taf fejn int (dizorjament)
- tibdil fis-sens tat-togħma
- thossok stordut
- thossok imdardar jew tirremetti
- thossok bi nghan, uġiġħ ta' ras
- tinfaṛaġ, skonfort fl-immieħer (bħal sensazzjoni ta' ħruq fl-immieħer), immieħer inixxi
- stitikezza,
- ħakk fil-ġilda

Effetti sekondarji mhux komuni (jistghu jaffettwaw minn 1 sa 100 persuna):

- infezzjoni fis-sider
- gerżuma jew immieħer bl-uġiġħ, misluħin jew infjammati
- sogħla, għatis, katarru jew riħ, tibdil fil-fluwidu prodott minn immieħrek
- reazzjoni allergika, raxx
- telf ta' jew żieda fl-aptit, żieda fil-piż
- deidratazzjoni, thossok bil-għatx
- tuża hażin il-medicina
- tara jew tisma' affarijiet li mhumiex hemm fil-verità (allucinazzjonijiet/delirju), thossok konfuż
- thossok dipress, inkwetat, taġixxi bil-mod jew nervuż
- nuqqas ta' koncentrazzjoni jew żieda fl-attività fizika
- telf ta' memorja
- thossok "ewforiku"
- tkun inqas konxju jew tirreagixxi bil-mod, tintilef minn sensik
- konvulzjoni (aċċessjonijiet)
- konvulzjonijiet fil-muskoli jew roġħda
- telf fis-sens tat-togħma, telf jew tibdil fis-sens tax-xamm
- diffikultà biex titkellem
- kulur blu tal-ġilda
- mejt, taqa', telqa
- sħana u ċirkolazzjoni ma jaħdmux kif suppost, fwawar jaħarqu jew deni, tertir ta' bard, għaraq eċċessiv
- nefħa tat-tessut artab
- pressjoni tad-demem baxxa
- imblukkar fil-pajp tan-nifs
- qtugħ ta' nifs
- ħruġ ta' demem mill-vaġina
- tiċrita fl-imsaren jew infjammazzjoni fil-kisja tal-istonku
- tmewwit jew tmemnim fil-halq, fl-ilsien jew fl-immieħer, jew problemi oħra fl-ilsien, ulċeri tal-halq, halq xott
- dijarea
- dardir, uġiġħ fl-istonku, indigestjoni
- uġiġħ jew dulur fil-ġogi
- diffikultà biex, jew ma tkunx tkunx kapaċi taġħmel l-awrina
- uġiġħ fis-sider
- thossok għajjen jew dgħajjed, problemi biex tiċċaqlaq

- tibdil fiċ-ċelluli tad-demem (osservat mit-testijiet tal-laboratorju)
- Żieda ta' zokkor fid-demem
- Proteina fil-awrina

Effetti sekondarji oħra (frekwenza mhux magħrufa (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli))

- problemi severi biex tiegħu n-nifs
- fwawar
- Nuqqas ta' rqaq
- Sindrome ta' meta wieħed iwaqqaf il-medicina (dan jista' jidher permezz tal-effetti sekondarji li għejjin: dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roghda, u għaraq).
- tolleranza għall-medicina, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga (ara sezzjoni 2)

It-trattament fit-tul b'fentanyl waqt it-tqala jista' jikkawża sintomi ta' meta wieħed jieqaf jiegħu l-medicina fit-tarbija tat-twelid, u dan jista' jkun ta' periklu għall-ħajja (ara sezzjoni 2).

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellek lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen PecFent

Żomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlahaqx mit-tfal. PecFent jista' jkun ta' periklu għall-ħajja jekk jittiehed minn tifel/tifla b' mod aċċidentali.

Aħzen din il-medicina f' post sikur u sigur fejn il-persuni l-oħra ma jkunux jistgħu jaċċessawha. Tista' tikkawża ħsara serja u tkun fatali għal nies li jistgħu jieħdu din il-medicina bi żball, jew intenzjonalment meta ma tkunx ingħatat riċetta għalihom.

- Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-flixxun wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.
- Taħzinx PecFent f'temperatura 'l fuq minn 25°C.
- Tagħmlux fil-friża.
- Żomm il-flixxun fil-kontenitur rezistenti għat-tfal sabiex tilqa' mid-dawl.
- Aħzen il-flixxun ta' PecFent fil-kontenitur rezistenti għat-tfal il-ħin kollu, anki meta jispiċċa.
- Tużax għal aktar minn 5 jum wara l-ewwel użu (jew priming jew tużah biex tikkura episodju ta' wġiġh temporanju li jseħh għal għarrieda)
- PecFent li jkun skada jew li ma jkunx meħtieġ aktar, jista' xorta jibqa' fih biżżejjed medicina li tista' tkun ta' ħsara għal nies oħrajn, speċjalment it-tfal. PecFent m'għandux jintrema ma' l-ilma tad-dranagg jew ma' l-iskart domestiku. Kwalunkwe PecFent mhux mixtieq għandu jintrema malajr kemm jista' jkun billi ssegwi l-istruzzjonijiet li hemm taħt ***Kif tarmi PecFent mhux użat***. Kwalunkwe fliexken vojta għandhom jitpoġġew lura fil-kontenituri tagħhom rezistenti għat-tfal u jintremew billi teħodhom lura l-ispizzerija jew skont ir-rekwiziti lokali.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih PecFent

Is-sustanza attiva hi fentanyl.

- *PecFent 100 mikrogramma/sprej soluzzjoni ta' sprej nażali*
Kull mL ta' soluzzjoni fih 1,000 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).
1 sprej (100 mikrolitri) fih 100 mikrogramma fentanyl (bħala citrate).

Is-sustanzi mhux attivi l-oħra (eċċipjenti) huma: pectin (E440), mannitol (E421), phenylethyl alcohol, propyl parahydroxybenzoate (E216), sucrose, ilma ppurifikat u hydrochloric acid jew sodium hydroxide għal aġġustament tal-pH.

Kif jidher PecFent u l-kontenut tal-pakkett

Il-medicina hi sprej nażali, soluzzjoni, minn ċara sa kważi ċara u bla kulur. Tinsab fi flixxun ta' ħgieg ċar, mgħammar b'pompa metering. Il-pompa għandha spray counter li jikklikkja, biex b'hekk tkun tista' tisma' kif ukoll tara li l-isprej ikun ingħata, u għatu protettiv. Wara li l-flixxun ta' PecFent ikun gie pprajmjat (ippreparat għall-użu), dan iforni 2 sprejs shaħ. Kull flixxun ta' PecFent hu fornut f'kontenitur rezistenti għat-tfal.

Il-fliexken PecFent ta' 2 sprejs fil-kontenituri tagħhom rezistenti għat-tfal huma fornuti f'kartuniet li jkun fihom flixxun wieħed.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6
52078 Aachen
Il-Ġermanja

Manifattur

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A
Strada Statale 67 Tosco Romagnola,
Fraz. Granatieri – 50018 Scandicci (FI)
L-Italja

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħhar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini: <http://www.ema.europa.eu>.