

**VEDLEG I**  
**PREPARATOMTALE**

## 1. LEGEMIDLETS NAVN

EDURANT 25 mg filmdrasjerte tabletter

## 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder rilpivirinhydroklorid tilsvarende 25 mg rilpivirin.

Hjelpestoff med kjent effekt: hver filmdrasjerte tablett inneholder 56 mg laktosemonohydrat.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

## 3. LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert

Hvit til offwhite, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett med diameter på 6,4 mm, preget med "TMC" på den ene siden og "25" på den andre siden.

## 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

### 4.1 Indikasjoner

EDURANT, i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler, er indisert ved behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus type 1 (HIV-1-infeksjon) hos antiretroviral behandlingsnaïve pasienter som er 12 år eller eldre med virusmengde  $\leq 100\ 000$  HIV-1-RNA kopier/ml.

Genotypisk resistenstesting bør være veiledende for bruk av EDURANT (se pkt. 4.4 og 5.1).

### 4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen bør startes av lege med erfaring innen behandling av HIV-infeksjon.

#### Dosering

Den anbefalte dosen av EDURANT er én 25 mg tablett tatt én gang daglig. EDURANT **skal tas sammen med et måltid** (se pkt. 5.2).

#### *Dosejustering*

Hos pasienter som får rifabutin samtidig, bør dosen av EDURANT økes til 50 mg (to 25 mg tabletter) tatt én gang daglig. Dersom samtidig bruk av rifabutin avbrytes, bør dosen av EDURANT reduseres til 25 mg tatt én gang daglig (se pkt. 4.5).

#### *Glemt dose*

Hvis en pasient har glemt en dose av EDURANT og det ikke er gått mer enn 12 timer fra tidspunktet den vanligvis tas, skal pasienten ta legemidlet sammen med et måltid så snart som mulig og deretter fortsette med vanlig doseringsplan. Hvis en pasient har glemt en dose av EDURANT og det er gått mer enn 12 timer, skal pasienten ikke ta den glemte dosen, men fortsette med vanlig doseringsplan.

Hvis en pasient kaster opp innen 4 timer etter inntak av legemidlet, bør en ny tablett EDURANT tas sammen med et måltid. Hvis en pasient kaster opp mer enn 4 timer etter inntak av legemidlet behøver ikke pasienten ta en ny dose med EDURANT før det er tid for den neste, planlagte dosen.

## Spesielle populasjoner

### *Eldre*

Det er begrenset informasjon om bruk av EDURANT hos pasienter > 65 år. Dosejustering av EDURANT er ikke nødvendig hos eldre pasienter (se pkt. 5.2). EDURANT bør brukes med forsiktighet hos denne populasjonen.

### *Nedsatt nyrefunksjon*

EDURANT har primært blitt undersøkt hos pasienter med normal nyrefunksjon. Dosejustering av rilpivirin er ikke nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom bør rilpivirin brukes med forsiktighet. Hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom bør kombinasjonen av rilpivirin og en sterk CYP3A-hemmer (f.eks. ritonavir-forsterket HIV-proteasehemmer) kun brukes dersom nytten oppveier risikoen (se pkt. 5.2).

Behandling med rilpivirin resulterte i en tidlig liten økning av gjennomsnittlige kreatininnivåer i serum som holdt seg stabile over tid og som ikke anses som klinisk relevant (se pkt. 4.8).

### *Nedsatt leverfunksjon*

Det er begrenset informasjon om bruk av EDURANT hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad A eller B). Dosejustering av EDURANT er ikke nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. EDURANT bør brukes med forsiktighet hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. EDURANT er ikke undersøkt hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad C). EDURANT er derfor ikke anbefalt hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (se pkt. 5.2).

### *Pediatrik populasjon*

Sikkerhet og effekt av EDURANT hos barn i alderen < 12 år har enda ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

## Administrasjonsmåte

EDURANT skal tas oralt, én gang daglig **sammen med et måltid** (se pk. 5.2). Det anbefales at de filmdrasjerte tablettene svelges hele med vann og at tablettene ikke tygges eller knuses.

## **4.3 Kontraindikasjoner**

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

EDURANT bør ikke administreres samtidig med følgende legemidler da det kan oppstå signifikant reduksjon i rilpivirins plasmakonsentrasjon (på grunn av CYP3A-enzyminduksjon eller økt pH i ventrikkelen), som kan medføre tap av terapeutisk effekt av EDURANT (se pkt. 4.5):

- antikonvulsiva som karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin
- antimykobakterielle midler som rifampicin, rifapentin
- protonpumpehemmere som omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol
- det systemiske glukokortikoidet deksametason (unntatt enkeltdosebehandling)
- johannesurt (*Hypericum perforatum*).

## **4.4 Advarsler og forsiktighetsregler**

Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for seksuell overføring av HIV-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas i henhold til nasjonale retningslinjer.

### Virologisk svikt og resistensutvikling

EDURANT har ikke blitt undersøkt hos pasienter med tidligere virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling. Oversikten over rilpivirinresistens-assosierte mutasjoner som er vist i pkt. 5.1, bør kun være veiledende for bruk av EDURANT i den behandlingsnaive populasjonen.

I analysen av sammenslåtte effektdata fra fase-III studiene hos voksne over 96 uker, hadde pasienter behandlet med rilpivirin med baseline virusmengde > 100 000 HIV-1-RNA kopier/ml, en økt risiko for virologisk svikt (18,2 % med rilpivirin vs. 7,9 % med efavirenz) sammenlignet med pasienter med baseline virusmengde ≤ 100 000 HIV-1-RNA kopier/ml (5,7 % med rilpivirin vs. 3,6 % med efavirenz). Større risiko for virologisk svikt hos pasientene i rilpiviringruppen ble observert i de første 48 ukene av studiene (se pkt. 5.1). Pasienter med baseline virusmengde > 100 000 HIV-1-RNA kopier/ml som fikk virologisk svikt, utviste en høyere forekomst av resistens overfor klassen av ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere (NNRTI-klassen) som følge av behandling. Det var flere pasienter som fikk virologisk svikt med rilpivirin som også utviklet lamivudin/emtricitabin-assosiert resistens sammenlignet med dem som fikk virologisk svikt med efavirenz (se pkt. 5.1).

Funn hos ungdom (12 til under 18 år) i studie C213 samsvarte generelt med disse data (for detaljer, se pkt. 5.1).

Kun ungdom som antas å ha god etterlevelse ved antiretroviral behandlingen bør behandles med rilpivirin, da suboptimal etterlevelse kan medføre resistensutvikling og mangel på fremtidige behandlingsalternativer.

Som for andre antiretrovirale legemidler bør resistenstesting være veiledende for bruk av rilpivirin (se pkt. 5.1).

#### Kardiovaskulært

Ved supra-terapeutiske doser (75 og 300 mg én gang daglig) har rilpivirin blitt assosiert med forlengelse av QTc-intervallet ved elektrokardiogram (EKG) (se pkt. 4.5, 4.8 og 5.2). Ved den anbefalte dosen på 25 mg er ikke EDURANT assosiert med klinisk relevant effekt på QTc. EDURANT bør brukes med forsiktighet ved samtidig administrasjon med legemidler med kjent risiko for Torsade de Pointes.

#### Immunt reaktiveringssyndrom

Hos HIV-smittede pasienter som har alvorlig immunsvikt ved oppstart av CART, kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon overfor asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener og påfølgende alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er vanligvis observert de første ukene eller månedene etter oppstart av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirusretinit, generaliserte og/eller fokale mykobakterielle infeksjoner og pneumoni forårsaket av *Pneumocystis jirovecii*. Ethvert symptom på betennelse bør undersøkes og behandling igangsettes om nødvendig.

Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart (se pkt. 4.8).

#### Viktig informasjon om noen av innholdsstoffene i EDURANT

EDURANT inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

### **4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon**

#### Legemidler som påvirker rilpivirineksponering

Rilpivirin metaboliseres hovedsakelig av cytokrom P450 (CYP) 3A. Legemidler som inducerer eller hemmer CYP3A kan derfor påvirke clearance av rilpivirin (se pkt. 5.2). Samtidig bruk av rilpivirin og legemidler som inducerer CYP3A er vist å redusere plasmakonsentrasjonen av rilpivirin, noe som kan redusere den terapeutiske effekten til rilpivirin.

Samtidig bruk av rilpivirin og legemidler som hemmer CYP3A er vist å øke plasmakonsentrasjonen av rilpivirin.

Samtidig bruk av rilpivirin og legemidler som øker ventrikkelens pH kan medføre redusert plasmakonsentrasjon av rilpivirin, noe som kan redusere den terapeutiske effekten til EDURANT.

### Legemidler som påvirkes av bruk av rilpivirin

Det er lite sannsynlig at rilpivirin i en dose på 25 mg én gang daglig vil ha noen klinisk relevant effekt på eksponeringen for legemidler som metaboliseres av CYP-enzymmer.

Rilpivirin hemmer P-glykoprotein *in vitro* (IC<sub>50</sub> er 9,2 µM). I en klinisk studie påvirket ikke rilpivirin digoksins farmakokinetikk signifikant. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at rilpivirin kan øke eksponeringen for andre legemidler som transporteres av P-glykoprotein og er mer følsomme for intestinal P-gp-hemming, f.eks. dabigatran eteksilat.

Rilpivirin er en hemmer av transportøren MATE-2K *in vitro* med IC<sub>50</sub> < 2,7 nM. De kliniske implikasjonene av dette funnet er per i dag ukjente.

Bekreftede og teoretiske interaksjoner med utvalgte antiretrovirale og ikke-antiretrovirale legemidler er presentert i tabell 1.

### Interaksjonstabell

Interaksjonsstudier har kun blitt utført hos voksne.

Interaksjoner mellom rilpivirin og legemidler som gis samtidig er presentert i tabell 1 (økning er angitt som “↑”, reduksjon som “↓”, ingen endring som “↔”, ikke relevant som “NA”, konfidensintervall som “KI”).

<b>Tabell 1: INTERAKSJONER OG DOSEANBEFALINGER SAMMEN MED ANDRE LEGEMIDLER</b>		
<b>Legemidler etter terapeutisk område</b>	<b>Interaksjon Endring i geometrisk gjennomsnitt (%)</b>	<b>Anbefalinger vedrørende samtidig bruk</b>
<b>ANTIINFEKTIVA</b>		
<b>Antiretrovirale midler</b>		
<i>HIV NRTIs/N[t]RTIs</i>		
Didanosin* <sup>#</sup> 400 mg én gang daglig	didanosin AUC ↑ 12 % didanosin C <sub>min</sub> NA didanosin C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↔ rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig. Didanosin skal tas minst to timer før eller minst fire timer etter rilpivirin.
Tenofovirdisoproksil-fumarat* <sup>#</sup> 300 mg én gang daglig	tenofovir AUC ↑ 23 % tenofovir C <sub>min</sub> ↑ 24 % tenofovir C <sub>max</sub> ↑ 19 % rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↔ rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
Andre NRTIs (abakavir, emtricitabin, lamivudin, stavudin og zidovudin)	Ikke undersøkt. Ingen klinisk relevante legemiddelinteraksjoner er forventet.	Dosejustering er ikke nødvendig.
<i>HIV NNRTIs</i>		
NNRTIs (delavirdin, efavirenz, etravirin, nevirapin)	Ikke undersøkt.	Det er ikke anbefalt å bruke rilpivirin sammen med andre NNRTIs.
<i>HIV PIs – brukt sammen med en lav dose ritonavir</i>		
Darunavir/ritonavir* <sup>#</sup> 800/100 mg én gang daglig	darunavir AUC ↔ darunavir C <sub>min</sub> ↓ 11 % darunavir C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↑ 130 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↑ 178 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 79 %  (hemming av CYP3A-enzymmer)	Samtidig bruk av rilpivirin og ritonavir-forsterkede PIs medfører økt plasmakonsentrasjon av rilpivirin, men dosejustering er ikke nødvendig.

Lopinavir/ritonavir (myk gelkapsel)*# 400/100 mg to ganger daglig	lopinavir AUC ↔ lopinavir C <sub>min</sub> ↓ 11 % lopinavir C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↑ 52 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↑ 74 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 29 %  (hemming av CYP3A-enzymet)	
Andre forsterkede PIs (atazanavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, sakonavir/ritonavir, tipranavir/ritonavir)	Ikke undersøkt.	
<b>HIV PIs – uten samtidig bruk av en lav dose ritonavir</b>		
Uforsterkede PIs (atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir)	Ikke undersøkt. Økt eksponering av rilpivirin er forventet.  (hemming av CYP3A-enzymet)	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>CCR5-antagonister</b>		
Maraviroc	Ikke undersøkt. Ingen klinisk relevante legemiddelinteraksjoner er forventet.	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>HIV Integraseoverføringshemmere</b>		
Raltegravir*	raltegravir AUC ↑ 9 % raltegravir C <sub>min</sub> ↑ 27 % raltegravir C <sub>max</sub> ↑ 10 % rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↔ rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>Andre antivirale midler</b>		
Ribavirin	Ikke undersøkt. Ingen klinisk relevante legemiddelinteraksjoner er forventet.	Dosejustering er ikke nødvendig.
Telaprevir* 750 mg hver 8. time	telaprevir AUC ↓ 5 % telaprevir C <sub>min</sub> ↓ 11 % telaprevir C <sub>max</sub> ↓ 3 % rilpivirin AUC ↑ 78 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↑ 93 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 49 %	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>ANDRE LEGEMIDLER</b>		
<b>ANTI-KONVULSIVA</b>		
Karbamazepin Okskarbazepin Fenobarbital Fenytoin	Ikke undersøkt. Signifikant reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Rilpivirin må ikke brukes sammen med disse antikonvulsiva da samtidig bruk kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3).
<b>ANTIMYKOTIKA AV AZOLTYPEN</b>		
Ketokonazol*# 400 mg én gang daglig	ketokonazol AUC ↓ 24 % ketokonazol C <sub>min</sub> ↓ 66 % ketokonazol C <sub>max</sub> ↔  (Induksjon av CYP3A på grunn av høy rilpivirin-dose i studien)  rilpivirin AUC ↑ 49 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↑ 76 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 30 %  (hemming av CYP3A-enzymet)	Ved den anbefalte dosen på 25 mg én gang daglig er ikke dosejustering nødvendig når rilpivirin brukes samtidig med ketokonazol.

Flukonazol Itrakonazol Posakonazol Vorikonazol	Ikke undersøkt. Samtidig bruk av EDURANT og antimykotika av azoltypen kan medføre økt plasmakonsentrasjon av rilpivirin.  (hemming av CYP3A-enzymet)	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>ANTIMYKOBACTERIELLE MIDLER</b>		
Rifabutin* 300 mg én gang daglig <sup>†</sup>  300 mg én gang daglig (+ 25 mg én gang daglig rilpivirin)  300 mg én gang daglig (+ 50 mg én gang daglig rilpivirin)	rifabutin AUC ↔ rifabutin C <sub>min</sub> ↔ rifabutin C <sub>max</sub> ↔ 25-O-desacetyl-rifabutin AUC ↔ 25-O-desacetyl-rifabutin C <sub>min</sub> ↔ 25-O-desacetyl-rifabutin C <sub>max</sub> ↔  rilpivirin AUC ↓ 42 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↓ 48 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↓ 31 %  rilpivirin AUC ↑ 16 %* rilpivirin C <sub>min</sub> ↔* rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 43 %*  * sammenlignet med 25 mg én gang daglig av rilpivirin alene  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Ved samtidig bruk av rilpivirin og rifabutin bør dosen av rilpivirin økes fra 25 mg én gang daglig til 50 mg én gang daglig. Dersom samtidig bruk av rifabutin avbrytes, bør dosen av rilpivirin reduseres til 25 mg én gang daglig.
Rifampicin*# 600 mg én gang daglig	rifampicin AUC ↔ rifampicin C <sub>min</sub> NA rifampicin C <sub>max</sub> ↔ 25-desacetyl-rifampicin AUC ↓ 9 % 25-desacetyl-rifampicin C <sub>min</sub> NA 25-desacetyl-rifampicin C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↓ 80 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↓ 89 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↓ 69 %  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Rilpivirin må ikke brukes sammen med rifampicin da samtidig bruk sannsynligvis kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3).
Rifapentin	Ikke undersøkt. Signifikant reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Rilpivirin må ikke brukes sammen med rifapentin da samtidig bruk sannsynligvis kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3).
<b>MAKROLIDANTIBIOTIKA</b>		
Klaritromycin Erytromycin	Ikke undersøkt. Økt eksponering av rilpivirin er forventet.  (hemming av CYP3A-enzymet)	Hvis mulig, bør alternativer som azitromycin vurderes.
<b>GLUKOKORTIKOIDER</b>		
Deksametason (systemisk, unntatt som en enkeltdose)	Ikke undersøkt. Doseavhengig reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Rilpivirin bør ikke brukes sammen med systemisk deksametason (unntatt som en enkeltdose) da samtidig bruk kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3). Alternativer bør vurderes, spesielt ved langtidsbruk.

<b>PROTONPUMPEHEMMERE</b>		
Omeprazol* <sup>#</sup> 20 mg én gang daglig	omeprazol AUC ↓ 14 % omeprazol C <sub>min</sub> NA omeprazol C <sub>max</sub> ↓ 14 % rilpivirin AUC ↓ 40 % rilpivirin C <sub>min</sub> ↓ 33 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↓ 40 %  (redusert absorpsjon på grunn av økt pH i ventrikkelen)	Rilpivirin må ikke brukes sammen med protonpumpehemmere da samtidig bruk sannsynligvis kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3).
Lansoprazol Rabeprazol Pantoprazol Esomeprazol	Ikke undersøkt. Signifikant reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (redusert absorpsjon på grunn av økt pH i ventrikkelen)	
<b>H<sub>2</sub>-RESEPTORANTAGONISTER</b>		
Famotidin* <sup>#</sup> 40 mg enkeltdose tatt 12 timer før rilpivirin	rilpivirin AUC ↓ 9 % rilpivirin C <sub>min</sub> NA rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Kombinasjonen av rilpivirin og H <sub>2</sub> -reseptorantagonister bør brukes med spesiell forsiktighet. Det bør kun benyttes H <sub>2</sub> -reseptorantagonister som kan gis én gang daglig. En streng doseringsplan med inntak av H <sub>2</sub> -reseptorantagonister minst 12 timer før eller minst 4 timer etter rilpivirin bør benyttes.
Famotidin* <sup>#</sup> 40 mg enkeltdose tatt 2 timer før rilpivirin	rilpivirin AUC ↓ 76 % rilpivirin C <sub>min</sub> NA rilpivirin C <sub>max</sub> ↓ 85 %  (redusert absorpsjon på grunn av økt pH i ventrikkelen)	
Famotidin* <sup>#</sup> 40 mg enkeltdose tatt 4 timer etter rilpivirin	rilpivirin AUC ↑ 13 % rilpivirin C <sub>min</sub> NA rilpivirin C <sub>max</sub> ↑ 21 %	
Cimetidin Nizatidin Ranitidin	Ikke undersøkt.  (redusert absorpsjon på grunn av økt pH i ventrikkelen)	
<b>ANTACIDA</b>		
Antacida (f.eks. aluminium- eller magnesiumhydroksid, kalsiumkarbonat)	Ikke undersøkt. Signifikant reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (redusert absorpsjon på grunn av økt pH i ventrikkelen)	Kombinasjonen av rilpivirin og antacida bør brukes med spesiell forsiktighet. Antacida bør kun tas minst 2 timer før eller minst 4 timer etter rilpivirin.
<b>NARKOTISKE ANALGETIKA</b>		
Metadon* 60-100 mg én gang daglig, individuell dose	R(-) metadon AUC ↓ 16 % R(-) metadon C <sub>min</sub> ↓ 22 % R(-) metadon C <sub>max</sub> ↓ 14 % rilpivirin AUC ↔* rilpivirin C <sub>min</sub> ↔* rilpivirin C <sub>max</sub> ↔* * basert på historiske kontroller	Dosejustering er ikke nødvendig ved oppstart av samtidig bruk av metadon og rilpivirin. Klinisk overvåking er imidlertid anbefalt da det kan være nødvendig å justere vedlikeholdsbehandling med metadon hos enkelte pasienter.
<b>ANTIARYTMIKA</b>		
Digoksin*	digoksin AUC ↔ digoksin C <sub>min</sub> NA digoksin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>ANTIKOAGULANTIA</b>		
Dabigatran eteksilat	Ikke undersøkt. En risiko for økning av dabigatrans plasmakonsentrasjon kan ikke utelukkes.  (hemming av intestinal P-gp)	Kombinasjonen av rilpivirin og dabigatran eteksilat bør brukes med forsiktighet.



<b>ANTIDIABETIKA</b>		
Metformin* 850 mg enkeltdose	metformin AUC ↔ metformin C <sub>min</sub> NA metformin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>URTEPREPARATER</b>		
Johannesurt ( <i>Hypericum perforatum</i> )	Ikke undersøkt. Signifikant reduksjon av rilpivirins plasmakonsentrasjon er forventet.  (induksjon av CYP3A-enzymet)	Rilpivirin må ikke brukes sammen med produkter som inneholder Johannesurt da samtidig bruk kan medføre tap av terapeutisk effekt av rilpivirin (se pkt. 4.3).
<b>ANALGETIKA</b>		
Paracetamol* <sup>#</sup> 500 mg enkeltdose	paracetamol AUC ↔ paracetamol C <sub>min</sub> NA paracetamol C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↑ 26 % rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>ORALE ANTIKONSEPTIVA</b>		
Etinyløstradiol* 0,035 mg én gang daglig Noretindron* 1 mg én gang daglig	etinyløstradiol AUC ↔ etinyløstradiol C <sub>min</sub> ↔ etinyløstradiol C <sub>max</sub> ↑ 17 % noretindron AUC ↔ noretindron C <sub>min</sub> ↔ noretindron C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↔* rilpivirin C <sub>min</sub> ↔* rilpivirin C <sub>max</sub> ↔* * basert på historiske kontroller	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>HMG CoA-REDUKTASEHEMMERE</b>		
Atorvastatin* <sup>#</sup> 40 mg én gang daglig	atorvastatin AUC ↔ atorvastatin C <sub>min</sub> ↓ 15 % atorvastatin C <sub>max</sub> ↑ 35 % rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↔ rilpivirin C <sub>max</sub> ↓ 9 %	Dosejustering er ikke nødvendig.
<b>FOSFODIESTERASE TYPE 5 (PDE-5)-HEMMERE</b>		
Sildenafil* <sup>#</sup> 50 mg enkeltdose	sildenafil AUC ↔ sildenafil C <sub>min</sub> NA sildenafil C <sub>max</sub> ↔ rilpivirin AUC ↔ rilpivirin C <sub>min</sub> ↔ rilpivirin C <sub>max</sub> ↔	Dosejustering er ikke nødvendig.
Vardenafil Tadalafil	Ikke undersøkt.	Dosejustering er ikke nødvendig.

\* Interaksjon mellom rilpivirin og legemidlet ble undersøkt i en klinisk studie. Alle andre presenterte legemiddelinteraksjoner er antagelser.

# Denne interaksjonsstudien er utført med høyere dose enn anbefalt dose for rilpivirin for å vurdere maksimal effekt på legemidler som brukes samtidig. Doseringsanbefalingen gjelder anbefalt dose av rilpivirin på 25 mg én gang daglig.

† Denne interaksjonsstudien er utført med en høyere dose enn den anbefalte dosen for rilpivirin.

### QT-forlengende legemidler

Det foreligger begrenset informasjon om potensialet for en farmakodynamisk interaksjon mellom rilpivirin og legemidler som forlenger QTc-tiden i et EKG. I en studie med friske forsøkspersoner ble supratherapeutiske doser av rilpivirin (75 mg én gang daglig og 300 mg én gang daglig) vist å forlenge QTc-tiden i et EKG (se pkt. 5.1). EDURANT bør brukes med forsiktighet sammen med legemidler med kjent risiko for Torsade de Pointes.

## 4.6 Fertilitet, graviditet og amming

### Graviditet

Det er ingen eller begrenset mengde data (utfallet av mindre enn 300 graviditeter) på bruk av rilpivirin hos gravide kvinner.

Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter med hensyn på reproduksjonstoksisitet (se punkt 5.3).

Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av EDURANT under graviditet.

### Amming

Det er ikke kjent om rilpivirin utskilles i morsmelk hos mennesker. Rilpivirin utskilles i melk hos rotte. Både på grunn av fare for HIV-overføring og fare for bivirkninger hos barn som ammes, bør mødre informeres om at de ikke skal amme mens de får rilpivirin.

### Fertilitet

Det foreligger ingen data fra mennesker på rilpivirins effekt på fertilitet. Det er ikke sett klinisk relevante effekter på fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3).

## 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

EDURANT har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Tretthet, svimmelhet og somnolens har imidlertid blitt rapportert hos enkelte pasienter som har brukt EDURANT og bør tas i betraktning ved vurdering av en pasients evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.

## 4.8 Bivirkninger

### Sammendrag av sikkerhetsprofilen

I det kliniske utviklingsprogrammet (1368 pasienter i de kontrollerte fase III-studiene TMC278-C209 (ECHO) og TMC278-C215 (THRIVE)), fikk 55,7 % av forsøkspersonene minst én bivirkning (se pkt. 5.1). De hyppigst rapporterte bivirkningene ( $\geq 2$  %) med i det minste moderat intensitet, var depresjon (4,1 %), hodepine (3,5 %), søvnløshet (3,5 %), utslett (2,3 %) og abdominalsmerter (2,0 %). De hyppigste alvorlige behandlingsrelaterte bivirkningene ble rapportert hos 7 (1,0 %) pasienter som fikk rilpivirin. Median eksponeringstid for pasienter i rilpiviringruppen og efavirenzgruppen var henholdsvis 104,3 og 104,1 uker. De fleste bivirkningene forekom i de første 48 ukene av behandlingen.

Utvalgte behandlingsrelaterte kliniske laboratorieavvik (grad 3 eller grad 4), vurdert som bivirkninger, rapportert hos pasienter behandlet med EDURANT, var økt pankreasamylase (3,8 %), økt ASAT (2,3 %), økt ALAT (1,6 %), økt LDL-kolesterol (fastende, 1,5 %), redusert antall leukocytter (1,2 %), økt lipase (0,9 %), økt bilirubin (0,7 %), økte triglyserider (fastende, 0,6 %), redusert hemoglobin (0,1 %), redusert trombocytall (0,1 %) og økt totalkolesterol (fastende, 0,1 %).

### Bivirkningstabell

Bivirkninger rapportert hos voksne pasienter behandlet med rilpivirin er oppsummert i tabell 2. Bivirkningene er presentert etter organklassesystem og frekvens. Frekvenser er definert som svært vanlige ( $\geq 1/10$ ), vanlige ( $\geq 1/100$  til  $< 1/10$ ) og mindre vanlige ( $\geq 1/1000$  til  $< 1/100$ ). Innenfor hver kategori er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

<b>Tabell 2: Bivirkninger rapportert hos antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede voksne pasienter behandlet med rilpivirin (samlede data fra analyse i uke 96 av fase III ECHO- og THRIVE-studiene) N = 686</b>		
<b>Organklassesystem</b>	<b>Frekvenskategori</b>	<b>Bivirkninger (rilpivirin + BR)</b>
Sykdommer i blod og lymfatiske organer	vanlige	reduisert antall hvite blodlegemer reduisert hemoglobin reduisert trombocytall
Fortyrrelser i immunsystemet	mindre vanlige	immunt reaktiverings-syndrom
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer	svært vanlige	økt totalkolesterol (fastende) økt LDL-kolesterol (fastende)
	vanlige	reduisert appetitt økte triglyserider (fastende)
Psykiatriske lidelser	svært vanlige	søvnløshet
	vanlige	unormale drømmer depresjon søvnforstyrrelser nedstemthet
Nevrologiske sykdommer	svært vanlige	hodepine svimmelhet
	vanlige	somnolens
Gastrointestinale sykdommer	svært vanlige	kvalme økt pankreasamylase
	vanlige	abdominalsmerter oppkast økt lipase abdominalt ubehag munntørrhet
Sykdommer i lever og galleveier	svært vanlige	økt transaminase
	vanlige	økt bilirubin
Hud- og underhudssykdommer	vanlige	utslett
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet	vanlige	tretthet

BR = bakgrunnsregime  
N = antall forsøkspersoner

#### *Laboratorieavvik*

I rilpiviringruppen i analysen i uke 96 i fase-III ECHO- og THRIVE-studiene var gjennomsnittlig endring fra baseline i totalkolesterol (fastende) 5 mg/dl, HDL-kolesterol (fastende) 4 mg/dl, LDL-kolesterol (fastende) 1 mg/dl og triglyserider (fastende) -7 mg/dl.

#### Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

##### *Immunt reaktiveringssyndrom*

Hos HIV-smittede pasienter med alvorlig immunsvikt ved oppstart av kombinasjonsbehandling (CART), kan det oppstå en inflammatorisk reaksjon overfor asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske infeksjoner. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom) har også vært rapportert. Tidspunktet for når disse hendelsene inntreffer er imidlertid mer variabelt, og slike reaksjoner kan oppstå flere måneder etter behandlingsstart (se pkt. 4.4).

#### Pediatrik populasjon (12 til under 18 år)

Sikkerhetsvurderingen er basert på uke 48-analysen i den åpne fase II-studien med én behandlingsgruppe, TMC278-C213, hvor 36 antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede ungdom

som veide minst 32 kg fikk rilpivirin (25 mg én gang daglig) i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler (se pkt. 5.1). Median eksponeringstid for pasienter var 63,5 uker. Det var ingen pasienter som seponerte behandlingen på grunn av bivirkninger. Ingen nye bivirkninger ble identifisert sammenlignet med de som er sett hos voksne.

De fleste bivirkningene var grad 1 eller 2. De vanligste bivirkningene (alle grader, mer enn eller lik 10 %) var hodepine (19,4 %), depresjon (19,4 %), søvnighet (13,9 %) og kvalme (11,1 %). Ingen grad 3-4 laboratorieavvik for ASAT/ALAT eller grad 3-4 bivirkninger med økte transaminaser ble rapportert.

Sikkerhet og effekt av rilpivirin hos barn i alderen < 12 år har enda ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

#### Andre spesielle populasjoner

##### *Pasienter med samtidig hepatitt B- og/eller hepatitt C-virusinfeksjon*

Hos pasienter med samtidig hepatitt B- eller C-virusinfeksjon som fikk rilpivirin, var insidensen av leverenzymøkning høyere enn hos pasienter som fikk rilpivirin og ikke hadde koinfeksjon. Det samme ble observert i efavirenzgruppen. Den farmakokinetiske rilpivirineksponeringen var sammenlignbar hos pasienter med og uten koinfeksjon.

#### Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i [Appendix V](#).

## **4.9 Overdosering**

Det finnes intet spesifikt antidot mot overdosering med EDURANT. Erfaring fra overdosering med rilpivirin hos mennesker er begrenset. Symptomer på overdosering kan være hodepine, kvalme, svimmelhet og/eller unormale drømmer. Behandling av overdosering med rilpivirin består av generelle støttetiltak, inkludert overvåking av vitale tegn og EKG (QT-tid) samt observasjon av pasientens kliniske status. Administrasjon av medisinsk kull kan brukes som en hjelp til å fjerne uabsorbert virkestoff. Da rilpivirin er sterkt proteinbundet, er det lite sannsynlig at dialyse kan fjerne virkestoffet i signifikant grad.

## **5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER**

### **5.1 Farmakodynamiske egenskaper**

Farmakoterapeutisk gruppe: Antivirale midler til systemisk bruk, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, ATC-kode: J05AG05.

#### Virkningsmekanisme

Rilpivirin er en diarylpyrimidin NNRTI av HIV-1. Rilpivirins aktivitet medieres av ikke-kompetitiv hemming av HIV-1 reverstranskriptase (RT). Rilpivirin hemmer ikke cellulær DNA-polymerase  $\alpha$ ,  $\beta$  og  $\gamma$  hos mennesker.

#### Antiviral aktivitet *in vitro*

Rilpivirin har vist aktivitet overfor laboriestammer av villtype HIV-1 i en akuttinfisert T-cellelinje med en median EC<sub>50</sub>-verdi for HIV-1/IIIB på 0,73 nM (0,27 ng/ml). Selv om rilpivirin har vist begrenset *in vitro*-aktivitet overfor HIV-2 med EC<sub>50</sub>-verdier fra 2510 til 10 830 nM (920 til 3970 ng/ml), er behandling av HIV-2 infeksjon med rilpivirin ikke anbefalt i fravær av kliniske data.

Rilpivirin har også vist antiviral aktivitet overfor et bredt panel av HIV-1 gruppe M (subtype A, B, C, D, F, G, H) primærkulturer med EC<sub>50</sub>-verdier fra 0,07 til 1,01 nM (0,03 til 0,37 ng/ml) og gruppe O primærkulturer med EC<sub>50</sub>-verdier fra 2,88 til 8,45 nM (1,06 til 3,10 ng/ml).

### Resistens

#### *I cellekultur*

Rilpivirinresistente stammer er selektert i cellekultur med utgangspunkt i villtype HIV-1 av ulikt opphav og undergrupper samt NNRTI-resistent HIV-1. De vanligst observerte resistens-assosierte mutasjonene som oppsto var L100I, K101E, V108I, E138K, V179F, Y181C, H221Y, F227C og M230I.

Resistens overfor rilpivirin ble fastsatt som et antall gangers endring i EC<sub>50</sub>-verdi (FC) over analysens biologiske grenseverdi (BCO).

#### *Hos behandlingsnaïve voksne forsøkspersoner*

I resistensanalysen ble det brukt en bredere definisjon av virologisk svikt enn i den primære effektanalysen. Ved samlet resistensanalyse i uke 48 fra fase III-studiene forelå det resistensdata fra baseline og tidspunkt for virologisk svikt for 62 (av totalt 72) tilfeller av virologisk svikt i rilpiviringruppen. I denne analysen var de resistens-assosierte mutasjonene (RAMs) som var forbundet med NNRTI-resistens ved minst 2 tilfeller av virologisk svikt med rilpivirine, V90I, K101E, E138K, E138Q, V179I, Y181C, V189I, H221Y og F227C. Nærvær av mutasjonene V90I og V189I ved baseline påvirket ikke responsen i disse studiene. E138K-substitusjonen oppsto hyppigst ved rilpivirinbehandling, vanligvis i kombinasjon med M184I-substitusjon. Ved analyse i uke 48 hadde 31 av de 62 tilfellene av virologisk svikt med rilpivirin samtidige NNRTI- og NRTI-RAMs, og 17 av disse 31 hadde kombinasjonen E138K og M184I. De vanligste mutasjonene var de samme ved analysene i uke 48 og uke 96.

Ved samlet resistensanalyse i uke 96 ble det observert lavere grad av virologisk svikt i de siste 48 ukene enn i de første 48 ukene av behandlingen. Fra uke 48 til analysen i uke 96 oppsto det ytterligere 24 (3,5 %) og 14 (2,1 %) tilfeller av virologisk svikt i henholdsvis rilpivirin- og efavirenzgruppen. Henholdsvis 9 av 24 og 4 av 14 av disse tilfellene av virologisk svikt forekom hos forsøkspersoner med en total virusmengde < 100 000 kopier/ml ved baseline.

Basert på vurdering av alle tilgjengelige *in vitro*- og *in vivo*-data hos behandlingsnaïve forsøkspersoner, er det sannsynlig at nærvær av følgende resistens-assosierte mutasjoner ved baseline vil påvirke rilpivirins aktivitet: K101E, K101P, E138A, E138G, E138K, E138R, E138Q, V179L, Y181C, Y181I, Y181V, Y188L, H221Y, F227C, M230I og M230L. Disse rilpivirin-assosierte mutasjonene bør kun være veiledende for bruk av EDURANT i den behandlingsnaïve populasjonen. Disse resistens-assosierte mutasjonene er kun observert i *in vivo* data fra behandlingsnaïve forsøkspersoner og kan derfor ikke benyttes til å forutsi aktiviteten til rilpivirin hos forsøkspersoner som har hatt virologisk svikt på et antiretroviralt behandlingsregime.

Som for andre antiretrovirale legemidler bør resistenstesting være veiledende for bruk av EDURANT.

### Kryssresistens

#### *Seterettet NNRTI mutant virus*

I et panel av 67 HIV-1 rekombinante laboratoriestammer med én resistens-assosiert mutasjon i RT-posisjoner forbundet med NNRTI-resistens, inkludert de vanligste K103N og Y181C, viste rilpivirin antiviral aktivitet overfor 64 (96 %) av stammene. De enkelte resistens-assosierte mutasjonene forbundet med tap av følsomhet overfor rilpivirin var K101P, Y181I og Y181V. K103N-substitusjonen alene medførte ikke redusert følsomhet overfor rilpivirin, men kombinasjonen av K103N og L100I medførte 7 ganger redusert følsomhet overfor rilpivirin.

#### *Rekombinante kliniske kulturer*

Rilpivirin beholdt følsomhet ( $FC \leq BCO$ ) i 62 % av 4786 HIV-1 rekombinante kliniske kulturer som var resistente overfor efavirenz og/eller nevirapin.

### *Behandlingsnaïve HIV-1-smittede voksne pasienter*

Ved samlet resistensanalyse i uke 96 av fase III-studiene ECHO og THRIVE var det 42 av 86 forsøkspersoner med virologisk svikt på rilpivirin som viste behandlingsrelatert resistens overfor rilpivirin (genotypisk analyse). Hos disse pasientene ble det registrert fenotypisk kryssresistens overfor andre NNRTIs som følger: etravirin 32/42, efavirenz 30/42 og nevirapin 16/42. Hos pasienter med virusmengde  $\leq 100\ 000$  kopier/ml ved baseline, viste 9 av 27 pasienter med virologisk svikt på rilpivirin behandlingsrelatert resistens overfor rilpivirin (genotypisk analyse), med følgende hyppighet av fenotypisk kryssresistens: etravirin 4/9, efavirenz 3/9 og nevirapin 1/9.

### Påvirkning av elektrokardiogram

Effekten av rilpivirin i anbefalt dose på 25 mg én gang daglig på QTcF-tiden ble undersøkt i en randomisert, krysset studie med placebo og aktiv kontroll (moksifloksacin 400 mg én gang daglig) med 60 friske voksne, med 13 målinger i løpet av 24 timer ved steady-state. EDURANT i anbefalt dose på 25 mg én gang daglig var ikke forbundet med klinisk relevant QTc-påvirkning.

Ved undersøkelse av supratherapeutiske doser på 75 mg én gang daglig og 300 mg én gang daglig av rilpivirin hos friske voksne, var maksimal gjennomsnittlig tids-matchet (95 % øvre konfidensgrense) forskjell i QTcF-tid fra placebo etter baselinekorrigering henholdsvis 10,7 (15,3) og 23,3 (28,4) ms. Steady-state tilførsel av rilpivirin 75 mg én gang daglig og 300 mg én gang daglig medførte en gjennomsnittlig  $C_{max}$  som var henholdsvis ca. 2,6 og 6,7 ganger høyere enn gjennomsnittlig steady-state  $C_{max}$  observert med den anbefalte 25 mg én gang daglig dosen av rilpivirin.

### Klinisk effekt og sikkerhet

#### *Behandlingsnaïve HIV-1-smittede voksne pasienter*

Bevis for effekten av rilpivirin er basert på analyse av 96-ukers data fra 2 randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studier med aktiv kontroll, TMC278-C209 (ECHO) og TMC278-C215 (THRIVE). Studiene hadde identisk design, med unntak av bakgrunnsregimet (BR). I effektanalysen i uke 96 ble virologisk responsgrad [bekreftet ikke målbar virusmengde ( $< 50$  HIV-1-RNA kopier/ml)] sammenlignet hos pasienter som fikk rilpivirin 25 mg én gang daglig i tillegg til et BR, og pasienter som fikk efavirenz 600 mg én gang daglig i tillegg til et BR. Det ble observert tilsvarende effekt av rilpivirin i begge studier som viste at det ikke var dårligere enn efavirenz.

Antiretroviral behandlingsnaïve HIV-1-smittede pasienter med plasma HIV-1-RNA  $\geq 5000$  kopier/ml ble inkludert og testet for følsomhet overfor N(t)RTIs og fravær av spesifikke NNRTI resistens-assosierte mutasjoner. I ECHO var BR begrenset til N(t)RTIs, tenofoviridisoproksilfumarat pluss emtricitabin. I THRIVE besto BR av 2 utprøvervalgte N(t)RTIs: tenofoviridisoproksilfumarat pluss emtricitabin eller zidovudin pluss lamivudin eller abakavir pluss lamivudin. I ECHO var randomiseringen stratifisert etter virusmengde ved baselintesting. I THRIVE var randomiseringen stratifisert etter virusmengde ved baselintesting og N(t)RTI BR.

Denne analysen omfattet 690 pasienter i ECHO og 678 pasienter i THRIVE som hadde fullført 96 ukers behandling eller seponert tidligere.

Ved samlet analyse av ECHO og THRIVE var demografiske- og baselineparametre balansert mellom rilpiviringruppen og efavirenzgruppen. Tabell 3 viser utvalgte sykdomsparametre ved baseline hos pasientene i rilpivirin- og efavirenzgruppen.

<b>Tabell 3: Sykdomsparametre ved baseline hos antiretroviral behandlingenaïve HIV-1-smittede voksne forsøkspersoner i ECHO- og THRIVE-studiene (samlet analyse)</b>		
	<b>Samlede data fra ECHO- og THRIVE-studiene</b>	
	<b>Rilpivirin + BR N = 686</b>	<b>Efavirenz + BR N = 682</b>
<b>Sykdomsparametre ved baseline</b>		
Median baseline plasma HIV-1-RNA (spredning), $\log_{10}$ kopier/ml	5,0 (2-7)	5,0 (3-7)
Median baseline CD4+-celletall (spredning), $\times 10^6$ celler/l	249 (1-888)	260 (1-1137)

Prosentandel av forsøkspersoner med: samtidig hepatitt B/C-virusinfeksjon	7,3 %	9,5 %
Prosentandel av pasienter med følgende bakgrunnsregimer:		
tenofovirdisoproksilfumarat pluss emtricitabin	80,2 %	80,1 %
zidovudin pluss lamivudin	14,7 %	15,1 %
abakavir pluss lamivudin	5,1 %	4,8 %

BR = bakgrunnsregime

Tabell 4 viser resultater fra effektanalysene i uke 48 og uke 96 hos pasienter behandlet med rilpivirin og pasienter behandlet med efavirenz fra samlede data fra ECHO- og THRIVE-studiene. Responsgrad (bekreftet ikke målbar virusmengde < 50 HIV-1 RNA kopier/ml) i uke 96 var sammenlignbar i rilpiviringruppen og efavirenzgruppen. Insidensen av virologisk svikt var høyere i rilpiviringruppen enn i efavirenzgruppen i uke 96, men de fleste tilfellene av virologisk svikt oppsto i løpet av de første 48 ukene av behandlingen. Seponering som følge av bivirkninger var hyppigere i efavirenzgruppen enn i rilpiviringruppen i uke 96. De fleste av disse seponeringene forekom i løpet av første 48 ukene av behandlingen.

<b>Tabell 4: Virologisk resultat hos voksne forsøkspersoner i ECHO- og THRIVE-studiene (analyse av sammenslåtte data i uke 48 (primær) og uke 96, ITT-TLOVR<sup>†</sup>)</b>						
	<i>Resultat av analyse i uke 48</i>			<i>Resultat av analyse i uke 96</i>		
	<b>Rilpivirin + BR N = 686</b>	<b>Efavirenz + BR N = 682</b>	<b>Observert forskjell (95 % KI) <sup>±</sup></b>	<b>Rilpivirin + BR N = 686</b>	<b>Efavirenz + BR N = 682</b>	<b>Observert forskjell (95 % KI) <sup>±</sup></b>
Respons (bekreftet < 50 HIV-1-RNA kopier/ml) <sup>§#</sup>	84,3 % (578/686)	82,3 % (561/682)	2,0 (-2,0; 6,0)	77,6 % (532/686)	77,6 % (529/682)	0 (-4,4; 4,4)
Non-respons						
Virologisk svikt <sup>†</sup>						
Totalt	9,0 % (62/686)	4,8 % (33/682)	ND	11,5 % (79/686)	5,9 % (40/682)	ND
≤ 100 000	3,8 % (14/368)	3,3 % (11/330)	ND	5,7 % (21/368)	3,6 % (12/329)	ND
> 100 000	15,1 % (48/318)	6,3 % (22/352)	ND	18,2 % (58/318)	7,9 % (28/353)	ND
Dødfall	0,1 % (1/686)	0,4 % (3/682)	ND	0,1 % (1/686)	0,9 % (6/682)	ND
Seponert på grunn av bivirkning	2,0 % (14/686)	6,7 % (46/682)	ND	3,8 % (26/682)	7,6 % (52/682)	ND
Seponert av annen årsak enn bivirkning <sup>†</sup>	4,5 % (31/686)	5,7 % (39/682)	ND	7,0 % (48/682)	8,1 % (55/682)	ND
<b>Respons pr. subkategori</b>						
<b>Ved bakgrunns-NRTI</b>						
Tenofovir/emtricitabin	83,5 % (459/550)	82,4 % (450/546)	1,0 (-3,4; 5,5)	76,9 % (423/550)	77,3 % (422/546)	-0,4 % (-5,4; 4,6)
Zidovudin/lamivudin	87,1 % (88/101)	80,6 % (83/103)	6,5 (-3,6; 16,7)	81,2 % (82/101)	76,7 % (79/103)	4,5 % (-6,8; 15,7)
Abakavir/lamivudin	88,6 % (31/35)	84,8 % (28/33)	3,7 (-12,7; 20,1)	77,1 % (27/35)	84,8 % (28/33)	-7,7 % (-26,7; 11,3)
<b>Ved baseline virusmengde (kopier/ml)</b>						
≤ 100 000	90,2 % (332/368)	83,6 % (276/330)	6,6 (1,6; 11,5)	84,0 % (309/368)	79,9 % (263/329)	4,0 (-1,7; 9,7)
> 100 000	77,4 % (246/318)	81,0 % (285/352)	-3,6 (-9,8; 2,5)	70,1 % (223/318)	75,4 % (266/353)	-5,2 (-12,0; 1,5)
<b>Ved baseline CD4 mengde (x 10<sup>6</sup> celler/l)</b>						
< 50	58,8 % (20/34)	80,6 % (29/36)	-21,7 (-43,0; -0,5)	55,9 % (19/34)	69,4 % (25/36)	-13,6 (-36,4; 9,3)
≥ 50-< 200	80,4 % (156/194)	81,7 % (143/175)	-1,3 (-9,3; 6,7)	71,1 % (138/194)	74,9 % (131/175)	-3,7 (-12,8; 5,4)

≥ 200-< 350	86,9 % (272/313)	82,4 % (253/307)	4,5 (-1,2; 10,2)	80,5 % (252/313)	79,5 % (244/307)	1,0 (-5,3; 7,3)
≥ 350	90,3 % (130/144)	82,9 % (136/164)	7,4 (-0,3; 15,0)	85,4 % (123/144)	78,7 % (129/164)	6,8 (-1,9; 15,4)

N = antall forsøkspersoner pr. behandlingsgruppe, ND = ikke bestemt.

\* intent-to-treat tid til tap av virologisk respons.

± Basert på normal tilnærming

§ Forsøkspersoner med virologisk respons (to påfølgende virusmengder < 50 kopier/ml) som beholdt den til uke 48/96.

# Antatt forskjell i responsgrad (95 % KI) ved analyse i uke 48: 1,6 % (-2,2 %; 5,3 %) og ved analyse i uke 96: -0,4 % (-4,6 %; 3,8 %); begge p-verdi < 0,0001 (ikke dårligere med 12 % margin) fra logistisk regresjonsmodell, inkludert stratifiseringsfaktorer og studie.

† Virologisk svikt ved effektanalyse av sammenslåtte data: Inkluderer forsøkspersoner klassifisert som "rebounder" (bekreftet virusmengde ≥ 50 kopier/ml etter først å ha vært responder) eller som aldri har vært utsatt for suppressjon (ingen bekreftet virusmengde < 50 kopier/ml, enten pågående eller seponert på grunn av manglende eller tap av effekt).

¶ f.eks. avsluttet uten oppfølging, manglende compliance, trukket samtykke.

I uke 96 var gjennomsnittlig endring fra baseline i CD4+-celletall +228 x 10<sup>6</sup> celler/l i rilpivirgruppen og +219 x 10<sup>6</sup> celler/l i efavirenzgruppen ved samlet analyse av ECHO- og THRIVE-studiene [antatt behandlingsforskjell (95 % KI): 11,3 (-6,8; 29,4)].

Fra resistensanalysen i uke 96 av de sammenslåtte dataene er resistensresultatene for pasientene med protokolldefinert virologisk svikt og parrede genotyper (baseline og svikt) vist i tabell 5.

<b>Tabell 5: Resistensresultat ved anvendt bakgrunns-NRTI regime (sammenslåtte data fra ECHO- og THRIVE-studiene ved resistensanalyse i uke 96)</b>				
	tenofovir/ emtricitabin	zidovudin/ lamivudin	abakavir/ lamivudin	Alle*
<b>Rilpivirinbehandlede</b>				
Resistens <sup>#</sup> overfor emtricitabin/lamivudin % (n/N)	6,9 (38/550)	3,0 (3/101)	8,6 (3/35)	6,4 (44/686)
Resistens overfor rilpivirin % (n/N)	6,5 (36/550)	3,0 (3/101)	8,6 (3/35)	6,1 (42/686)
<b>Efavirenz-behandlede</b>				
Resistens overfor emtricitabin/lamivudin % (n/N)	1,1 (6/546)	1,9 (2/103)	3,0 (1/33)	1,3 (9/682)
Resistens overfor efavirenz % (n/N)	2,4 (13/546)	2,9 (3/103)	3,0 (1/33)	2,5 (17/682)

\* Antall pasienter med virologisk svikt og parrede genotyper (baseline og svikt) var 71, 11 og 4 for rilpivirin og henholdsvis 30, 10 og 2 for efavirenz-, tenofovir/emtricitabin-, zidovudin/lamivudin- og abakavir/lamivudin-regimene

# Resistens ble definert som fremvekst av enhver resistens-assosiert mutasjon ved svikt.

For pasienter hvor behandlingen med rilpivirin var mislykket og som utviklet resistens overfor rilpivirin, ble det vanligvis observert kryssresistens overfor andre, godkjente NNRTIs (etravirin, efavirenz, nevirapin).

Studie TMC278-C204 var en randomisert fase IIb-studie med aktiv kontroll med antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede voksne pasienter bestående av 2 deler: en innledende delvis blindet dose-stipulerende del [(rilpivirin)-blindet for doser] opp til 96 ukers varighet, etterfulgt av en langvarig og åpen del. I den åpne delen av studien ble alle pasienter opprinnelig randomisert til én av tre doser av rilpivirin behandlet med rilpivirin 25 mg én gang daglig i tillegg til et BR, straks dosen til fase III-studiene var valgt. Pasienter i kontrollgruppen fikk efavirenz 600 mg én gang daglig i tillegg til et BR gjennom hele studien. BR besto av 2 utprøvervalgte N(t)RTIs: zidovudin pluss lamivudin eller tenofoviridisoproksilfumarat pluss emtricitabin.

Studie TMC278-C204 inkluderte 368 HIV-1-smittede behandlingsnaive voksne pasienter med plasma HIV-1-RNA ≥ 5000 kopier/ml, som tidligere hadde fått ≤ 2 ukers behandling med en N(t)RTI eller proteasehemmer, ikke tidligere hadde brukt NNRTIs og var testet for følsomhet overfor N(t)RTI og fravær av spesifikke NNRTI resistens-assosierte mutasjoner.



Etter 96 uker var andelen av pasienter med < 50 HIV-1-RNA kopier/ml som fikk rilpivirin 25 mg (N = 93) sammenlignet med pasienter som fikk efavirenz (N = 89) henholdsvis 76 % og 71 %. Gjennomsnittlig økning fra baseline i CD4+-tall var  $146 \times 10^6$  celler/l hos pasienter som fikk rilpivirin 25 mg og  $160 \times 10^6$  celler/l hos pasienter som fikk efavirenz.

Av pasientene som viste respons i uke 96 forble 74 % av pasientene som fikk rilpivirin uten målbar virusmengde (< 50 HIV-1-RNA kopier/ml) i uke 240 sammenlignet med 81 % av pasientene som fikk efavirenz. Ingen sikkerhetsproblemer ble påvist i analysene ved uke 240.

### Pediatrik populasjon

Farmakokinetikk, sikkerhet, tolerabilitet og effekt av rilpivirin 25 mg én gang daglig, i kombinasjon med et utprøvet BR inneholdende to NRTIs, ble evaluert i studie TMC278-C213, en åpen fase II-studie med én behandlingsgruppe, med antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede ungdom som veide minst 32 kg. Denne analysen omfattet 36 pasienter som hadde fullført minst 48 ukers behandling eller seponert tidligere.

De 36 forsøkspersonene hadde en median alder på 14,5 år (spredning: 12 til 17 år), og det var 55,6 % jenter, 88,9 % svarte og 11,1 % asiatiske. Median baseline plasma HIV-1-RNA var  $4,8 \log_{10}$  kopier/ml, og median baseline CD4+-tall var  $414 \times 10^6$  celler/l (spredning: 25 til  $983 \times 10^6$  celler/l).

Andelen av pasienter med HIV-1 RNA < 50 kopier/ml i uke 48 (TLOVR) var 72,2 % (26/36). Andelen av pasienter med respons var høyere blant forsøkspersoner med en total virusmengde  $\leq 100\,000$  kopier/ml ved baseline (78,6 %, 22/28) sammenlignet med de med en total virusmengde > 100 000 kopier/ml ved baseline (50,0 %, 4/8). Andelen av virologisk svikt var 22,2 % (8/36). Andelen av virologisk svikt var lavere blant forsøkspersoner med en total virusmengde  $\leq 100\,000$  kopier/ml ved baseline (17,9 %, 5/28) sammenlignet med de med en total virusmengde > 100 000 kopier/ml ved baseline (37,5 %, 3/8). Rilpivirinresistensmutasjoner ble observert hos 62,5 % (5/8) av forsøkspersoner med virologisk svikt. Hos 4 av disse 5 forsøkspersonene ble det også observert NRTI-resistens. Én forsøksperson seponerte på grunn av en bivirkning og 1 forsøksperson seponerte av andre årsaker enn en bivirkning eller virologisk svikt. I uke 48 var gjennomsnittlig økning fra baseline i CD4+-tall  $201,2 \times 10^6$  celler/l.

Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) har utsatt forpliktelsen til å presentere resultater fra studier med rilpivirin i en eller flere undergrupper av den pediatrike populasjonen ved behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV-1-infeksjon) (se pkt. 4.2 for informasjon vedrørende pediatrik bruk).

## **5.2 Farmakokinetiske egenskaper**

Rilpivirins farmakokinetiske egenskaper er undersøkt hos voksne, friske forsøkspersoner og hos antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede pasienter fra 12 års alder. Rilpivirineksponeringen var vanligvis lavere hos HIV-1-smittede pasienter enn hos friske forsøkspersoner.

### Absorpsjon

Etter oral administrasjon nås maksimal plasmakonsentrasjon av rilpivirin vanligvis innen 4-5 timer. Absolutt biotilgjengelighet av EDURANT er ukjent.

### Effekt av mat på absorpsjon

Rilpivirineksponeringen var ca. 40 % lavere etter inntak av EDURANT i fastende tilstand i forhold til ved et måltid med normalt kaloriinnhold (533 kcal) eller et måltid med høyt fett- og kaloriinnhold (928 kcal). Når EDURANT ble tatt sammen med kun proteinrik ernæringsdrikk, var eksponeringen 50 % lavere enn når det ble tatt sammen med et måltid. EDURANT **skal tas sammen med et måltid** for å oppnå optimal absorpsjon. Inntak av EDURANT i fastende tilstand eller sammen med kun ernæringsdrikk kan medføre redusert plasmakonsentrasjon av rilpivirin, som eventuelt kan redusere den terapeutiske effekten av EDURANT (se pkt. 4.2).

### Distribusjon

Rilpivirin er ca. 99,7 % bundet til plasmaproteiner *in vitro*, hovedsakelig til albumin. Distribusjon av rilpivirin til andre kompartenter enn plasma (f.eks. cerebrospinalvæske, genitalsekreter) er ikke undersøkt hos mennesker.

### Biotransformasjon

*In vitro*-forsøk indikerer at rilpivirin hovedsakelig gjennomgår oksidativ metabolisme mediert av cytokrom P450 (CYP) 3A-systemet.

### Eliminasjon

Rilpivirins terminale eliminasjonshalveringstid er ca. 45 timer. Etter en oral enkeltdose av <sup>14</sup>C-rilpivirin kunne gjennomsnittlig 85 % og 6,1 % av radioaktiviteten gjenfinnes i henholdsvis feces og urin. I feces svarte uendret rilpivirin for gjennomsnittlig 25 % av administrert dose. Kun spormengder av uendret rilpivirin (< 1 % av dosen) kunne påvises i urin.

### Ytterligere informasjon om spesielle populasjoner

#### *Pediatrik populasjon (under 18 år)*

Rilpivirins farmakokinetikk var sammenlignbar hos antiretroviral behandlingsnaive HIV-1-smittede ungdom som fikk EDURANT 25 mg én gang daglig og behandlingsnaive HIV-1-smittede voksne som fikk EDURANT 25 mg én gang daglig. Kroppsvekt påvirket ikke rilpivirins farmakokinetikk hos pediatrike forsøkspersoner i studie C213 (33 til 93 kg), tilsvarende som observert hos voksne.

Rilpivirins farmakokinetikk hos pediatrike pasienter under 12 år er under utredning. På grunn av utilstrekkelige data kan det ikke gis doseringsanbefalinger for pediatrike pasienter under 12 år (se pkt. 4.2).

#### *Eldre personer*

Populasjonsfarmakokinetikkanalyser med HIV-smittede pasienter har vist at rilpivirins farmakokinetikk ikke varierer i det undersøkte aldersspennet (18 til 78 år), med kun 3 forsøkspersoner på 65 år eller eldre. Dosejustering av EDURANT er ikke nødvendig hos eldre pasienter. EDURANT skal brukes med forsiktighet hos denne populasjonen (se pkt. 4.2).

#### *Kjønn*

Det er ikke observert klinisk relevante forskjeller i rilpivirins farmakokinetikk mellom menn og kvinner.

#### *Rase*

Populasjonsfarmakokinetikkanalyser av rilpivirin hos HIV-smittede pasienter har indikert at rase ikke har klinisk relevant effekt på rilpivirineksponeringen.

#### *Nedsatt leverfunksjon*

Rilpivirin metaboliseres og elimineres hovedsakelig via lever. I en studie som sammenlikner 8 pasienter med lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad A) med 8 matchede kontroller, og 8 pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad B) med 8 matchede kontroller, var rilpivirineksponering etter gjentatt dosering 47 % høyere hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon og 5 % høyere hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. Det kan imidlertid ikke utelukkes at eksponering for farmakologisk aktivt, ubundet rilpivirin er signifikant økt ved moderat nedsatt leverfunksjon.

Det er ikke anbefalt dosejustering, men forsiktighet bør utvises hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. EDURANT er ikke undersøkt hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh grad C). EDURANT er derfor ikke anbefalt hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon (se pkt. 4.2).

### *Samtidig hepatitt B- og/eller hepatitt C-virusinfeksjon*

Populasjonsfarmakokinetikkanalyser har indikert at samtidig hepatitt B og/eller C-virusinfeksjon ikke har klinisk relevant effekt på rilpivirineksponeringen.

### *Nedsatt nyrefunksjon*

Rilpivirins farmakokinetikk er ikke undersøkt hos pasienter med nyreinsuffisiens. Nyreutskillelse av rilpivirin er ubetydelig. Dosejustering er ikke nødvendig hos pasienter med lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom bør EDURANT brukes med forsiktighet, da plasmakonsentrasjonen kan være økt på grunn av endret legemiddelabsorpsjon, distribusjon og/eller metabolisme sekundært til nyredysfunksjon. Hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom bør kombinasjonen av EDURANT og en sterk CYP3A-hemmer kun brukes dersom nytten oppveier risikoen. Da rilpivirin er sterkt bundet til plasmaproteiner, er det lite sannsynlig at det i signifikant grad vil bli fjernet ved hemodialyse eller peritonealdialyse (se pkt. 4.2).

## **5.3 Prekliniske sikkerhetsdata**

### Toksisitetstester ved gjentatt dosering

Levertoksisitet assosiert med induksjon av leverenzymmer har blitt observert hos rotter. Hos hunder har det blitt observert kolestaselignende effekter.

### Studier av reproduksjonstoksikologi

Dyrestudier har ikke gitt holdepunkter for relevant embryo- eller fostertoksisitet eller påvirkning av reproduksjonsfunksjon. Rilpivirin var ikke teratogent hos rotte og kanin. Eksponeringen som ikke ga embryoføtale bivirkninger (NOAEL) hos rotte og kanin var henholdsvis 15 og 70 ganger høyere enn eksponeringen hos mennesker ved anbefalt dose på 25 mg én gang daglig

### Karsinogenese og mutagenese

Rilpivirin ble utredet for karsinogent potensial ved oral sondeadministrasjon hos mus og rotte i inntil 104 uker. Ved de laveste testede dosene i karsinogenitetsstudiene var systemisk rilpivirineksponering (basert på AUC) 21 ganger (mus) og 3 ganger (rotte) høyere enn observert hos mennesker ved anbefalt dose (25 mg én gang daglig). Hos rotte var det ingen legemiddelrelaterte svulster. Hos mus testet rilpivirin positivt for hepatocellulære svulster hos både hanner og hunner. De hepatocellulære funnene hos mus kan være gnagerspesifikke.

Rilpivirin har testet negativt i fravær og nærvær av et metabolismeaktiveringssystem ved *in vitro* Ames reversmutasjonstest og *in vitro* klastogenitets muselymfomtest. Rilpivirin induserte ikke kromosomskader ved *in vivo* mikronukleustest hos mus.

## **6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER**

### **6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer**

#### Tablettkjerne

Laktosemonohydrat  
Krysskarmellosenatrium  
Povidon K30  
Polysorbat 20  
Silisifisert mikrokrySTALLinsk cellulose  
Magnesiumstearat

#### Tablettdrasjering

Laktosemonohydrat  
Hypromellose 2910 6 mPa.s  
Titandioksid E171  
Makrogol 3000

Triacetin

## **6.2 Uforlikeligheter**

Ikke relevant.

## **6.3 Holdbarhet**

3 år

## **6.4 Oppbevaringsbetingelser**

Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot lys.

## **6.5 Emballasje (type og innhold)**

75 ml boks av polyetylen med høy tetthet (HDPE) med barnesikret lukkeanordning og induksjonsforsegling av polypropylen (PP). Hver eske inneholder én boks med 30 tabletter.

## **6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon**

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

## **7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Janssen-Cilag International NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

## **8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)**

EU/1/11/736/001

## **9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE**

Dato for første markedsføringstillatelse: 28. november 2011  
Dato for siste fornyelse: DD måned ÅÅÅÅ

## **10. OPPDATERINGSDATO**

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) <http://www.ema.europa.eu/>.

## **VEDLEGG II**

- A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE**
- B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK**
- C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**
- D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET**

## **A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE**

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

Janssen-Cilag SpA  
Via C. Janssen  
Borgo San Michele  
04100 Latina  
Italia

## **B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK**

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2).

## **C. ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

- **Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR)**

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

## **D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET**

- **Risikohåndteringsplan (RMP)**

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP.

En oppdatert RMP skal sendes inn:

- på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency);
- når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd.

**VEDLEGG III**  
**MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG**

## **A. MERKING**



**OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE****YTTERESKE****1. LEGEMIDLETS NAVN**

EDURANT 25 mg filmdrasjerte tablett  
rilpivirin

**2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)**

Hver filmdrasjerte tablett inneholder rilpivirinhydroklorid tilsvarende 25 mg rilpivirin.

**3. LISTE OVER HJELPESTOFFER**

Inneholder laktosemonohydrat.  
Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

**4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)**

30 filmdrasjerte tablett

**5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)**

Les pakningsvedlegget før bruk.  
Oral bruk

**6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

**7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER****8. UTLØPSDATO**

Utl.dato

**9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**

Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot lys.

**10. EVENTUELLE SPESEIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV  
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

**11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Janssen-Cilag International NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

**12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)**

EU/1/11/736/001

**13. PRODUKSJONSNUMMER**

Lot

**14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**

Reseptpliktig legemiddel.

**15. BRUKSANVISNING**

**16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

edurant 25 mg

**17. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE**

Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet.

**18. SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR  
MENNESKER**

PC: {nummer} [produktkode]

SN: {nummer} [serienummer]

NN: {nummer} [nasjonal refusjonskode eller ett annet nasjonalt nummer som gjør det mulig å  
identifisere legemidlet]

**OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE**

**BOKSETIKETT**

**1. LEGEMIDLETS NAVN**

EDURANT 25 mg filmdrasjerte tabletter  
rilpivirin

**2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)**

Hver filmdrasjerte tablett inneholder rilpivirinhydroklorid tilsvarende 25 mg rilpivirin.

**3. LISTE OVER HJELPESTOFFER**

Innholder laktosemonohydrat.

**4. LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)**

30 filmdrasjerte tabletter

**5. ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)**

Les pakningsvedlegget før bruk.  
Oral bruk

**6. ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

**7. EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER**

**8. UTLØPSDATO**

Utl.dato

**9. OPPBEVARINGSBETINGELSER**

Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot lys.

**10. EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV  
UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL**

**11. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN**

Janssen-Cilag International NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

**12. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)**

EU/1/11/736/001

**13. PRODUKSJONSNUMMER**

Lot

**14. GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING**

Reseptpliktig legemiddel.

**15. BRUKSANVISNING**

**16. INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT**

## **B. PAKNINGSVEDLEGG**

## **Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren**

### **EDURANT 25 mg filmdrasjerte tabletter** rilpivirin

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.**

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

**I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:**

1. Hva EDURANT er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker EDURANT
3. Hvordan du bruker EDURANT
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer EDURANT
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

#### **1. Hva EDURANT er og hva det brukes mot**

EDURANT inneholder rilpivirin som brukes til behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV-infeksjon). Det tilhører en gruppe HIV-medisiner som kalles ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere (NNRTIs). EDURANT virker ved å redusere mengden HIV i kroppen din.

**EDURANT brukes sammen med andre HIV-medisiner** til behandling av ungdom og voksne som er 12 år eller eldre og er smittet med HIV og ikke tidligere er behandlet med HIV-medisiner.

Legen din vil snakke med deg om hvilken kombinasjon av legemidler som er best for deg.

#### **2. Hva du må vite før du bruker EDURANT**

**Bruk ikke EDURANT** dersom du er allergisk overfor rilpivirin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

**Bruk ikke EDURANT i kombinasjon med noen av følgende legemidler**, da de kan påvirke måten EDURANT eller de andre legemidlene virker:

- karbamazepin, okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin (legemidler til behandling av epilepsi og forebygging av anfall).
- rifampicin og rifapentin (legemidler til behandling av visse bakterieinfeksjoner som tuberkulose).
- omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (protonpumpehemmere) (legemidler til forebygging og behandling av magesår, halsbrann eller sure oppstøt).
- deksametason (et kortikosteroid som brukes ved en rekke tilstander som betennelser og allergiske reaksjoner) [når det inntas via munnen eller injiseres, unntatt som enkeltdose].
- produkter som inneholder johannesurt (*Hypericum perforatum*) (et naturlegemiddel som brukes mot depresjon).

Rådfør deg med legen din om alternativer dersom du bruker noe av dette.

## Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker EDURANT.

EDURANT kurerer ikke HIV-infeksjon. Det er en del av en behandling som reduserer virusmengden i blodet. Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.

EDURANT har bare blitt brukt av et begrenset antall pasienter over 65 år. Hvis du er i denne aldersgruppen, vennligst diskuter bruk av EDURANT med legen din.

## Fortell legen om din situasjon

Forsikre deg om at du har sjekket følgende punkter og fortell legen din om noen av dem angår deg.

- Fortell legen om du har eller har hatt **leverproblemer**, inkludert hepatitt B og/eller C, og/eller **nyreproblemer**. Legen kan vurdere hvor alvorlig lever- eller nyresykdommen er før det avgjøres om du kan ta EDURANT.
- Fortell legen umiddelbart hvis du merker **symptomer på infeksjon** (for eksempel feber, frysninger, svetting). Hos noen pasienter med fremskreden HIV-infeksjon og tidligere opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner inntreffe kort tid etter igangsatt anti-HIV-behandling. Det antas at disse symptomene skyldes en forbedring i kroppens immunrespons som gjør kroppen i bedre stand til å kjempe mot infeksjoner som kan være tilstede uten tydelige symptomer.
- I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
- Fortell legen dersom du bruker legemidler som kan medføre livstruende uregelmessig hjerterytme (Torsade de Pointes).

## Barn

EDURANT er ikke til bruk hos barn under 12 år, da det ikke er tilstrekkelig undersøkt hos disse pasientene.

## Andre legemidler og EDURANT

Du må ta EDURANT sammen med andre HIV-medisiner. Legen forteller deg hvilke HIV-medisiner som kan kombineres med EDURANT og sammen vil dere finne ut av hvilken kombinasjon som passer best for dine behov. Følg legens instruksjoner nøye.

Noen legemidler kan påvirke mengden av EDURANT i blodet når de tas samtidig med EDURANT.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

**Det er ikke anbefalt å kombinere EDURANT med** andre ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere (NNRTIs) (HIV-medisiner) som delavirdin, efavirenz og nevirapin.

**Virkingen av EDURANT eller andre legemidler kan påvirkes** hvis du bruker EDURANT sammen med noen av følgende legemidler. Informer legen dersom du bruker:

- rifabutin (et legemiddel til behandling av visse bakterieinfeksjoner). Dersom du bruker dette legemidlet mens du tar EDURANT, skal du lese nøye hvordan du skal ta EDURANT i avsnitt 3 "Instruksjoner for riktig bruk hos voksne (> 18 år)".
- klaritromycin, erytromycin (antibiotika).
- cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin (H<sub>2</sub>-reseptorantagonister som brukes til å behandle mage- eller tarmsår eller brukes til å lindre halsbrann på grunn av sure oppstøt). Dersom du

- bruker noen av disse legemidlene skal du lese nøye hvordan du skal ta dem i avsnitt 3 “Instrukser for riktig bruk hos voksne (> 18 år)”.
- antacida (brukes til behandling av sykdom forbundet med syre i magen, for eksempel aluminium / magnesiumhydroksid, kalsiumkarbonat). Dersom du bruker noen av disse legemidlene skal du lese nøye hvordan du skal ta dem i avsnitt 3 “Instrukser for riktig bruk hos voksne (> 18 år)”.
  - metadon (brukes til å behandle narkotikaabstinenser og avhengighet).
  - dabigatran eteksilat (antikoagulantia).

### **Graviditet og amming**

Fortell det til legen din med én gang om du er gravid. Gravide kvinner skal ikke ta EDURANT hvis ikke legen har gitt klar beskjed om dette.

HIV-smittede mødre skal ikke amme på grunn av fare for å smitte barnet med HIV via morsmelk.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

### **Kjøring og bruk av maskiner**

Enkelte pasienter kan oppleve tretthet, svimmelhet og søvnighet under behandling med EDURANT. Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du føler deg trøtt, svimmel eller søvnig mens du bruker EDURANT.

### **EDURANT inneholder laktose**

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

## **3. Hvordan du bruker EDURANT**

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

### **Instrukser for riktig bruk hos voksne og ungdom (fra 12 år til under 18 år)**

Den anbefalte dosen av EDURANT er én tablett én gang daglig.

EDURANT **skal tas sammen med et måltid**. Et måltid er viktig for å få riktig mengde virkestoff i kroppen. Ernæringsdrikk (f.eks. proteinrik) alene ertatter ikke et måltid.

Det er fire situasjoner som krever spesiell oppmerksomhet:

1. **Hvis du bruker rifabutin** (et legemiddel til behandling av visse bakterieinfeksjoner), ta to EDURANT-tabletter én gang daglig. Dersom du slutter å bruke rifabutin, skal du ta én EDURANT-tablett én gang daglig. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
2. **Hvis du bruker et syrenøytraliserende legemiddel** (et legemiddel som brukes til å behandle sykdom relatert til magesyre, som aluminium- / magnesiumhydroksid, kalsiumkarbonat). Ta dette legemidlet minst 2 timer før eller minst 4 timer etter EDURANT (se pkt. 2 “Bruk av andre legemidler sammen med EDURANT”).
3. **Hvis du bruker en H<sub>2</sub>-reseptorantagonist** (legemidler som brukes til å behandle mage- eller tarmsår eller brukes til å lindre halsbrann på grunn av sure oppstøt (som cimetidin, famotidin, nizatidin eller ranitidin). Ta H<sub>2</sub>-reseptorantagonisten minst 12 timer før eller minst 4 timer etter EDURANT (se pkt. 2 “ Bruk av andre legemidler sammen med EDURANT”). H<sub>2</sub>-reseptorantagonister bør ikke tas to ganger daglig. Rådfør deg med legen om en alternativ dosering.
4. Hvis du bruker didanosin (et legemiddel som brukes til å behandle HIV-infeksjon), er dosejustering ikke nødvendig. Didanosin skal tas på tom mage minst 2 timer før eller minst 4 timer etter EDURANT (som skal tas sammen med et måltid).



## Fjerning av den barnesikre korken



Boksen leveres med en barnesikret kork. Den kan åpnes ved å presse skrukorken ned mens den vris mot klokken.

### Dersom du tar for mye av EDURANT

Kontakt lege eller apotek omgående. I tilfelle av en overdose kan du få hodepine, kvalme, svimmelhet og/eller unormale drømmer.

### Dersom du har glemt å ta EDURANT

Hvis du oppdager det **innen 12 timer etter tidpunktet du vanligvis tar EDURANT**, skal du ta tablett så snart som mulig. EDURANT-tabletten skal tas sammen med et måltid. Ta deretter neste dose som vanlig. Hvis du oppdager det **senere enn 12 timer**, skal du utelate den dosen og ta neste dose som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Hvis du kaster opp innen 4 timer etter inntak av EDURANT, skal du ta en ny tablett sammen med et måltid. Hvis du kaster opp mer enn 4 timer etter inntak av EDURANT behøver du ikke ta en ny tablett før det er tid for den neste, planlagte tablett din.

Kontakt legen din hvis du er usikker på hva du skal gjøre hvis du glemmer en dose eller kaster opp.

### Dersom du avbryter behandling med EDURANT

HIV-behandling kurerer ikke HIV-infeksjon! Du må ikke avbryte behandlingen med EDURANT uten å rådføre deg med legen din. Selv om du føler deg bedre skal du ikke slutte å bruke EDURANT eller de andre HIV-medisinene. Dette kan øke faren for at viruset utvikler resistens. Snakk med legen din først.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

## 4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige:

- hodepine
- kvalme
- problemer med å sovne (søvnløshet)
- svimmelhet
- endringer i rutinemessige leverprøver (transaminaser)
- økt kolesterol og/eller pankreasamylase i blodet

Vanlige:

- unormale drømmer
- utslett
- magesmerter
- depresjon
- tretthet
- oppkast
- døsighet
- redusert appetitt
- søvnforstyrrelser
- magebesvær
- nedstemthet

- munntørrhet
- lavt antall hvite blodceller og/eller blodplater, redusert hemoglobin i blodet, økte triglyserider, lipase og/eller bilirubin i blodet

Mindre vanlige:

- tegn eller symptomer på betennelse eller infeksjon, for eksempel feber, frysninger, svetting (immunt reaktiveringssyndrom)

### **Melding av bivirkninger**

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via [det nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V](#). Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

## **5. Hvordan du oppbevarer EDURANT**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og boksen etter Utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalboksen for å beskytte mot lys.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

## **6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon**

### **Sammensetning av EDURANT**

- Virkestoff er rilpivirin i form av rilpivirinhydroklorid. Hver tablett med EDURANT inneholder rilpivirinhydroklorid tilsvarende 25 mg rilpivirin.
- Andre innholdsstoffer i den filmdrasjerte tablettkjernen er laktosemonohydrat, krysskarmellosenatrium, povidon K30, polysorbat 20, silisifisert mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat. Filmdrasjeringen inneholder laktosemonohydrat, hypromellose 2910 6 mPa.s, titandioksid E171, makrogol 3000 og triacetin.

### **Hvordan EDURANT ser ut og innholdet i pakningen**

Hvit til offwhite, filmdrasjert, rund, bikonveks tablett med “TMC” på den ene siden og “25” på den andre siden.

Boks med barnesikret lukkeanordning inneholdende 30 filmdrasjerte tabletter.

### **Innehaver av markedsføringstillatelsen**

Janssen-Cilag International NV  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

### **Tilvirker**

Janssen-Cilag SpA  
Via C. Janssen  
Borgo San Michele  
04100 Latina  
Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

**België/Belgique/Belgien**

Janssen-Cilag NV  
Antwerpseweg 15-17  
B-2340 Beerse  
Tel/Tél: +32 14 64 94 11

**България**

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД  
ж.к. Младост 4  
Бизнес Парк София, сграда 4  
София 1766  
Тел.: +359 2 489 94 00

**Česká republika**

Janssen-Cilag s.r.o.  
Karla Engliše 3201/06  
CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov  
Tel: +420 227 012 227

**Danmark**

Janssen-Cilag A/S  
Bregnerødvej 133  
DK-3460 Birkerød  
Tlf: +45 45 94 82 82

**Deutschland**

Janssen-Cilag GmbH  
Johnson & Johnson Platz 1  
D-41470 Neuss  
Tel: +49 2137 955-955

**Eesti**

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal  
Lõõtsa 2  
EE-11415 Tallinn  
Tel: +372 617 7410

**Ελλάδα**

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.  
Λεωφόρος Ειρήνης 56  
GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα  
Τηλ: +30 210 80 90 000

**España**

Janssen-Cilag, S.A.  
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7  
E-28042 Madrid  
Tel: +34 91 722 81 00

**Lietuva**

UAB "JOHNSON & JOHNSON"  
Geležinio Vilko g. 18A  
LT-08104 Vilnius  
Tel: +370 5 278 68 88

**Luxembourg/Luxemburg**

Janssen-Cilag NV  
Antwerpseweg 15-17  
B-2340 Beerse  
Belgique/Belgien  
Tél/Tel: +32 14 64 94 11

**Magyarország**

Janssen-Cilag Kft.  
Nagyenyed u. 8-14  
H-Budapest, 1123  
Tel.: +36 1 884 2858

**Malta**

AM MANGION LTD.  
Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta  
MT-Ħal-Luqa LQA 6000  
Tel: +356 2397 6000

**Nederland**

Janssen-Cilag B.V.  
Dr. Paul Janssenweg 150  
NL-5026 RH Tilburg  
Tel: +31 13 583 73 73

**Norge**

Janssen-Cilag AS  
Postboks 144  
NO-1325-Lysaker  
Tlf: +47 24 12 65 00

**Österreich**

Janssen-Cilag Pharma GmbH  
Vorgartenstraße 206B  
A-1020 Wien  
Tel: +43 1 610 300

**Polska**

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.  
ul. Hłżecka 24  
PL-02-135 Warszawa  
Tel.: +48 22 237 60 00

**France**

Janssen-Cilag  
1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003  
F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9  
Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

**Hrvatska**

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.  
Oreškovićeve 6h  
10010 Zagreb  
Tel: +385 1 6610 700

**Ireland**

Janssen-Cilag Ltd.  
50-100 Holmers Farm Way  
High Wycombe  
Buckinghamshire HP12 4EG  
United Kingdom  
Tel: +44 1 494 567 444

**Ísland**

Janssen-Cilag AB  
c/o Vistor hf.  
Hörgatúni 2  
IS-210 Garðabær  
Sími: +354 535 7000

**Italia**

Janssen-Cilag SpA  
Via M.Buonarroti, 23  
I-20093 Cologno Monzese MI  
Tel: +39 02 2510 1

**Κύπρος**

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,  
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226  
Λατσιά  
CY-2234 Λευκωσία  
Τηλ: +357 22 207 700

**Latvija**

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā  
Mūkusalas iela 101  
Rīga, LV-1004  
Tel: +371 678 93561

**Portugal**

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.  
Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A  
Queluz de Baixo  
PT-2734-503 Barcarena  
Tel: +351 21 43 68 835

**România**

Johnson & Johnson România SRL  
Str. Tipografilor nr. 11-15  
Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3  
013714 București, ROMÂNIA  
Tel: +40 21 207 1800

**Slovenija**

Johnson & Johnson d.o.o.  
Šmartinska cesta 53  
SI-1000 Ljubljana  
Tel: +386 1 401 18 30

**Slovenská republika**

Johnson & Johnson s.r.o.  
CBC III, Karadžičova 12  
SK-821 08 Bratislava  
Tel: +421 232 408 400

**Suomi/Finland**

Janssen-Cilag Oy  
Vaisalantie/Vaisalavägen 2  
FI-02130 Espoo/Esbo  
Puh/Tel: +358 207 531 300

**Sverige**

Janssen-Cilag AB  
Box 4042  
SE-16904 Solna  
Tel: +46 8 626 50 00

**United Kingdom**

Janssen-Cilag Ltd.  
50-100 Holmers Farm Way  
High Wycombe  
Buckinghamshire HP12 4EG - UK  
Tel: +44 1 494 567 444

**Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {MM/ÅÅÅÅ}.**

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): <http://www.ema.europa.eu/>.