

ANNEX I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 50 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 100 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 200 mikrogramma fentanyl.

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni (sprej għall-imnieher).
Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Instanyl hu indikat għall-ġestjoni ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa f'adulti li jkunu diġà qed jirċievu terapija ta' manteniment bl-opiojdi għal uġiġh kroniku mill-kanċer. L-uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa tħarrix għaddien tal-uġiġh li jseħh fi sfond ta' uġiġh persistenti li ġeneralment huwa kontrollat. Pazjenti li jirċievu terapija ta' manteniment b'opiojdi huma dwak li qed jieħdu tal-anqas 60 mg ta' morfina orali kuljum, tal-anqas 25 mikrogramma ta' fentanyl gol-gilda kull siegħa, tal-anqas 30 mg oxycodone kuljum, tal-anqas 8 mg ta' hydromorphone orali kuljum jew doża ekwivalenġezika ta' opiojdi oħra għal ġimġha jew aktar.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

It-trattament għandu jinbeda minn u għandu jibqa' taħt is-sorveljanza ta' tabib b'esperjenza fil-ġestjoni ta' terapija b'opiojdi f'pazjenti b'kanċer. It-tobba għandhom iżommu f'moħħhom il-potenzjal tal-abbuż, użu ħażin, dipendenza fuq il-medicina u doża eċċessiva ta' fentanyl (ara sezzjoni 4.4).

Požoloġija

Il-pazjenti għandhom jiġu tittrati indiviwalment għal doża li tagħtihom analġesja xierqa b'reazzjonijiet avversi ttollerati għal medicina li jkunu qed jieħdu. Il-pazjenti għandhom jiġu monitorati b'attenzjoni waqt il-proċess ta' tittrazzjoni.

Tittrazzjoni għal doża oġhla tkun teħtieġ kuntatt mal-professjonist fil-qasam ta' kura tas-saħħa.

Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, il-possibbiltà ta' iperalġezija, it-tolleranza u l-progressjoni tal-marda sottostanti għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża ta' Instanyl għal trattament ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa indipendenti mid-doża ta' manteniment ta' kuljum ta' opiojdi fl-istudji kliniċi (ara sezzjoni 5.1).

Doża massima ta' kuljum: Trattament għal sa erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa, kull wiehed minnhom b'mhux aktar minn żewġ doži separati minn xulxin b' tal-anqas 10 minuti.


Il-pazjenti għandhom jistennew 4 sigħat qabel ma jergħu jitrattaw episodju ieħor ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa b'Instanyl kemm għal tittrazzjoni u għal terapija ta' manteniment. F'okkażjonijiet eċċezzjonali fejn episodju għdid iseħħ fi żmien bikri, il-pazjenti jistgħu jużaw Instanyl biex jitrattawh imma għandhom jistennew mill-inqas sagħtejn qabel ma jagħmlu hekk. Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament tad-doża tat-terapija bl-opiojdi fl-isfond wara analiżi mill-għdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa, ta' spiss u li jkunu f'inqas minn 4 sigħat bejn episodju u ieħor jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa f'kull 24 siegħa.

Tittrazzjoni tad-doża

Qabel mal-pazjenti jkunu tittrati b'Instanyl, huwa mistenni li l-uġiġh persistenti fl-isfond ikun ikkontrollat b'terapija ta' opiojdi kronika u li m'humiex qed iħossu aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Metodu ta' tittrazzjoni

Il-qawwa inizjali għandha tkun ta' ta' doża waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minfes, li tiġi tittrata 'l fuq kif meħtieġ permezz tal-firxa ta' qawwiet disponibbli (50, 100, u 200 mikrogramma). Jekk analġesja xierqa ma tinkisibx, tista' tingħata doża bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara. Kull stadju ta' tittrazzjoni (qawwa dożata) għandu jiġi valutat f'diversi episodji.



Terapija ta' manteniment

Ġaladarba d-doża tkun stabbilita skont l-istadji deskritti hawn fuq, il-pazjent għandu jinżamm fuq din il-qawwa ta' Instanyl. Jekk il-pazjent m'għandux biżżejjed serħan mill-uġiġh, tista' tingħata doża oħra bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara dik li nġhatat qabel.

Aġġustament tad-doża

Ġeneralment, il-qawwa tad-doża ta' manteniment ta' Instanyl għandha tiżdid meta l-pazjent ikun jeħtieġ aktar minn doża waħda għal episodju ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għal diversi episodji konsekuttivi.

Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament fid-doża għat-terapija ta' opiojdi li tingħata fl-isfond wara analiżi mill-ġdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ta' spiss ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa u li jkunu f'inqas minn erba' sigħat bejn episodju u ieħor; jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh li jiġu f'daqqa kull 24 siegħa.

Jekk reazzjonijiet avversi ikunu intollerabbli jew persistenti, il-qawwa għandha titnaqqas jew it-trattament b'Instanyl għandu jiġi sostitwit b'analġesici.

Tul u għanijiet tat-trattament

Qabel ma jinbeda t-trattament b'Instanyl, għandu jkun hemm qbil dwar strateġija ta' trattament inkluż it-tul tat-trattament u l-għanijiet tat-trattament, u pjan għat-tmiem tat-trattament, flimkien mal-pazjent, f'konformità mal-linji gwida għall-ġestjoni tal-uġiġh. Waqt it-trattament, għandu jkun hemm kuntatt frekwenti bejn it-tabib u l-pazjent sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' trattament kontinwu, jiġi kkunsidrat it-twaqqif u jiġu aġġustati d-dożaġġi jekk ikun meħtieġ. Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' iperalġeżja, tolleranza u progressjoni tal-marda sottostanti (ara sezzjoni 4.4). Instanyl m'għandux jintuża għal aktar żmien milli meħtieġ.

Waqfien tat-terapija

Instanyl għandu jitwaqqaf minnufih jekk il-pazjent ma jkollux aktar episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. It-trattament għal uġiġh fl-isfond persistenti għandu jithalla kif preskritt.

Jekk ikun meħtieġ li jkun hemm waqfien tat-terapija bl-opiojdi kollha, il-pazjent għandu jiġi segwit b'attenzjoni minn tabib peress li hu meħtieġ li jkun hemm tittrazzjoni gradwali 'l isfel sabiex jiġu evitati effetti ta' rtirar minhabba waqfien f'daqqa.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani u popolazzjoni Kakektika

Tagħrif limitat fuq il-farmakokinetiċi, l-effikaċja u s-sigurtà huma disponibbli għall-użu f'Instanyl f'pazjenti li għandhom iktar minn 65 sena t'età. Pazjenti anzjani jista' jkun li jkollhom tneħħija mnaqqsa, half-life mtawwla u sensitività oġhla għal fentanyl milli pazjenti iżgħar. *Data* limitata dwar il-farmakinetika hija disponibbli dwar l-użu ta' fentanyl f'pazjenti kakektiċi (debilitati). Pazjenti kakektiċi jista' jkollhom tnaqqis fit-tneħħija ta' fentanyl. Għalhekk, kawtela għandha dejjem tittiehed fit-trattament ta' pazjenti anzjani, kakektiċi jew indeboliti.

Fi provi kliniċi pazjenti anzjani għandhom tendenza li d-doża effettiva f'tittrazzjoni hija inqas minn dik ta' pazjenti li għadhom m'għalqux 65 sena. Attenzjoni partikolari għandha tingħata meta Instanyl jiġi ttittrat f'pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li għandhom indeboliment fil-fwied li hu bejn moderat għal sever (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment fil-kliwi

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment fil-kliwi li hu minn moderat sa sever (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u effikaċja ta' Instanyl fit-tfal li għadhom m'għalqux 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

Mod ta' kif u mnejn jingħata

Instanyl huwa maħsub biex jingħata mill-immieher biss.

Huwa rakkomandat li l-pazjent jkun bilqiegħda jew f'pożizzjoni wieqfa meta jingħata Instanyl.

Huwa meħtieġ li tnaddaf ir-ras taż-żennuna tal-isprej wara kull darba li jintuża.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel tagħti l-prodott mediċinali

Qabel ma tuża Instanyl għall-ewwel darba, l-isprej nażali jrid jiġi pprajmjat sakemm jidher ċpar fin; normalment minn 3 sa 4 attivazzjonijiet tal-isprej nażali jkun meħtieġa

Jekk il-prodott ma jkunx intuża għall-perjodu ta' aktar minn 7 ijiem, l-isprej nażali jrid jiġi pprajmjat mill-ġdid, billi tagħmel attivazzjoni darba qabel tittieħed id-doża li jmiss.

Matul il-proċess ta' pprajmjar, il-prodott se jintefa' 'il barra. Għalhekk, il-pazjent irid jingħata struzzjonijiet li l-ipprajmjar għandu jitwettaq f'zona vventilata tajjeb, u li t-tagħmir ma jkunx ippuntat fid-direzzjoni ta' wcuħ u oġġetti li jistgħu jiġu f'kuntatt ma' persuni oħrajn, partikularment tfal.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wiehed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti mingħajr terapija ta' manteniment b'opiojdi minhabba li hemm riskju miżjud ta' depressjoni respiratorja.

Kura ta' uġiġħ akut minbarra uġiġħ li jinħass.

Pazjenti li qed jiġi kkurati bi prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate.

Depressjoni respiratorja severa jew kundizzjonijiet ta' pulmuni impeduti b'mod sever.

Radjoterapija fuq il-wiċċ li saret qabel.

Episodji rikorrenti ta' epistassi (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minhabba r-riskji, inkluż l-eżitu fatali, assoċjati ma' esponiment aċċidentali, użu ħażin, u abbuż, il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu avżati biex iżommu Instanyl f'post sikur u sigur, mhux aċċessibbli minn oħrajn.

Depressjoni respiratorja

Depressjoni respiratorja klinikament sinifikanti tista' sseħħ b'fentanyl, u l-pazjenti għandhom jiġu osservati għal dawn l-effetti. Pazjenti b'uġiġħ li jirċievu terapija ta' opiojdi kronika jizviluppaw tolleranza għal depressjoni respiratorja u minhabba f'hekk ir-riskju għal depressjoni respiratorja f'dawn il-pazjenti jista' jkun imnaqqas. L-użu fl-istess hin ta' kalmanti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali jistgħu jgħollu r-riskju ta' depressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

Mard tal-pulmun kroniku

F'pazjenti b'mard tal-pulmun impeduti kroniku, fentanyl jista' jkollu aktar reazzjonijiet avversi severi. F'dawn il-pazjenti, l-opiojdi jistgħu jnaqqsu l-prestazzjoni respiratorja.

Riskju mill-użu fl-istess hin ta' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl u mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jista' jirriżulta f'sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt. Minhabba dawn ir-riskji, riċetta għal għoti fl-istess hin ma' dawn il-mediċini sedattivi għandha tkun riżervata għal pazjenti li għalihom ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament alternattiv. Jekk tittieħed deċiżjoni biex tinħareġ riċetta għal għoti ta' Instanyl fl-istess hin ma' mediċini sedattivi, għandha tintuża l-inqas doża effettiva, u ż-żmien kemm idum it-trattament għandu jkun l-iqdar possibbli. Il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib

għal sinjali u sintomi ta' depressjoni respiratorja u sedazzjoni. F'dan ir-rigward, huwa rakkomandat hafna li l-pazjenti u dawk li jieħdu hsiebhom jiġu infurmati dwar dawn is-sintomi (ara sezzjoni 4.5).

Funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied indebolita

Fentanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. L-influenza ta' indeboliment tal-fwied u tal-kliewi fuq il-farmakokinetiċi ta' Instanyl ma ġewx evalwati; madankollu, meta jingħata għol-vina it-tneħħija ta' fentanyl intweriet li nbidlet minhabba l-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi minhabba alterazzjonijiet fit-tneħħija metabolika u l-proteini fil-plażma.

Pressjoni intrakranjali oġhla

Fentanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li juru evidenza ta' zieda fil-pressjoni intrakranjali, koxjenza indebolita jew koma.

Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'tumur ċerebrali jew b'ġerħa fir-ras.

Mard tal-qalb

L-użu ta' fentanyl jista' jkun assoċjat ma' bradikardija. Fentanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkollhom bradiarritmija preċedenti jew diġà eżistenti. L-opiojdi jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti b'ipovolemja. Għalhekk, Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti bi pressjoni baxxa u/jew ipovolemja.

Sindrome tas-serotonin

Hija rakkomandata kawtela meta Instanyl jingħata fl-istess hin ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistemi tan-newrotrasmittituri serotoninergici.

L-iżvilupp ta' sindrome tas-serotonin li jista' jkun ta' periklu għall-ħajja jista' jseħh bl-użu konkomitanti ta' prodotti mediċinali serotoninergici bħall-Inibituri Selettivi tat-Teħid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRIs) u l-Inibituri tat-Teħid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRIs), u ma' prodotti mediċinali li jdgħajfu l-metabolizmu tas-serotonin (inklużi l-Inibituri tal-Monoamine Oxidase [MAOIs]). Dan jista' jseħh fi ħdan id-doża rakkomandata.

Is-sindrome tas-serotonin jista' jinkludi bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, alluċinazzjonijiet, koma), instabilità awtonomika (eż. takikardija, pressjoni tad-demmi instabbli, ipertermija), abnormalitajiet newromuskolari (eż. iperrifleksija, nuqqas ta' koordinazzjoni, riġidità), u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea).

Jekk ikun issuspettat is-sindrome tas-serotonin, il-kura b'Instanyl għandha titwaqqaf.

Iperalġeżija

Bħal fil-każ ta' opjojdi oħrajn, fil-każ ta' kontroll insuffiċjenti tal-uġiġh *b'risposta* għal zieda fid-doża ta' fentanyl, il-possibiltà ta' iperalġeżija kkawżata mill-opjojdi għandha tiġi kkunsidrata. Jistgħu jiġu indikati t-tnaqqis fid-doża ta' fentanyl jew it-twaqqif tal-kura b'fentanyl jew revizzjoni tal-kura b'fentanyl.

Kundizzjonijiet tal-immieher

Jekk il-pazjent jesperjenza episodji rikorrenti ta' epistassi jew fastidju nażali waqt it-teħid t'Instanyl, għandu jiġi kkonsidrat li t-trattament għal uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għandu jingħata f'għamla oħra.

Riĥ komuni

Il-firxa globali għall-esponiment ta' fentanyl f'individwi b'riĥ komuni mingħajr ma ngħataw trattament minn qabel b'vażokonstrittur tal-immieher hu komparabbli ma' individwi b'saħħithom. Għal użu fl-istess hin ta' vażokonstrittur tal-immieher ara sezzjoni 4.5.

Tolleranza u disturb minħabba l-użu ta' opjojdi (abbuż u dipendenza)

It-tolleranza u dipendenza fiżika u/jew psikoloġika jistgħu jiżviluppaw bl-għoti ripetut ta' opjojdi bħal fentanyl.

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal Disturb Minħabba l-Użu tal-Opjojdi (OUD, *Opioid Use Disorder*). Doża oġġla u tul itwal ta' trattament bl-opjojdi jistgħu jżidu r-riskju li tiżviluppa OUD. Abbuż jew użu hażin ta' Instanyl li jsir b'mod intenzjonali jista' jirriżulta f'doża eċċessiva u/jew mewt. Ir-riskju li wiehed jiżviluppa OUD jiżdied f'pazjenti bi storja medika personali jew fil-familja (ġenituri jew ahwa) ta' disturbi relatati mal-użu ta' sustanzi (inkluż disturb relatat mal-użu tal-alkohol), f'dawk li jagħmlu użu mit-tabakk fil-preżent jew f'pazjenti bi storja medika personali ta' disturbi oħra tas-saħħa mentali (eż. depresjoni maġġuri, ansjetà u disturbi tal-personalità).

Qabel jinbada t-trattament b'Instanyl u matul it-trattament, għandu jintlahaq qbil dwar l-għanijiet tat-trattament u pjan ta' twaqqif (ara sezzjoni 4.2). Qabel u waqt it-trattament, il-pazjent għandu jiġi infurmat ukoll dwar ir-riskji u s-sinjali ta' OUD. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk isehhu dawn is-sinjali.

Il-pazjenti jkunu jehtieġu monitoraġġ għal sinjali ta' mġiba ta' tiftix għad-droga (eż. meta wiehed jitlob għal mili mill-ġdid kmieni wisq). Dan jinkludi reviżjoni tal-opjojdi u medicini psikoattivi (bħal benzodiazepines). Għal pazjenti b'sinjali u sintomi ta' OUD, għandha tiġi kkunsidrata l-konsultazzjoni ma' speċjalista dwar id-dipendenza.

Sintomi ta' tiżmin

Sintomi ta' tiżmin jistgħu jiġu preċipitati bl-għoti ta' sustanzi b'attività antagonista għal opjojdi, eż. naloxone, jew taħlita analġezika b'agonista/antagonista (eż. pentazocine, butorphanol, buprenorphine, nalbuphine).

Disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad

L-opjojdi jistgħu jikkawżaw disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad, inkluż apnea tal-irqad ċentrali (CSA, *central sleep apnoea*) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. L-użu tal-opjojdi jżid ir-riskju ta' CSA b'mod dipendenti fuq id-doża. F'pazjenti li jkollhom CSA, ikkunsidra li tnaqqas id-dożaġġ totali ta' opjojdi.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

L-użu fl-istess hin ta' prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate u fentanyl huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

L-għoti fl-istess hin ta' fentanyl ma' sustanza serotoninergika, bħal Inibitur Selettiv tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRI) jew Inibitur tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRI) jew Inibitur tal-Monoamine Oxidase (MAOI), jista' jżid ir-riskju tas-sindrome tas-serotonin, li hija kundizzjoni li tista' tkun ta' periklu għall-ħajja.

Instanyl mhux irrakkomandat għall-użu f'pazjenti li rċevew Inibituri ta' Monoamine Oxidase (MAOIs) fi żmien 14-il ġurnata, minħabba li b'analġeżiċi opioid kien irrapportat żjieda severa fil-qawwa, li ma tistax titbassar minn inibituri ta' MAO.

Fentanyl huwa prinipalment metabolizzat permezz tas-sistema ta' isoenzimi ta' citokromi umani P450 3A4 (CYP3A4), għalhekk interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħhu meta Instanyl jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw l-attività ta' CYP3A4. L-ghoti flimkien ma' prodotti mediċinali li jinduċu l-attività ta' 3A4 jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' impedituri qawwija CYP3A4 (eż. ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, u nelfinavir) jew impedituri moderati (eż., amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, u verapamil) jistgħu jirriżultaw f'żieda fil-koncentrazzjonijiet ta' fentanyl fil-plażma, li jista' jwassal għal reazzjonijiet avversi għal medicina li jinkludi wkoll depressjoni respiratorja li tista' twassal għal mewt. Pazjenti li jirċievu Instanyl fl-istess hin ma' impedituri moderati jew qawwija ta' CYP3A4 għandhom ikunu monitorati b'attenzjoni għal perjodu twil ta' żmien. Żieda fid-doża għandha ssir b'kawtela.

Fi studju ta' interazzjoni farmakokinetika, instab li l-koncentrazzjoni massima ta' fentanyl li jittiehed mill-imnieher għol plażma tnaqqset b'50% bl-użu fl-istess hin ta' oxymetazoline, filwaqt li l-hin sabiex jintlahaq C_{max} (T_{max}) kien irdoppjat. Dan jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. Huwa rakkomandat li l-użu fl-istess hin ma' dekonġestanti tal-imnieher jiġi evitat (ara sezzjoni 5.2).

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' sedattivi oħra li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali (li jinkludu opiojdi, sedattivi, ipnotiċi, anestetiki ġenerali, phenothiazines, kalmanti, antiĥistamini sedattivi u alkoholi), rilassaturi tal-muskoli skeletriċi, u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin) jistgħu jikkawżaw effetti depressanti addittivi: jistgħu jseħhu iperventilazzjoni, pressjoni baxxa, sedazzjoni qawwija, depressjoni respiratorja, koma jew mewt. Għalhekk, l-użu ta' kwalunkwe wiehed minn dawn il-prodotti mediċinali fl-istess hin ma' Instanyl jeħtieġ kura speċjali u osservazzjoni tal-pazjent.

L-użu fl-istess hin ta' opiojdi ma' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jżid ir-riskju ta' sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt minħabba effett depressanti fuq is-CNS addittiv. Id-doża u t-tul ta' żmien tal-użu fl-istess hin għandhom ikunu limitati (ara sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess hin ta' agonisti/antagonisti ta' opiojdi parzjali (eż. buprenorphine, nalbuphine, pentazocine) mhux rakkomandat. Huma għandhom affinità għolja għal riċettaturi tal-opiojdi b'attività intrinsika relattivament baxxa u għalhekk parzjalment jantagonizzaw l-effett anaġeżiku ta' fentanyl, u jistgħu jinduċu sintomi ta' nuqqas ta' teħid tal-prodott f'pazjenti dipendenti fuq opiojdi.

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' prodotti mediċinali oħrajn (għajr oxymetazoline) mogħtjin mill-imnieher ma' ġieħ evalwat fil-provi kliniċi. Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat modi alternattivi ta' għoti għal trattament fl-istess hin ta' mard konkurrenti li jista' jiġi ttrattat billi jingħata mill-imnieher.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

M'hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta' fentanyl waqt it-tqala. Studji f'annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala jekk m'hemmx b'żonn ċar u jekk il-benefiċċju potenzjali ma jkunx akbar mir-riskji.

Wara trattament fuq perjodu ta' żmien twil, fentanyl jista' jikkawża effetti ta' rtirar fit-tarbija li għadha titwield.

Huwa rakkomandat sabiex fentanyl ma jintużax waqt il-hlas u t-twelid (li tinkludi biċ-ċesarja) peress li fentanyl jgħaddi minn għol-plaċenta u jista' jikkawża depressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Jekk ingħata Instanyl, antidot għat-tarbija għandu jkun faċilment disponibbli.

Treddigh

Fentanyl jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider u jista' jikkawża sedazzjoni u depressjoni respiratorja fit-tarbija li qed tiġi mredda'. Fentanyl m'għandux jintuża minn nisa li qed iredgħu u t-treddigh m'għandux jerga jinbeda qabel ta' l-inqas 5 ijiem wara l-aħħar għoti ta' fentanyl.

Fertilità

M'hemmx tagħrif disponibbli dwar kif jaffettwa l-fertilità fil-bniedem. Fi studji fuq l-annimali, il-fertilità tar-raġel u tal-mara kienet indebolita f' doži sedattivi (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni. Madankollu, analġeżiċi ta' opiojodi huma magħrufin li jimpedixxu l-abbilità mentali u/jew fiżika meħtieġa biex issuq jew thaddem inġenji. Il-pazjenti li qegħdin jingħataw trattament b'Instanyl għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew ihaddmu magni. Instanyl jista' jikkawża ngħas, ikollhom sturdamenti, disturbi viżivi jew reazzjonijiet avversi oħra li jistgħu jaffettwaw il-hila għas-sewqan jew it-thaddim ta' magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi tipiċi għal opiojodi huma mistennija b'Instanyl. B'mod frekwenti, hafna minn dawn ma jibqgħux jew jonqsu mill-intensità bl-użu kontinwu tal-prodott mediċinali. L-aktar reazzjonijiet avversi serji huma depressjoni respiratorja (li jista' jwassal għal apnea jew arrest respiratorju), depressjoni ċirkulatorja, pressjoni baxxa u xokk u kull pazjent għandu jiġi monitorat mill-qrib għal dawn.

Ir-reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma tal-anqas possibilmment marbuta ma' trattament fil-provi kliniċi ta' Instanyl huma inklużi fit-tabella hawn isfel.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Il-kategoriji li ġejjin huma użati biex jiggradaw l-effetti mhux mixtieqa skont kif isehħu: komuni hafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1000$ sa $< 1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1000$); u rari hafna ($< 1/10,000$), mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżlin skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu irrapportati b'Instanyl u/jew komposti oħra li fihom fentanyl waqt studji kliniċi u fl-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-suq:

| Sistema tal-klassifika tal-organi | Komuni | Mhux komuni | Mhux maghruf |
|---|----------------------------------|--|---|
| Disturbi fis-sistema immunitarja | | | Xokk anafilattiku, reazzjoni anafilattika, sensitività eċċessiva |
| Disturbi psikjatriċi | | Nuqqas ta' rqaq | Alluċinazzjoni, delirju, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga |
| Disturbi fis-sistema nervuża | Nġhas, sturdament, uġiġh ta' ras | Sedazzjoni, mijklonus, paraestesja, disaestesja, disġewsja | Konvulzjonijiet; telf ta' konossenza |
| Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika | Vertiġini | Deni taċ-ċaqlieg | |
| Disturbi fil-qalb | | Pressjoni baxxa | |
| Disturbi vaskulari | Fwawar, fawra shuna | | |
| Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali | Irritazzjoni fil-grizmejn | Depressjoni respiratorja, epistassi, ulċera nażali, rinorrea | Perforazzjoni tas-septum tal-immieher, qtugħ ta' nifs |
| Disturbi gastro-intestinali | Tqalligħ, remettar | Stitikezza, stomatite, ħalq xott | Dijarea |
| Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda | Iperidrosi | Uġiġh tal-ġilda, ħakk | |
| Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata | | Deni | Għeja kbira, telqa edema periferali, sindrome ta' rtirar tal-medicina*, sindrome ta' rtirar fit-tarbija tat-twelid, tolleranza għall-medicina |
| Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta' xi proċedura | | | Waqa' |

*sintomi ta' rtirar ta' opioids bħal dardir, rimettar, dijarea, ansjeta, tertir, roġħda, u għaraq kienu osservati b'fentanyl transmukużali

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Tolleranza

Tista' tiżviluppa tolleranza mal-użu ripetut.

Dipendenza fuq il-medicina

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal dipendenza fuq il-medicina, anki f' dozi terapewtiċi. Ir-riskju ta' dipendenza fuq il-medicina jista' jvarja skont il-fatturi ta' riskju individwali tal-pazjent, id-dożagġ, u t-tul tat-trattament bl-oppjojdi (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott medicinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott medicinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sinjali u s-sintomi ta' doża eċċessiva b'fentanyl huma mistennija li jkunu estensjoni tal-azzjonijiet farmakoloġiċi tiegħu eż. għeja eċċessiva, koma u dipressjoni respiratorja severa. Sinjali oħra għandhom mnejn jinkludu ipotermja, tnaqqis fit-tonalità muskolari, bradikardja u pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċità huma sedazzjoni profonda, atassja, mijosi, konvulsjonijiet u depressjoni respiratorja, bħala s-sintomu ewlieni. Għet osservata wkoll lewkoencefalopatija tossika b' doża eċċessiva ta' fentanyl.

Gew osservati każijiet ta' respirazzjoni ta' Cheynes Stokes b' doża eċċessiva ta' fentanyl, b' mod partikolari f' pazjenti bi storja medika ta' insuffiċjenza tal-qalb.

Trattament

Għal ġestjoni ta' depressjoni respiratorja kontramizuri immedjati għandhom jinbdew li jinkludu stimolazzjoni fiżika u verbali tal-pazjent. Dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu segwiti bl-għoti ta' antagonista opiojdi speċifiku bħal naloxone. Depressjoni respiratorja li ssegwi doża eċċessiva tista' tibqa' għaddejja lil hinn mit-tul ta' azzjoni tal-antagonista opiojdi. Il-half-life tal-antagonista tista' tkun qasira, għalhekk l-għoti ripetuti jew infużjoni kontinwa tista' tkun meħtieġa. L-invers tal-effett narkotiku jista' jirriżulta fil-bidu ta' uġiegh akut u r-rilaxx ta' catecholamines.

Jekk is-sitwazzjoni klinika tkun teħtieġ, passagġ tal-arja patenti għandu jiġi stabbilit u mantnut, possibilment b'tubu orofaringeali jew endotrakeali u l-ossiġenu għandu jiġi amministrat u r-respirazzjoni tiġi assistita jew ikkontrollata, kif meħtieġ. Temperatura adegwata tal-ġisem u t-teħid ta' fluwidu għandu jiġi mantnut.

Jekk pressjoni baxxa severa jew persistenti sseħħ, għandha tiġi kkonsiderata l-ipovolemja u l-kundizzjoni għandha tiġi ġestita b'terapija bi fluwidu parenterali xieraq.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Analġeżiċi, opiojdi, Kodiċi ATC: N02AB03

Mekkaniżmu t'azzjoni

Fentanyl huwa analġeżiku opiojdi li jirreaġixxi prinċipalment mar-riċettatur tal-opiojdi μ bħala agonista pur b'affinità baxxa għar-riċettaturi tal-opiojdi δ u κ . L-azzjoni terapewtika primarja hi analġesja. L-effetti farmakoloġiċi sekondarji huma depressjoni sekondarja, bradikardja, stitikezza, mijosi, dipendenza fiżika u ewforija.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl (50, 100 u 200 mikrogramma) ġew assessjati f'żewġ studji każwali, double-blind, inkroċjati u pivotali kontrollati bi placebo f'279 pazjent adult bil-kanċer li huma tolleranti għal opijojdi (fl-etajiet 32-86 sena) b'uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa (BTP). Il-pazjenti kellhom medja ta' bejn 1 sa 4 episodji kuljum waqt li kienu qed jieħdu terapija ta' manteniment ta' opijojdi. Pazjenti li kienu fit-tieni studju pivotali kienu pparteċipaw qabel fl-istudju farmakokinetiku ta' Instanyl jew fl-ewwel studju pivotali.

L-istudji kliniċi wrew l-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl. Ma ġiet stabilita ebda korelazzjoni bejn id-doża ta' manteniment b'opijojdi u doži b'Instanyl, madankollu fit-tieni studju pivotali, il-pazjenti li rċievew doża ta' manteniment baxxa ta' opijojdi wrew tendenza li l-uġiġh jittaffa' b'mod aktar effettiv b'qawwa aktar baxxa ta' Instanyl meta mqabbla ma' pazjenti li kienu qed jieħdu doża ta' manteniment ta' opijojdi oġhla. Din l-osservazzjoni dehret l-aktar f'pazjenti li rċievew Instanyl ta' 50 mikrogramma. Fl-istudji kliniċi f'pazjenti b'kanċer, il-qawwiet użati l-aktar frekwenti kienu dawk tal-100 u 200 mikrogramma; madankollu, il-pazjenti għandhom jiġu ttitrati għad-doża ottimali ta' Instanyl għat-trattament ta' BTP f'kanċer (ara sezzjoni 4.2).

It-tliet qawwiet ta' Instanyl urew differenzi statistikament sinifikanti ($p < 0.001$) fl-intensità ta' uġiġh oġhla wara 10 minuti (PID_{10}) meta mqabbla mal-placebo. Barra minn hekk Instanyl kien sinifikament superjuri sabiex jittaffa l-uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa wara 10, 20, 40 u 60 minuta wara li nġhata. Ir-riżultati ta' sommarju ta' PID wara 60 minuta ($SPID_{0-60}$) urew li kull qawwa ta' Instanyl kellha punteġġi medji sinifikament oġhla ta' $SPID_{0-60}$ meta mqabbla ma' placebo ($p < 0.001$) li juri li l-uġiġh jittaffa' aħjar b'Instanyl meta mqabbel ma' placebo għal 60 minuta.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Instanyl ġew ivvalutati f'pazjenti li kienu qed jieħdu l-prodott mediċinali fil-bidu tal-episodju ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. Instanyl m'għandux jintgħata minn qabel biex jilqa' għal episodji prevedibbli ta' uġiġh.

Hemm biss esperjenza ristretta b'Instanyl f'pazjenti bi trattament ta' opijojdi fl-isfond ekwivalenti għal ≥ 500 mg/jum morfina jew ≥ 200 mikrogramma/sieġha b'fentanyl li jingħata minn ġol-ġilda.

Instanyl f'doži oġhla minn 400 mikrogramma ma ġewx valutati fi provi kliniċi.

L-opjojdi jistgħu jinfluwenzaw l-assi ipotalamika-pitwitarja-adrenali jew -gonadali. Xi bidliet li jistgħu jiġu osservati jinkludu żieda tal-prolactin fis-serum, u tnaqqis ta' cortisol u testosterone fil-plażma. Sinjali u sintomi kliniċi jistgħu jidhru minn dawn il-bidliet ormonali.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fentanyl huwa lipofiliku hafna. Fentanyl jesebixxi tliet kinetiċi ta' distribuzzjoni kompartmentali. Minn tagħrif miġbur mill-animali wara li jiġi assorbit, fentanyl jiġi distribwit malajr fil-moħħ, il-qalb, il-pulmun u l-milsa li jiġu segwiti f'distribuzzjoni mill-ġdid għal muskoli u l-grass. Il-proteini fil-plażma ta' fentanyl hu madwar 80%. Il-bijodisponibilità assoluta ta' Instanyl hi madwar 89%. Tagħrif kliniku juri li fentanyl jiġi assorbit malajr hafna mill-mukosa tal-immieher. L-għoti ta' Instanyl f'doži waħdanin li jvarjaw minn 50 sa 200 mikrogramma ta' fentanyl kull doża f'pazjenti bil-kanċer li saru tolleranti għal opijojdi jirriżulta f'livell rapidu ta' C_{max} ta' bejn 0.35 sa 1.2 ng/ml. It- T_{max} medjan korrispondenti huwa ta' bejn 12-15 minuta. Madankollu, ġew osservati valuri oġhla għal T_{max} fi studju tal-proporzjonalità tad-doża f'voluntiera b'saħħithom.

Distribuzzjoni

Wara l-għoti minn ġol-vina ta' fentanyl il-half-life tal-firxa inizjali hi madwar 6 minuti u half-life simili tidher wara l-għoti mill-immieher ta' Instanyl. Il-half-life ta' eliminazzjoni hi madwar 3-4 sieġat għal Instanyl f'pazjenti bil-kanċer.

Bijotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat prinċipalment fil-fwied b'CYP3A4. Il-metabolit ewlieni, norfentanyl mhux attiv.

Eliminazzjoni

Madwar 75% ta' fentanyl jiġi eliminat fl-urina, prinċipalment permezz ta' metaboliti mhux attivi, b'inqas minn 10% tas-sustanza attiva ma tkunx mibdula. Madwar 9% tad-doża hija rkuprata fl-ippurgar prinċipalment b'hala metaboliti.

Linearità

Instanyl juri kinetiċi linejari. Il-linearità ġiet murija f'individwi b'saħħithom li ngħataw bejn 50 mikrogrammi sa 400 mikrogramma Instanyl.

Sar studju dwar l-interazzjonijiet ta' bejn medicina u oħra ma' medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher (oxymetazoline). Individwi b'rinite allergika ħadu oxymetazoline b'hala sprej tal-immieher siegħa qabel Instanyl. Kien hemm bijodisponibilità komparabbli (AUC) għal fentanyl bi u mingħajr oxymetazoline, waqt li kien hemm tnaqqis ta' C_{max} u żieda f' T_{max} ta' fentanyl b'fattur ta' tnejn meta ngħata oxymetazoline. Il-firxa globali tal-espożizzjoni ta' fentanyl f'individwi b'rinite allergika mingħajr trattament ta' qabel b'medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher hi komparabbli għal dik f'individwi b'saħħithom. L-użu konkomittanti ta' medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5).

Bijoeqwivalenza

Studju farmakokinetiku wera li l-isprej ta' Instanyl ta' doża waħda u ta' multidoži huma bijoeqwivalenti.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dozi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u riskju ta' kanċer ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bniedem.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp embrijoniku bikri fil-firien, effett fuq l-irġiel ġie osservat f'doži għoljin (300 µg/kg/jum, s.c.) u hu konsistenti mal-effetti sedattivi ta' fentanyl fi studji fuq l-annimali. Barra minn hekk studji f'firien nisa wrew fertilità mnaqqsa u żieda fil-mortalità embrijonali. Studji aktar riċenti wrew li effetti fuq l-embrijo kienu dovuti għal tossiċità maternali u mhux għal effetti diretti tas-sustanzi fuq l-embriju li qed jiżviluppa. Fi studju dwar l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid ir-rata ta' sopravivenza tal-wild kien mnaqqas b'mod sinifikanti f'doži li naqqsu l-piż maternali bi ftit. Dan l-effett jista' jkun dovut għal kura mibdula tal-omm jew effett dirett ta' fentanyl fuq il-frieħ. Ma kienux osservati effetti fuq l-iżvilupp somatiku u mgieba tal-wild. Effetti teratoġeniċi ma ntwerewx.

Studji ta' tolleranza lokali b'Instanyl fi qżieqez żgħar urew li l-ġhoti ta' Instanyl kien tollerat sew.

Studji dwar il-karċinoġeniċità (bijoanalizi alternattiv tal-ġilda ta' 26 ġimgħa fi ġrieden Tg.AC transġeniċi; studju ta' sentejn dwar il-karċinoġeniċità taħt il-ġilda fil-firien) b'fentanyl ma żvelax sejbiet li jindikaw potenzjal onkoġeniku. Evalwazzjoni ta' slides tal-moħħ mill-istudju dwar il-karċinoġeniċità żvelat leżjonijiet fil-moħħ fl-annimali li ngħataw doži għoljin ta' fentanyl citrate. Mhix magħrufa r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Disodium phosphate dihydrate
Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Tagħmlux fil-friza.
Żomm il-flixxun rasu '1 fuq.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Flixxun (ħġieġ kannella Tip 1) b'pompa tal-kejl u b'għatu għal kontra t-trab f'kaxxa ta' barra reżistenti għal ftuħ mit-tfal.

Jiġi fil-prezentazzjonijiet li ġejjin:

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni

1.8 ml li fiha 0.90 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 10 doži ta' 50 mikrogramma
2.9 ml li fiha 1.45 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 50 mikrogramma
5.0 ml li fiha 2.50 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 50 mikrogramma

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni

1.8 ml li fiha 1.80 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 10 doži ta' 100 mikrogramma
2.9 ml li fiha 2.90 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 100 mikrogramma
5.0 ml li fiha 5.00 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 100 microgramma

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni

1.8 ml li fiha 3.60 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 10 doži ta' 200 mikrogramma
2.9 ml li fiha 5.80 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 200 mikrogramma
5.0 ml li fiha 10.00 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 200 mikrogramma

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Minħabba l-użu ħażin possibbli ta' fentanyl u l-ammont possibbli tas-soluzzjoni li baqa', is-soluzzjonijiet li jintużaw għall-isprej għall-immieher għandhom jiġu ritornati b'mod sistemiku u adattat fil-kaxxa ta' barra li hi reżistenti għat-tfal u jintremew skont il-ħtiġijiet lokali jew jingħataw lura lill-ispjizerija.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka
medinfoEMEA@takeda.com

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
EU/1/09/531/001-003

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
EU/1/09/531/004-006

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
EU/1/09/531/007-009

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta' Lulju 2009
Data tal-aħħar tiġdid: 01 ta' Lulju 2019

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda
Instanyl 100 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda
Instanyl 200 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Instanyl 50 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda
Kull kontenitur b'doża waħda fih doża waħda (100 mikrolitru) ta' fentanyl citrate ekwivalenti għal 50 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 100 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda
Kull kontenitur b'doża waħda fih doża waħda (100 mikrolitru) ta' fentanyl citrate ekwivalenti għal 100 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 200 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda
Kull kontenitur b'doża waħda fih doża waħda (100 mikrolitru) ta' fentanyl citrate ekwivalenti għal 200 mikrogramma fentanyl.

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni (sprej għall-imnieher).
Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Instanyl hu indikat għall-ġestjoni ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa f'adulti li jkunu diġà qed jirċievu terapija ta' manteniment bl-opiojdi għal uġiġh kroniku mill-kanċer. L-uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa tħarrix għaddien tal-uġiġh li jseħh fi sfond ta' uġiġh persistenti li ġeneralment huwa kontrollat. Pazjenti li jirċievu terapija ta' manteniment b'opiojdi huma dwak li qed jieħdu tal-anqas 60 mg ta' morfina orali kuljum, tal-anqas 25 mikrogramma ta' fentanyl gol-gilda kull siegħa, tal-anqas 30 mg oxycodone kuljum, tal-anqas 8 mg ta' hydromorphone orali kuljum jew doża ekwianalġezika ta' opiojdi oħra għal ġimġha jew aktar.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

It-trattament għandu jinbeda minn u għandu jibqa' taħt is-sorveljanza ta' tabib b'esperjenza fil-ġestjoni ta' terapija b'opiojdi f'pazjenti b'kanċer. It-tobba għandhom iżommu f'moħħhom il-potenzjal tal-abbuż, użu ħażin, dipendenza fuq il-mediċina u doża eċċessiva ta' fentanyl (ara sezzjoni 4.4).

Požoloġija

Il-pazjenti għandhom jiġu tittrati indiviwalment għal doża li tagħtihom analġesja xierqa b'reazzjonijiet avversi ttollerati għal mediċina li jkunu qed jieħdu. Il-pazjenti għandhom jiġu monitorati b'attenzjoni waqt il-proċess ta' tittrazzjoni.

Tittrazzjoni għal doża oġhla tkun teħtieġ kuntatt mal-professjonist fil-qasam ta' kura tas-saħħa.

Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, il-possibbiltà ta' iperalġezija, it-tolleranza u l-progressjoni tal-marda sottostanti għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża ta' Instanyl għal trattament ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa indipendenti mid-doża ta' manteniment ta' kuljum ta' opijojdi fl-istudji kliniċi (ara sezzjoni 5.1).

Doża massima ta' kuljum: Trattament għal sa erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa, kull wiehed minnhom b'mhux aktar minn żewġ doži separati minn xulxin b' tal-anqas 10 minuti.


Il-pazjenti għandhom jistennew 4 sigħat qabel ma jergħu jitrattaw episodju ieħor ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa b'Instanyl kemm għal tittrazzjoni u għal terapija ta' manteniment. F'okkażjonijiet eċċezzjonali fejn episodju għdid iseħħ fi żmien bikri, il-pazjenti jistgħu jużaw Instanyl biex jitrattawh imma għandhom jistennew mill-inqas sagħtejn qabel ma jagħmlu hekk. Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament tad-doża tat-terapija bl-opijojdi fl-isfond wara analiżi mill-għdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa, ta' spiss u li jkunu f'inqas minn 4 sigħat bejn episodju u ieħor jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa f'kull 24 siegħa.

Tittrazzjoni tad-doża

Qabel mal-pazjenti jkunu tittrati b'Instanyl, huwa mistenni li l-uġiġh persistenti fl-isfond ikun ikkontrollat b'terapija ta' opijojdi kronika u li m'humiex qed iħossu aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Metodu ta' tittrazzjoni

Il-qawwa inizjali għandha tkun ta' ta' doża waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minfes, li tiġi tittrata 'l fuq kif meħtieġ permezz tal-firxa ta' qawwiet disponibbli (50, 100, u 200 mikrogramma). Jekk analġesja xierqa ma tinkisibx tista' tingħata doża bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara. Kull stadju ta' tittrazzjoni (qawwa dożata) għandu jiġi valutat f'diversi episodji.



Terapija ta' manteniment

Ġaladarba d-doża tkun stabbilita skont l-istadji deskritti hawn fuq, il-pazjent għandu jinżamm fuq din il-qawwa ta' Instanyl. Jekk il-pazjent m'għandux biżżejjed serħan mill-uġiġh, tista' tingħata doża oħra bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara dik li nġhatat qabel.

Aġġustament tad-doża

Ġeneralment, il-qawwa tad-doża ta' manteniment ta' Instanyl għandha tiżdid meta l-pazjent ikun jeħtieġ aktar minn doża waħda għal episodju ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għal diversi episodji konsekuttivi.

Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament fid-doża għat-terapija ta' opiojdi li tingħata fl-isfond wara analiżi mill-ġdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ta' spiss ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa u li jkunu f'inqas minn erba' sigħat bejn episodju u ieħor; jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh li jiġu f'daqqa kull 24 siegħa.

Jekk reazzjonijiet avversi ikunu intollerabbli jew persistenti, il-qawwa għandha titnaqqas jew it-trattament b'Instanyl għandu jiġi sostitwit b'analġesici.

Tul u għanijiet tat-trattament

Qabel ma jinbeda t-trattament b'Instanyl, għandu jkun hemm qbil dwar strateġija ta' trattament inkluż it-tul tat-trattament u l-għanijiet tat-trattament, u pjan għat-tmiem tat-trattament, flimkien mal-pazjent, f'konformità mal-linji gwida għall-ġestjoni tal-uġiġh. Waqt it-trattament, għandu jkun hemm kuntatt frekwenti bejn it-tabib u l-pazjent sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' trattament kontinwu, jiġi kkunsidrat it-twaqqif u jiġu aġġustati d-dożaġġi jekk ikun meħtieġ. Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' iperalġeżja, tolleranza u progressjoni tal-marda sottostanti (ara sezzjoni 4.4). Instanyl m'għandux jintuża għal aktar żmien milli meħtieġ.

Waqfien tat-terapija

Instanyl għandu jitwaqqaf minnufih jekk il-pazjent ma jkollux aktar episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. It-trattament għal uġiġh fl-isfond persistenti għandu jithalla kif preskritt.

Jekk ikun meħtieġ li jkun hemm waqfien tat-terapija bl-opiojdi kollha, il-pazjent għandu jiġi segwit b'attenzjoni minn tabib peress li hu meħtieġ li jkun hemm tittrazzjoni gradwali 'l isfel sabiex jiġu evitati effetti ta' rtirar minhabba waqfien f'daqqa.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani u popolazzjoni Kakektika

Tagħrif limitat fuq il-farmakokinetici, l-effikaċja u s-sigurtà huma disponibbli għall-użu f'Instanyl f'pazjenti li għandhom iktar minn 65 sena t'età. Pazjenti anzjani jista' jkun li jkollhom tneħhija mnaqqsa, half-life mtawwla u sensitività oġhla għal fentanyl milli pazjenti iżgħar. *Data* limitata dwar il-farmakinetika hija disponibbli dwar l-użu ta' fentanyl f'pazjenti kakektici (debilitati). Pazjenti kakektici jista' jkollhom tnaqqis fit-tneħhija ta' fentanyl. Għalhekk, kawtela għandha dejjem tittiehed fit-trattament ta' pazjenti anzjani, kakektici jew indeboliti.

Fi provi klinici pazjenti anzjani għandhom tendenza li d-doża effettiva f'tittrazzjoni hija inqas minn dik ta' pazjenti li għadhom m'għalqux 65 sena. Attenzjoni partikolari għandha tingħata meta Instanyl jiġi ttittrat f'pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li għandhom indeboliment fil-fwied li hu bejn moderat għal sever (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment fil-kliwi

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment fil-kliwi li hu minn moderat sa sever (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u effikaċja ta' Instanyl fit-tfal li għadhom m'għalqux 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

Mod ta' kif u mnejn jinghata

Instanyl huwa maħsub biex jinghata mill-immieher biss.

Huwa rakkomandat li ras il-pazjent tkun f'pożizzjoni wieqfa meta jinghata Instanyl.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti mingħajr terapija ta' manteniment b'opiojdi minhabba li hemm riskju miżjud ta' depressjoni respiratorja.

Kura ta' uġiġħ akut minbarra uġiġħ li jinħass.

Pazjenti li qed jiġi kkurati bi prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate.

Depressjoni respiratorja severa jew kundizzjonijiet ta' pulmun impedut b'mod sever.

Radjoterapija fuq il-wiċċ li saret qabel.

Episodji rikorrenti ta' epistassi (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minhabba r-riskji, inkluż l-eżitu fatali, assoċjati ma' esponiment aċċidentali, użu hażin, u abbuż, il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu avżati biex iżommu Instanyl f'post sikur u sigur, mhux aċċessibbli minn oħrajn.

Depressjoni respiratorja

Depressjoni respiratorja klinikament sinifikanti tista' sseħħ b'fentanyl, u l-pazjenti għandhom jiġu osservati għal dawn l-effetti. Pazjenti b'uġiġħ li jirċievu terapija ta' opiojdi kronika jiżviluppaw tolleranza għal depressjoni respiratorja u minhabba f'hekk ir-riskju għal depressjoni respiratorja f'dawn il-pazjenti jista' jkun imnaqqas. L-użu fl-istess hin ta' kalmanti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali jistgħu jgħollu r-riskju ta' depressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

Mard tal-pulmun kroniku

F'pazjenti b'mard tal-pulmun impedut kroniku, fentanyl jista' jkollu aktar reazzjonijiet avversi severi. F'dawn il-pazjenti, l-opiojdi jistgħu jnaqqsu l-prestazzjoni respiratorja.

Riskju mill-użu fl-istess hin ta' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl u mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jista' jirriżulta f'sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt. Minhabba dawn ir-riskji, riċetta għal għoti fl-istess hin ma' dawn il-mediċini sedattivi għandha tkun riżervata għal pazjenti li għalihom ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament alternattiv. Jekk tittiehed deċiżjoni biex tinħareġ riċetta għal għoti ta' Instanyl fl-istess hin ma' mediċini sedattivi, għandha tintuża l-inqas doża effettiva, u ż-żmien kemm idum it-trattament għandu jkun l-iqsar possibbli. Il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib għal sinjali u sintomi ta' depressjoni respiratorja u sedazzjoni. F'dan ir-rigward, huwa rakkomandat ħafna li l-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom jiġu infurmati dwar dawn is-sintomi (ara sezzjoni 4.5).

Funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied indebolita

Fentanyl għandu jinghata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. L-influenza ta' indeboliment tal-fwied u tal-kliewi fuq il-farmakokinetiċi ta' Instanyl ma ġewx evalwati; madankollu, meta jinghata għol-vina it-tneħħija ta' fentanyl intweriet li nbidlet minhabba l-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi minhabba alterazzjonijiet fit-tneħħija metabolika u l-proteini fil-plażma.

Pressjoni intrakranjali oġhla

Fentanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li juru evidenza ta' zieda fil-pressjoni intrakranjali, koxjenza indebolita jew koma.
Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'tumur ċerebrali jew b'gerħa fir-ras.

Mard tal-qalb

L-użu ta' fentanyl jista' jkun assoċjat ma' bradikardija. Fentanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkollhom bradiaritmija preċedenti jew diġà eżistenti. L-opiojdi jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti b'ipovolemja. Għalhekk, Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti bi pressjoni baxxa u/jew ipovolemja.

Sindrome tas-serotonin

Hija rakkomandata kawtela meta Instanyl jingħata fl-istess hin ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistemi tan-newrotrasmittituri serotoninergici.

L-iżvilupp ta' sindrome tas-serotonin li jista' jkun ta' periklu għall-ħajja jista' jseħh bl-użu konkomitanti ta' prodotti mediċinali serotoninergici bħall-Inibituri Selettivi tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRIs) u l-Inibituri tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRIs), u ma' prodotti mediċinali li jdgħajfu l-metaboliżmu tas-serotonin (inklużi l-Inibituri tal-Monoamine Oxidase [MAOIs]). Dan jista' jseħh fi hdan id-doża rakkomandata.

Is-sindrome tas-serotonin jista' jinkludi bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, alluċinazzjonijiet, koma), instabilità awtonomika (eż. takikardija, pressjoni tad-demem instabbli, ipertermija), abnormalitajiet newromuskolari (eż. iperrifleksija, nuqqas ta' koordinazzjoni, riġidità), u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea).

Jekk ikun issuspettat is-sindrome tas-serotonin, il-kura b'Instanyl għandha titwaqqaf.

Iperalġezija

Bħal fil-każ ta' opjojdi oħrajn, fil-każ ta' kontroll insuffiċjenti tal-uġiġh *b'risposta* għal zieda fid-doża ta' fentanyl, il-possibbiltà ta' iperalġezija kkawżata mill-opjojdi għandha tiġi kkunsidrata. Jistgħu jiġu indikati t-tnaqqis fid-doża ta' fentanyl jew it-twaqqif tal-kura b'fentanyl jew reviżjoni tal-kura b'fentanyl.

Kundizzjonijiet tal-imnieher

Jekk il-pazjent jesperjenza episodji rikorrenti ta' epistassi jew fastidju nażali waqt it-tehid t'Instanyl, għandu jiġi kkonsidrat li t-ttrament għal uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għandu jingħata f'għamla oħra.

Riħ komuni

Il-firxa globali għall-esponiment ta' fentanyl f'individwi b'riħ komuni mingħajr ma ngħataw trattament minn qabel b'vażokonstrittur tal-imnieher hu komparabbli ma' individwi b'saħħithom. Għal użu fl-istess hin ta' vażokonstrittur tal-imnieher ara sezzjoni 4.5.

Tolleranza u disturb minħabba l-użu tal-opjojdi (abbuż u dipendenza)

It-tolleranza u dipendenza fiżika u/jew psikoloġika jistgħu jiżviluppaw bl-għoti ripetut ta' opiojdi bħal fentanyl.

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal Disturb Minħabba l-Użu tal-Opjojdi (OUD, *Opioid Use Disorder*). Doża oġhla u tul itwal ta' trattament bl-opjojdi jistgħu jżidu r-riskju li tiżviluppa OUD. Abbuz jew użu ħażin ta' Instanyl li jsir b'mod intenzjonali jista' jirriżulta f'doża eċċessiva u/jew

mewt. Ir-riskju li wiehed jiżviluppa OUD jiżdied f'pazjenti bi storja medika personali jew fil-familja (ġenituri jew aħwa) ta' disturbi relatati mal-użu ta' sustanzi (inkluż disturb relatat mal-użu tal-alkoħol), f'dawk li jagħmlu użu mit-tabakk fil-preżent jew f'pazjenti bi storja medika personali ta' disturbi oħra tas-saħħa mentali (eż. depresjoni maġġuri, ansjetà u disturbi tal-personalità).

Qabel jinbada t-trattament b'Instanyl u matul it-trattament, għandu jintlaħaq qbil dwar l-għanijiet tat-trattament u pjan ta' twaqqif (ara sezzjoni 4.2). Qabel u waqt it-trattament, il-pazjent għandu jiġi infurmat ukoll dwar ir-riskji u s-sinjali ta' OUD. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk isehħu dawn is-sinjali.

Il-pazjenti jkunu jeħtieġu monitoraġġ għal sinjali ta' mgħiba ta' tiftix għad-droga (eż. meta wiehed jitlob għal mili mill-ġdid kmieni wisq). Dan jinkludi reviżjoni tal-opjojdi u mediċini psikoattivi (bħal benzodiazepines). Għal pazjenti b'sinjali u sintomi ta' OUD, għandha tiġi kkunsidrata l-konsultazzjoni ma' speċjalista dwar id-dipendenza.

Sintomi ta' tiżmin

Sintomi ta' tiżmin jistgħu jiġu preċipitati bl-għoti ta' sustanzi b'attività antagonista għal opiojdi, eż. naloxone, jew taħlita analġeżika b'agonista/antagonista (eż. pentazocine, butorphanol, buprenorphine, nalbuphine).

Disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad

L-opjojdi jistgħu jikkawżaw disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad, inklużi apnea tal-irqad ċentrali (CSA, *central sleep apnoea*) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. L-użu tal-opjojdi jżid ir-riskju ta' CSA b'mod dipendenti fuq id-doża. F'pazjenti li jkollhom CSA, ikkunsidra li tnaqqas id-dożaġġ totali ta' opjojdi.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

L-użu fl-istess hin ta' prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate u fentanyl huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

L-għoti fl-istess hin ta' fentanyl ma' sustanza serotoninergika, bħal Inibitur Selettiv tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRI) jew Inibitur tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRI) jew Inibitur tal-Monoamine Oxidase (MAOI), jista' jżid ir-riskju tas-sindrome tas-serotonin, li hija kundizzjoni li tista' tkun ta' periklu għall-ħajja.

Instanyl mhux irrakkomandat għall-użu f'pazjenti li rċevew Inibituri ta' Monoamine Oxidase (MAOIs) fi żmien 14-il ġurnata, minħabba li b'analġeżiċi opioid kien irrapporatat żjieda severa fil-qawwa, li ma tistax titbassar minn inibituri ta' MAO.

Fentanyl huwa prinipalment metabolizzat permezz tas-sistema ta' isoenżimi ta' ċitokromi umani P450 3A4 (CYP3A4), għalhekk interazzjonijiet potenzjali jistgħu jsehħu meta Instanyl jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw l-attività ta' CYP3A4. L-għoti flimkien ma' prodotti mediċinali li jinduċu l-attività ta' 3A4 jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' impedituri qawwija CYP3A4 (eż. ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, u nelfinavir) jew impedituri moderati (eż., amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, u verapamil) jistgħu jirriżultaw f'żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' fentanyl fil-plażma, li jista' jwassal għal reazzjonijiet avversi għal mediċina li jinkludi wkoll depressjoni respiratorja li tista' twassal għal mewt. Pazjenti li jirċievu Instanyl fl-istess hin ma' impedituri moderati jew qawwija ta' CYP3A4 għandhom ikunu monitorati b'attenzjoni għal perjodu twil ta' żmien. Żieda fid-doża għandha ssir b'kawtela.

Fi studju ta' interazzjoni farmakokinetika, instab li l-konċentrazzjoni massima ta' fentanyl li jittiehed mill-imnieher ġol plażma tnaqqset b'50% bl-użu fl-istess hin ta' oxymetazoline, filwaqt li l-hin sabieħ

jintlaħaq C_{max} (T_{max}) kien irdoppjat. Dan jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. Huwa rakkomandat li l-użu fl-istess ħin ma' dekonġestanti tal-immieher jiġi evitat (ara sezzjoni 5.2).

L-użu fl-istess ħin ta' Instanyl ma' sedattivi oħra li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali (li jinkludu opiojdi, sedattivi, ipnotiċi, anestetiki ġenerali, phenothiazines, kalmanti, antiĥistamini sedattivi u alkoħol), rilassaturi tal-muskoli skeletriċi, u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin), jistgħu jikkawżaw effetti depressanti addittivi: jistgħu jseħħu iperventilazzjoni, pressjoni baxxa, sedazzjoni qawwiya, depressjoni respiratorja, koma jew mewt. Għalhekk, l-użu ta' kwalunkwe wieħed minn dawn il-prodotti mediċinali fl-istess ħin ma' Instanyl jeħtieġ kura speċjali u osservazzjoni tal-pazjent.

L-użu fl-istess ħin ta' opiojdi ma' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jżid ir-riskju ta' sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt minħabba effett depressanti fuq is-CNS addittiv. Id-doża u t-tul ta' żmien tal-użu fl-istess ħin għandhom ikunu limitati (ara sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess ħin ta' agonisti/antagonisti ta' opiojdi parzjali (eż. buprenorphine, nalbuphine, pentazocine) mhux rakkomandat. Huma għandhom affinità għolja għal riċettaturi tal-opiojdi b'attività intrinsika relattivament baxxa u għalhekk parzjalment jantagonizzaw l-effett anaġeżiku ta' fentanyl, u jistgħu jinduċu sintomi ta' nuqqas ta' teħid tal-prodott f'pazjenti dipendenti fuq opiojdi.

L-użu fl-istess ħin ta' Instanyl ma' prodotti mediċinali oħrajn (għajr oxymetazoline) mogħtjin mill-immieher ma' ġiex evalwat fil-provi kliniċi. Huwa rakkomandat li jiġu kkunsidrati modi alternattivi ta' għoti għal trattament fl-istess ħin ta' mard konkurrenti li jista' jiġi ttrattat billi jingħata mill-immieher.

4.6 Fertilità, tqala u treddiġh

Tqala

M'hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta' fentanyl waqt it-tqala. Studji f'annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala jekk m'hemmx bżonn ċar u jekk il-benefiċċju potenzjali ma jkunx akbar mir-riskji.

Wara trattament fuq perjodu ta' żmien twil, fentanyl jista' jikkawża effetti ta' rtirar fit-tarbija li għadha titwieled.

Huwa rakkomandat sabiex fentanyl ma jintużax waqt il-ħlas u t-twelid (li tinkludi biċ-ċesarja) peress li fentanyl jgħaddi minn ġol-plaċenta u jista' jikkawża depressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Jekk ingħata Instanyl, antidot għat-tarbija għandu jkun faċilment disponibbli.

Treddiġh

Fentanyl jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider u jista' jikkawża sedazzjoni u depressjoni respiratorja fit-tarbija li qed tiġi mredda'. Fentanyl m'għandux jintuża minn nisa li qed ireddeġu u t-treddiġh m'għandux jerga jinbeda qabel ta' l-inqas 5 ijiem wara l-aħħar għoti ta' fentanyl.

Fertilità

M'hemmx tagħrif disponibbli dwar kif jaffettwa l-fertilità fil-bniedem. Fi studji fuq l-annimali, il-fertilità tar-raġel u tal-mara kienet indebolita f'doži sedattivi (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni. Madankollu, analġeziċi ta' opiojdi huma magħrufin li jimpedixxu l-abbiltà mentali u/jew fiżika meħtieġa biex issuq jew thaddem inġenji. Il-pazjenti li qegħdin jingħataw trattament b'Instanyl għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew ihaddmu magni. Instanyl jista' jikkawża nġhas, ikollhom sturdamenti, disturbi viżivi jew reazzjonijiet avversi oħra li jistgħu jaffettwaw il-hila għas-sewqan jew it-thaddim ta' magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi tipiċi għal opiojodi huma mistennija b'Instanyl. B'mod frekwenti, hafna minn dawn ma jibqgħux jew jonqsu mill-intensità bl-użu kontinwu tal-prodott mediċinali. L-aktar reazzjonijiet avversi serji huma depressjoni respiratorja (li jista' jwassal għal apnea jew arrest respiratorju), depressjoni ċirkulatorja, pressjoni baxxa u xokk u kull pazjent għandu jiġi monitorat mill-qrib għal dawn.

Ir-reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma tal-anqas possibilmment marbuta ma' trattament fil-provi kliniċi ta' Instanyl huma inklużi fit-tabella hawn isfel.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Il-kategoriji li ġejjin huma użati biex jiggradaw l-effetti mhux mixtieqa skont kif isehħu: komuni hafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1000$ sa $< 1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1000$); u rari hafna ($< 1/10,000$), mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżlin skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu irrapportati b'Instanyl u/jew komposti oħra li fihom fentanyl waqt studji kliniċi u fl-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq:

| Sistema tal-klassifika tal-organi | Komuni | Mhux komuni | Mhux magħruf |
|--|----------------------------------|--|--|
| Disturbi fis-sistema immunitarja | | | Xokk anafilattiku, reazzjoni anafilattika, sensitività eċċessiva |
| Disturbi psikjatriċi | | Nuqqas ta' rqaq | Alluċinazzjoni, delirju, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga |
| Disturbi fis-sistema nervuża | Nghas, sturdament, uġiġh ta' ras | Sedazzjoni, mijklonus, paraestesja, disaestesja, disgewsja | Konvulżjonijiet, telf ta' konoxxenza |
| Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika | Vertigini | Deni taċ-ċaqliegħ | |
| Disturbi fil-qalb | | Pressjoni baxxa | |
| Disturbi vaskulari | Fwawar, fawra shuna | | |
| Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali | Irritazzjoni fil-grizmejn | Depressjoni respiratorja, epistassi, ulċera nazali, rinorrea | Perforazzjoni tas-septum tal-immieher, qtugħ ta' nifs |
| Disturbi gastro-intestinali | Tqalliġh, remettar | Stitikezza, stomatite, ħalq xott | Dijarea |
| Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda | Iperidrosi | Uġiġh tal-ġilda, ħakk | |

| Sistema tal-klassifika tal-organi | Komuni | Mhux komuni | Mhux magħruf |
|---|--------|-------------|---|
| Disturbi fis-sistema immunitarja | | | Xokk anafilattiku, reazzjoni anafilattika, sensitività eċċessiva |
| Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jinghata | | Deni | Għeja kbira, telqa edema periferali, sindrome ta' rtirar tal-medicina*, sindrome ta' rtirar fit-tarbija tat-twelid, tolleranza għall-medicina |
| Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta' xi proċedura | | | Waqa' |

*sintomi ta' rtirar ta' opioids bhal dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir, roġhda, u għaraq kienu osservati b'fentanyl transmukozali

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Tolleranza

Tista' tiżviluppa tolleranza mal-użu ripetut.

Dipendenza fuq il-medicina

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal dipendenza fuq il-medicina, anki f'dozi terapewtiċi. Ir-riskju ta' dipendenza fuq il-medicina jista' jvarja skont il-fatturi ta' riskju individwali tal-pazjent, id-dożaġġ, u t-tul tat-trattament bl-oppjojdi (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott medicinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott medicinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sinjali u s-sintomi ta' doża eċċessiva b'fentanyl huma mistennija li jkunu estensjoni tal-azzjonijiet farmakoloġiċi tiegħu eż. għeja eċċessiva, koma u dipressjoni respiratorja severa. Sinjali oħra għandhom mnejn jinkludu ipotermja, tnaqqis fit-tonalità muskolari, bradikardja u pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċità huma sedazzjoni profonda, atassja, mijosi, konvulsjonijiet u depressjoni respiratorja bhala s-sintomu ewlieni. Giet osservata wkoll lewkoenċefalopatija tossika b'doża eċċessiva ta' fentanyl.

Ġew osservati każijiet ta' respirazzjoni ta' Cheynes Stokes b'doża eċċessiva ta' fentanyl, b'mod partikolari f'pazjenti bi storja medika ta' insuffiċjenza tal-qalb.

Trattament

Għal ġestjoni ta' depressjoni respiratorja kontramizuri immedjati għandhom jinbdeu li jinkludu stimolazzjoni fiżika u verbali tal-pazjent. Dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu segwiti bl-għoti ta' antagonista opiojdi speċifiku bhal naloxone. Depressjoni respiratorja li ssegwi doża eċċessiva tista'

tibqa' għaddejja lil hinn mit-tul ta' azzjoni tal-antagonista opiojdi. Il-half-life tal-antagonista tista' tkun qasira, għalhekk l-għoti ripetut jew infużjoni kontinwa tista' tkun meħtieġa. L-invers tal-effett narkotiku jista' jirriżulta fil-bidu ta' uġiġħ akut u r-rilaxx ta' catecholamines.

Jekk is-sitwazzjoni klinika tkun teħtieġ, passagg' tal-arja patenti għandu jiġi stabbilit u mantnut, possibilmnt b'tubu orofaringeali jew endotrakeali u l-ossigenu għandu jiġi amministrat u r-respirazzjoni tiġi assistita jew ikkontrollata, kif meħtieġ. Temperatura adegwata tal-gisem u t-teħid ta' fluwidu għandu jiġi mantnut.

Jekk pressjoni baxxa severa jew persistenti sseħħ, għandha tiġi kkonsidrata l-ipovolemja u l-kundizzjoni għandha tiġi ġestita b'terapja bi fluwidu parenterali xieraq.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Analġeżiċi, opiojdi, Kodiċi ATC: N02AB03

Mekkaniżmu t'azzjoni

Fentanyl huwa analġeżiku opiojdi li jirreaġixxi prinċipalment mar-riċettatur tal-opiojdi μ bħala agonista pur b'affinità baxxa għar-riċettaturi tal-opiojdi δ u κ . L-azzjoni terapewtika primarja hi analġesja. L-effetti farmakoloġiċi sekondarji huma depressjoni sekondarja, bradikardja, stitikezza, mijosi, dipendenza fiżika u ewforja.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl (50, 100 u 200 mikrogramma) ġew assessjati f'żewġ studji każwali, double-blind, inkroċjati u pivotali kontrollati bi placebo f'279 pazjent adult bil-kanċer li huma tolleranti għal opiojdi (fl-etajiet 32-86 sena) b'uġiġħ qawwi li jiġi f'daqqa (BTP). Il-pazjenti kellhom medja ta' bejn 1 sa 4 episodji kuljum waqt li kienu qed jieħdu terapja ta' manteniment ta' opiojdi. Pazjenti li kienu fit-tieni studju pivotali kienu pparteċipaw qabel fl-istudju farmakokinetiku ta' Instanyl jew fl-ewwel studju pivotali.

L-istudji kliniċi wrew l-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl. Ma ġiet stabilita ebda korelazzjoni bejn id-doża ta' manteniment b'opiojdi u dozi b'Instanyl, madankollu fit-tieni studju pivotali, il-pazjenti li rċiew doża ta' manteniment baxxa ta' opiojdi wrew tendenza li l-uġiġħ jittaffa' b'mod aktar effettiv b'qawwa aktar baxxa ta' Instanyl meta mqabbla ma' pazjenti li kienu qed jieħdu doża ta' manteniment ta' opiojdi oġhla. Din l-osservazzjoni dehret l-aktar f'pazjenti li rċiew Instanyl ta' 50 mikrogramma. Fl-istudji kliniċi f'pazjenti b'kanċer, il-qawwiet użati l-aktar frekwenti kienu daww tal-100 u 200 mikrogramma; madankollu, il-pazjenti għandhom jiġu ttitrati għad-doża ottimali ta' Instanyl għat-trattament ta' BTP f'kanċer (ara sezzjoni 4.2).

It-tliet qawwiet ta' Instanyl urew differenzi statistikament sinifikanti ($p < 0.001$) fl-intensità ta' uġiġħ oġhla wara 10 minuti (PID_{10}) meta mqabbla mal-placebo. Barra minn hekk Instanyl kien sinifikament superjuri sabiex jittaffa l-uġiġħ qawwi li jiġi f'daqqa wara 10, 20, 40 u 60 minuta wara li nġhata. Ir-riżultati ta' sommarju ta' PID wara 60 minuta ($SPID_{0-60}$) urew li kull qawwa ta' Instanyl kellha punteġġi medji sinifikament oġhla ta' $SPID_{0-60}$ meta mqabbla ma' placebo ($p < 0.001$) li juri li l-uġiġħ jittaffa' ahjar b'Instanyl meta mqabbel ma' placebo għal 60 minuta.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Instanyl ġew ivvalutati f'pazjenti li kienu qed jieħdu l-prodott mediċinali fil-bidu tal-episodju ta' uġiġħ qawwi li jiġi f'daqqa. Instanyl m'għandux jintgħata minn qabel biex jilqa' għal episodji prevedibbli ta' uġiġħ.

Hemm biss esperjenza ristretta b'Instanyl f'pazjenti bi trattament ta' opiojdi fl-isfond ekwivalenti għal ≥ 500 mg/jum morfina jew ≥ 200 mikrogramma/sieġha b'fentanyl li jingħata minn ġol-ġilda.

Instanyl f' dozi oghla minn 400 mikrogramma ma ġewx valutati fi provi kliniċi.

L-opjojdi jistgħu jinfluenzaw l-assi ipotalamika-pitwitarja-adrenali jew -gonadali. Xi bidliet li jistgħu jiġu osservati jinkludu żieda tal-prolactin fis-serum, u tnaqqis ta' cortisol u testosterone fil-plażma. Sinjali u sintomi kliniċi jistgħu jidhru minn dawn il-bidliet ormonali.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fentanyl huwa lipofiliku ħafna. Fentanyl jesebixxi tliet kinetiċi ta' distribuzzjoni kompartmentali. Minn tagħrif miġbur mill-animali wara li jiġi assorbit, fentanyl jiġi distribwit malajr fil-moħħ, il-qalb, il-pulmun u l-milsa li jiġu segwiti f' distribuzzjoni mill-ġdid għal muskoli u l-grass. Il-proteini fil-plażma ta' fentanyl hu madwar 80%. Il-bijodisponibilità assoluta ta' Instanyl hi madwar 89%. Tagħrif kliniku juri li fentanyl jiġi assorbit malajr ħafna mill-mukosa tal-immieher. L-ġhoti ta' Instanyl f' dozi waħdanin li jvarjaw minn 50 sa 200 mikrogramma ta' fentanyl kull doża f' pazjenti bil-kanċer li saru tolleranti għal opijojdi jirriżulta f' livell rapidu ta' C_{max} ta' bejn 0.35 sa 1.2 ng/ml. It- T_{max} medjan korrispondenti huwa ta' bejn 12-15 minuta. Madankollu, ġew osservati valuri oghla għal T_{max} fi studju tal-proporzjonalità tad-doża f' voluntiera b'saħħithom.

Distribuzzjoni

Wara l-ġhoti minn ġol-vina ta' fentanyl il-half-life tal-firxa inizjali hi madwar 6 minuti u half-life simili tidher wara l-ġhoti mill-immieher ta' Instanyl. Il-half-life ta' eliminazzjoni hi madwar 3-4 sigħat għal Instanyl f' pazjenti bil-kanċer.

Bijotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat prinċipalment fil-fwied b'CYP3A4. Il-metabolit ewlieni, norfentanyl mhux attiv.

Eliminazzjoni

Madwar 75% ta' fentanyl jiġi eliminat fl-urina, prinċipalment permezz ta' metaboliti mhux attivi, b'inqas minn 10% tas-sustanza attiva ma tkunx mibdula. Madwar 9% tad-doża hija rkuprata fl-ippurġar prinċipalment bħala metaboliti.

Linearità

Instanyl juri kinetiċi linejari. Il-linearità ġiet murija f' individwi b'saħħithom li ngħataw bejn 50 mikrogrammi sa 400 mikrogramma Instanyl. Sar studju dwar l-interazzjonijiet ta' bejn medicina u oħra ma' medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher (oxymetazoline). Individwi b'rinite allergika ħadu oxymetazoline bħala sprej tal-immieher siegħa qabel Instanyl. Kien hemm bijodisponibilità komparabbli (AUC) għal fentanyl bi u mingħajr oxymetazoline, waqt li kien hemm tnaqqis ta' C_{max} u żieda f' T_{max} ta' fentanyl b'fattur ta' tnejn meta ngħata oxymetazoline. Il-firxa globali tal-espożizzjoni ta' fentanyl f' individwi b'rinite allergika mingħajr trattament ta' qabel b' medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher hi komparabbli għal dik f' individwi b'saħħithom. L-użu konkormittanti ta' medicina li ddejjaq il-važi tal-immieher għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5).

Bijoekwivalenza

Studju farmakokinetiku wera li l-isprej ta' Instanyl ta' doża waħda u ta' multidoži huma bijoekwivalenti.

5.3 Taghrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dozi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, u riskju ta' kanċer ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bniedem.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp embrijoniku bikri fil-firien, effett fuq l-irġiel ġie osservat f' dozi għoljin (300 µg/kg/jum, s.c.) u hu konsistenti mal-effetti sedattivi ta' fentanyl fi studji fuq l-annimali. Barra minn hekk studji f' firien nisa wrew fertilità mnaqqsqa u żiedafil-mortalità embrijonali. Studji aktar riċenti wrew li effetti fuq l-embrijo kienu dovuti għal tossiċità maternali u mhux għal effetti diretti tas-sustanzi tal-embriju li qed jiżviluppa. Fi studju dwar l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid ir-rata ta' sopravivenza tal-wild kien mnaqqs b' mod sinifikanti f' dozi li naqqsu l-piż maternali bi ffit. Dan l-effett jista' jkun dovut għal kura mibdula tal-omm jew effett dirett ta' fentanyl fuq il-frieħ. Ma kienux osservati effetti fuq l-iżvilupp somatiku u mġieba tal-wild. Effetti teratoġeniċi ma ntwerewx.

Studji ta' tolleranza lokali b' Instanyl fi qżieq żgħar urew li l-għoti ta' Instanyl kien tollerat sew.

Studji dwar il-karċinoġeniċità (bijoanalizi alternattiv tal-ġilda ta' 26 ġimgħa fi ġrieden Tg.AC transġeniċi; studju ta' sentejn dwar il-karċinoġeniċità taħt il-ġilda fil-firien) b' fentanyl ma żvelax sejbiet li jindikaw potenzjal onkoġeniku. Evalwazzjoni ta' slides tal-moħħ mill-istudju dwar il-karċinoġeniċità żvelat leżjonijiet fil-moħħ fl-annimali li ngħataw dozi għoljin ta' fentanyl citrate. Mhix magħrufa r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Disodium phosphate dihydrate
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Instanyl 50 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda 23 xahar.

Instanyl 100 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, f'kontenitur b'doża waħda 3 snin.

Instanyl 200 mikrogrammi sprej għall-imnieher, soluzzjoni, kontenitur b'doża waħda 42 xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kontenitur b'doża waħda li jikkonsisti minn kunjett (ħġieġ ċar ta' tip 1) integrat f'reċipjent ta' sprej tal-polypropylene f'folja reżistenti għal ftuħ mit-tfal.

Daqsijiet tal-pakkett: kontenituri b' doża waħda ta' 2, 6, 8 u 10.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull kontenitur b' doża waħda fih doża waħda. Il-kontenitur b' doża waħda m'għandux jiġi ttestjat qabel l-użu.

Minhabba l-użu hażin possibbli ta' fentanyl il-kontenituri b' doża waħda tal-isprej għall-immieher li ma jintużawx għandhom jiġu ritornati b' mod sistemiku u adattat fil-folja li hi reżistenti għat-tfal u jintremew skont il-htigijiet lokali jew jinghataw lura lill-ispizerija.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka
medinfoEMA@takeda.com

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Instanyl 50 mikrogrammi sprej għall-immieher, soluzzjoni, f' kontenitur b' doża waħda
EU/1/09/531/010-013

Instanyl 100 mikrogrammi sprej għall-immieher, soluzzjoni, f' kontenitur b' doża waħda
EU/1/09/531/014-017

Instanyl 200 mikrogrammi sprej għall-immieher, soluzzjoni, kontenitur b' doża waħda
EU/1/09/531/018-021

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta' Lulju 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 01 ta' Lulju 2019

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 50 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 100 mikrogramma fentanyl.

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni

Kull ml ta' soluzzjoni fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl.
Doża waħda (100 mikrolitru) fiha 200 mikrogramma fentanyl.

Għal-lista kompluta ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni (sprej għall-imnieher). DoseGuard
Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Instanyl hu indikat għall-ġestjoni ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa f'adulti li jkunu diġà qed jirċievu terapija ta' manteniment bl-opiojdi għal uġiġh kroniku mill-kanċer. L-uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa tħarrix għaddien tal-uġiġh li jseħh fi sfond ta' uġiġh persistenti li ġeneralment huwa kontrollat. Pazjenti li jirċievu terapija ta' manteniment b'opiojdi huma dwak li qed jieħdu tal-anqas 60 mg ta' morfina orali kuljum, tal-anqas 25 mikrogramma ta' fentanyl gol-gilda kull siegħa, tal-anqas 30 mg oxycodone kuljum, tal-anqas 8 mg ta' hydromorphone orali kuljum jew doża ekwivalenġezika ta' opiojdi oħra għal ġimġha jew aktar.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

It-trattament għandu jinbeda minn u għandu jibqa' taħt is-sorveljanza ta' tabib b'esperjenza fil-ġestjoni ta' terapija b'opiojdi f'pazjenti b'kanċer. It-tobba għandhom iżommu f'moħħhom il-potenzjal tal-abbuż, użu ħażin, dipendenza fuq il-mediċina u doża eċċessiva ta' fentanyl (ara sezzjoni 4.4).

Požoloġija

Il-pazjenti għandhom jiġu tittrati indiviwalment għal doża li tagħtihom analġesja xierqa b'reazzjonijiet avversi ttollerati għal mediċina li jkunu qed jieħdu. Il-pazjenti għandhom jiġu monitorati b'attenzjoni waqt il-proċess ta' tittrazzjoni.

Tittrazzjoni għal doża oġhla tkun teħtieġ kuntatt mal-professjonist fil-qasam ta' kura tas-saħħa.

Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, il-possibbiltà ta' iperalġezija, it-tolleranza u l-progressjoni tal-marda sottostanti għandhom jiġu kkunsidrati (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża ta' Instanyl għal trattament ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa huwa indipendenti mid-doża ta' manteniment ta' kuljum ta' opijojdi fl-istudji kliniċi (ara sezzjoni 5.1).

Doża massima ta' kuljum: Trattament għal sa erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa, kull wiehed minnhom b'mhux aktar minn żewġ doži separati minn xulxin b' tal-anqas 10 minuti.


Il-pazjenti għandhom jistennew 4 sigħat qabel ma jergħu jitrattaw episodju ieħor ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa b'Instanyl kemm għal tittrazzjoni u għal terapija ta' manteniment. F'okkażjonijiet eċċezzjonali fejn episodju għdid iseħħ fi żmien bikri, il-pazjenti jistgħu jużaw Instanyl biex jitrattawh imma għandhom jistennew mill-inqas sagħtejn qabel ma jagħmlu hekk. Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament tad-doża tat-terapija bl-opijojdi fl-isfond wara analiżi mill-għdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa, ta' spiss u li jkunu f'inqas minn 4 sigħat bejn episodju u ieħor jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa f'kull 24 siegħa.

Tittrazzjoni tad-doża

Qabel mal-pazjenti jkunu tittrati b'Instanyl, huwa mistenni li l-uġiġh persistenti fl-isfond ikun ikkontrollat b'terapija ta' opijojdi kronika u li m'humiex qed iħossu aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Metodu ta' tittrazzjoni

Il-qawwa inizjali għandha tkun ta' ta' doża waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minfes, li tiġi tittrata 'l fuq kif meħtieġ permezz tal-firxa ta' qawwiet disponibbli (50, 100, u 200 mikrogramma). Jekk analġesja xierqa ma tinkisibx tista' tingħata doża bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara. Kull stadju ta' tittrazzjoni (qawwa dożata) għandu jiġi valutat f'diversi episodji.



Terapija ta' manteniment

Ġaladarba d-doża tkun stabbilita skont l-istadji deskritti hawn fuq, il-pazjent għandu jinżamm fuq din il-qawwa ta' Instanyl. Jekk il-pazjent m'għandux biżżejjed serħan mill-uġiġh, tista' tingħata doża oħra bl-istess qawwa mhux aktar kmieni minn 10 minuti wara dik li nġhatat qabel.

Aġġustament tad-doża

Ġeneralment, il-qawwa tad-doża ta' manteniment ta' Instanyl għandha tiżdid meta l-pazjent ikun jeħtieġ aktar minn doża waħda għal episodju ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għal diversi episodji konsekuttivi.

Għandu jiġi kkunsidrat aġġustament fid-doża għat-terapija ta' opiojdi li tingħata fl-isfond wara analiżi mill-ġdid tal-uġiġh jekk il-pazjent ta' spiss ikollu episodji ta' uġiġh qawwi li jiġu f'daqqa u li jkunu f'inqas minn erba' sigħat bejn episodju u ieħor; jew aktar minn erba' episodji ta' uġiġh li jiġu f'daqqa kull 24 siegħa.

Jekk reazzjonijiet avversi ikunu intollerabbli jew persistenti, il-qawwa għandha titnaqqas jew it-trattament b'Instanyl għandu jiġi sostitwit b'analġesici.

Tul u għanijiet tat-trattament

Qabel ma jinbada t-trattament b'Instanyl, għandu jkun hemm qbil dwar strateġija ta' trattament inkluż it-tul tat-trattament u l-għanijiet tat-trattament, u pjan għat-tmiem tat-trattament, flimkien mal-pazjent, f'konformità mal-linji gwida għall-ġestjoni tal-uġiġh. Waqt it-trattament, għandu jkun hemm kuntatt frekwenti bejn it-tabib u l-pazjent sabiex tiġi evalwata l-ħtieġa ta' trattament kontinwu, jiġi kkunsidrat it-twaqqif u jiġu aġġustati d-dożaġġi jekk ikun meħtieġ. Fin-nuqqas ta' kontroll adegwat tal-uġiġh, għandha tiġi kkunsidrata l-possibbiltà ta' iperalġeżja, tolleranza u progressjoni tal-marda sottostanti (ara sezzjoni 4.4). Instanyl m'għandux jintuża għal aktar żmien milli meħtieġ.

Waqfien tat-terapija

Instanyl għandu jitwaqqaf minnufih jekk il-pazjent ma jkollux aktar episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. It-trattament għal uġiġh fl-isfond persistenti għandu jithalla kif preskritt.

Jekk ikun meħtieġ li jkun hemm waqfien tat-terapija bl-opiojdi kollha, il-pazjent għandu jiġi segwit b'attenzjoni minn tabib peress li hu meħtieġ li jkun hemm tittrazzjoni gradwali 'l isfel sabiex jiġu evitati effetti ta' rtirar minhabba waqfien f'daqqa.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani u popolazzjoni Kakektika

Tagħrif limitat fuq il-farmakokinetiċi, l-effikaċja u s-sigurtà huma disponibbli għall-użu f'Instanyl f'pazjenti li għandhom iktar minn 65 sena t'età. Pazjenti anzjani jista' jkun li jkollhom tneħħija mnaqqsa, half-life mtawwla u sensitività oġhla għal fentanyl milli pazjenti iżgħar. *Data* limitata dwar il-farmakinetika hija disponibbli dwar l-użu ta' fentanyl f'pazjenti kakektiċi (debilitati). Pazjenti kakektiċi jista' jkollhom tnaqqis fit-tneħħija ta' fentanyl. Għalhekk, kawtela għandha dejjem tittiehed fit-trattament ta' pazjenti anzjani, kakektiċi jew indeboliti.

Fi provi kliniċi pazjenti anzjani għandhom tendenza li d-doża effettiva f'tittrazzjoni hija inqas minn dik ta' pazjenti li għadhom m'għalqux 65 sena. Attenzjoni partikolari għandha tingħata meta Instanyl jiġi ttittrat f'pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li għandhom indeboliment fil-fwied li hu bejn moderat għal sever (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment fil-kliwi

Instanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment fil-kliwi li hu minn moderat sa sever (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u effikaċja ta' Instanyl fit-tfal li għadhom m'għalqux 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

Mod ta' kif u mnejn jingħata

Instanyl huwa maħsub biex jingħata mill-immieher biss.

Huwa rakkomandat li l-pazjent jkun bilqiegħda jew f'pożizzjoni wieqfa meta jingħata Instanyl.

Huwa meħtieġ li tnaddaf ir-ras taż-żennuna tal-isprej wara kull darba li jintuża.

Instanyl jinkorpora counter elettroniku tad-doži, u perjodu bejn id-doži li fih it-tagħmir ikun imsakkar biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta' doża eċċessiva aċċidentali, użu ħażin u abbuż, u biex jiġi pprovdut serħan ir-ras lill-pazjenti fir-rigward ta' dawn ir-riskji. Wara l-ġhoti ta' żewġ doži fi żmien 60 minuta, Instanyl se jissakkar għal perjodu ta' sagħtejn, mill-ewwel doża meħuda, qabel ma doża oħra tkun tista' tingħata.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel tagħti l-prodott mediċinali

Qabel ma tuża Instanyl għall-ewwel darba, l-isprej nażali jrid jiġi pprajmjar. Sekwenza ta' pprajmjar ta' 5 attivazzjonijiet tal-isprej nażali hi meħtieġa, u din hi indikata bhala "P5", "P4", "P3", "P2" u "P1" fid-display.

Jekk il-prodott ma jkunx intuża għall-perjodu ta' aktar minn 7 ijiem, l-isprej nażali jrid jiġi pprajmjar mill-ġdid, billi tagħmel attivazzjoni darba qabel tittiehed id-doża li jmiss; dan hu indikat bhala "P" fid-display.

Matul il-proċess ta' pprajmjar, il-prodott se jintefa' 'il barra. Għalhekk, il-pazjent irid jingħata struzzjonijiet li l-ipprajmjar għandu jitwettaq f'żona vventilata tajjeb, u li t-tagħmir ma jkunx ippuntat fid-direzzjoni ta' wcuħ u oġġetti li jistgħu jiġu f'kuntatt ma' persuni oħrajn, partikularment tfal.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wiehed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti mingħajr terapija ta' manteniment b'opiojdi minħabba li hemm riskju miżjud ta' depressjoni respiratorja.

Kura ta' uġiġħ akut minbarra uġiġħ li jinħass.

Pazjenti li qed jiġi kkurati bi prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate.

Depressjoni respiratorja severa jew kundizzjonijiet ta' pulmun impedut b'mod sever.

Radjoterapija fuq il-wiċċ li saret qabel.

Episodji rikorrenti ta' epistassi (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minħabba r-riskji, inkluż l-eżitu fatali, assoċjati ma' esponiment aċċidentali, użu ħażin, u abbuż, il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu avżati biex iżommu Instanyl f'post sikur u sigur, mhux aċċessibbli minn oħrajn.

Depressjoni respiratorja

Depressjoni respiratorja klinikament sinifikanti tista' sseħħ b'fentanyl, u l-pazjenti għandhom jiġu osservati għal dawn l-effetti. Pazjenti b'uġiġħ li jirċievu terapija ta' opiojdi kronika jiżviluppaw tolleranza għal depressjoni respiratorja u minħabba f'hekk ir-riskju għal depressjoni respiratorja f'dawn il-pazjenti jista' jkun imnaqqas. L-użu fl-istess ħin ta' kalmanti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali jistgħu jgħollu r-riskju ta' depressjoni respiratorja (ara sezzjoni 4.5).

Mard tal-pulmun kroniku

F'pazjenti b'mard tal-pulmun impedut kroniku, fentanyl jista' jkollu aktar reazzjonijiet avversi severi. F'dawn il-pazjenti, l-opiojdi jistgħu jnaqqsu l-prestazzjoni respiratorja.

Riskju mill-użu fl-istess hin ta' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl u mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jista' jirriżulta f' sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt. Minħabba dawn ir-riskji, riċetta għal għoti fl-istess hin ma' dawn il-mediċini sedattivi għandha tkun riżervata għal pazjenti li għalihom ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament alternattiv. Jekk tittiehed deċiżjoni biex tinħareġ riċetta għal għoti ta' Instanyl fl-istess hin ma' mediċini sedattivi, għandha tintuża l-inqas doża effettiva, u ż-żmien kemm idum it-trattament għandu jkun l-iqsar possibbli. Il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib għal sinjali u sintomi ta' depressjoni respiratorja u sedazzjoni. F'dan ir-rigward, huwa rakkomandat hafna li l-pazjenti u dawk li jiehdu hsiebhom jiġu infurmati dwar dawn is-sintomi (ara sezzjoni 4.5).

Funzjoni tal-kliewi jew tal-fwied indebolita

Fentanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti b'indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. L-influenza ta' indeboliment tal-fwied u tal-kliewi fuq il-farmakokinetiċi ta' Instanyl ma ġewx evalwati; madankollu, meta jingħata ġol-vina it-tneħħija ta' fentanyl intweriet li nbidlet minħabba l-indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi minħabba alterazzjonijiet fit-tneħħija metabolika u l-proteini fil-plażma.

Pressjoni intrakranjali oghla

Fentanyl għandu jingħata b'kawtela lil pazjenti li juru evidenza ta' zieda fil-pressjoni intrakranjali, koxjenza indebolita jew koma. Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'tumur ċerebrali jew b'gerħa fir-ras.

Mard tal-qalb

L-użu ta' fentanyl jista' jkun assoċjat ma' bradikardija. Fentanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti li jkollhom bradiaritmija preċedenti jew diġà eżistenti. L-opiojdi jistgħu jikkawżaw pressjoni baxxa, speċjalment f'pazjenti b'ipovolemja. Għalhekk, Instanyl għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti bi pressjoni baxxa u/jew ipovolemja.

Sindrome tas-serotonin

Hija rakkomandata kawtela meta Instanyl jingħata fl-istess hin ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistemi tan-newrotrasmittituri serotoninergici.

L-iżvilupp ta' sindrome tas-serotonin li jista' jkun ta' periklu għall-ħajja jista' jseħh bl-użu konkomitanti ta' prodotti mediċinali serotoninergici bħall-Inibituri Selettivi tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRIs) u l-Inibituri tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRIs), u ma' prodotti mediċinali li jdgħajfu l-metabolizmu tas-serotonin (inklużi l-Inibituri tal-Monoamine Oxidase [MAOIs]). Dan jista' jseħh fi hdan id-doża rakkomandata.

Is-sindrome tas-serotonin jista' jinkludi bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), instabilità awtonomika (eż. takikardija, pressjoni tad-demem instabbli, ipertermija), abnormalitajiet newromuskolari (eż. iperrifleksija, nuqqas ta' koordinazzjoni, riġidità), u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea).

Jekk ikun issuspettat is-sindrome tas-serotonin, il-kura b'Instanyl għandha titwaqqaf.

Iperalġezija

Bħal fil-każ ta' opjojdi oħrajn, fil-każ ta' kontroll insuffiċjenti tal-uġiġh *b'risposta* għal zieda fid-doża ta' fentanyl, il-possibbiltà ta' iperalġezija kkawżata mill-opjojdi għandha tiġi kkunsidrata. Jistgħu jiġu indikati t-tnaqqis fid-doża ta' fentanyl jew it-twaqqif tal-kura b'fentanyl jew revizjoni tal-kura b'fentanyl.

Kundizzjonijiet tal-imnieher

Jekk il-pazjent jesperjenza episodji rikorrenti ta' epistassi jew fastidju nażali waqt it-teħid t'Instanyl, għandu jiġi kkonsidrat li t-trattament għal uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa għandu jinghata f'għamla oħra.

Riħ komuni

Il-firxa globali għall-esponiment ta' fentanyl f'individwi b'riħ komuni mingħajr ma ngħataw trattament minn qabel b'vażokonstrittur tal-imnieher hu komparabbli ma' individwi b'saħħithom. Għal użu fl-istess ħin ta' vażokonstrittur tal-imnieher ara sezzjoni 4.5.

Tolleranza u disturb minħabba l-użu tal-opjojdi (abbuż u dipendenza)

It-tolleranza u dipendenza fiżika u/jew psikoloġika jistgħu jiżviluppaw bl-għoti ripetut ta' opiojdi bħal fentanyl.

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal Disturb Minħabba l-Użu tal-Opjojdi (OUD, *Opioid Use Disorder*). Doża ogħla u tul itwal ta' trattament bl-opjojdi jistgħu jżidu r-riskju li tiżviluppa OUD. Abbuz jew użu hażin ta' Instanyl li jsir b'mod intenzjonali jista' jirriżulta f'doża eċċessiva u/jew mewt. Ir-riskju li wiehed jiżviluppa OUD jiżjed f'pazjenti bi storja medika personali jew fil-familja (ġenituri jew aħwa) ta' disturbi relatati mal-użu ta' sustanzi (inkluż disturb relatat mal-użu tal-alkoħol), f'dawk li jagħmlu użu mit-tabakk fil-preżent jew f'pazjenti bi storja medika personali ta' disturbi oħra tas-saħħa mentali (eż. depresjoni maġġuri, ansjetà u disturbi tal-personalità).

Qabel jinbada t-trattament b'Instanyl u matul it-trattament, għandu jintlaħaq qbil dwar l-għanijiet tat-trattament u pjan ta' twaqqif (ara sezzjoni 4.2). Qabel u waqt it-trattament, il-pazjent għandu jiġi infurmat ukoll dwar ir-riskji u s-sinjali ta' OUD. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk isehħu dawn is-sinjali.

Il-pazjenti jkunu jeħtieġu monitoraġġ għal sinjali ta' mġiba ta' tiftix għad-droga (eż. meta wiehed jitlob għal mili mill-ġdid kmieni wisq). Dan jinkludi reviżjoni tal-opjojdi u medicini psikoattivi (bħal benzodiazepines). Għal pazjenti b'sinjali u sintomi ta' OUD, għandha tiġi kkunsidrata l-konsultazzjoni ma' speċjalista dwar id-dipendenza.

Sintomi ta' tiżmin

Sintomi ta' tiżmin jistgħu jiġu preċipitati bl-għoti ta' sustanzi b'attività antagonista għal opiojdi, eż. naloxone, jew taħlita analġeżika b'agonista/antagonista (eż. pentazocine, butorphanol, buprenorphine, nalbuphine).

Disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad

L-opjojdi jistgħu jikkawżaw disturbi fit-teħid tan-nifs relatati mal-irqad, inklużi apnea tal-irqad ċentrali (CSA, *central sleep apnoea*) u livell baxx ta' ossiġnu fid-demem relatat mal-irqad. L-użu tal-opjojdi jżid ir-riskju ta' CSA b'mod dipendenti fuq id-doża. F'pazjenti li jkollhom CSA, ikkunsidra li tnaqqas id-dożaġġ totali ta' opjojdi.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

L-użu fl-istess ħin ta' prodotti mediċinali li fihom sodium oxybate u fentanyl huwa kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

L-għoti fl-istess ħin ta' fentanyl ma' sustanza serotoninergika, bħal Inibitur Selettiv tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin (SSRI) jew Inibitur tat-Tehid mill-Ġdid tas-Serotonin Norepinephrine (SNRI) jew Inibitur tal-Monoamine Oxidase (MAOI), jista' jżid ir-riskju tas-sindrome tas-serotonin, li hija kundizzjoni li tista' tkun ta' periklu għall-ħajja.

Instanyl mhux irrakkomandat għall-użu f'pazjenti li rċevew Inibituri ta' Monoamine Oxidase (MAOIs) fi żmien 14-il ġurnata, minhabba li b'analgeziċi opioid kien irrapportat żjieda severa fil-qawwa, li ma tistax titbassar minn inibituri ta' MAO.

Fentanyl huwa prinipalment metabolizzat permezz tas-sistema ta' isoenżimi ta' ċitokromi umani P450 3A4 (CYP3A4), għalhekk interazzjonijiet potenzjali jistgħu jseħħu meta Instanyl jingħata flimkien ma' prodotti mediċinali li jaffettwaw l-attività ta' CYP3A4. L-ghoti flimkien ma' prodotti mediċinali li jinduċu l-attività ta' 3A4 jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' impedituri qawwija CYP3A4 (eż. ritonavir, ketoconazole, itraconazole, troleandomycin, clarithromycin, u nelfinavir) jew impedituri moderati (eż., amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazole, fosamprenavir, u verapamil) jistgħu jirriżultaw f'żieda fil-konċentrazzjonijiet ta' fentanyl fil-plażma, li jista' jwassal għal reazzjonijiet avversi għal medicina li jinkludi wkoll depressjoni respiratorja li tista' twassal għal mewt. Pazjenti li jirċievu Instanyl fl-istess hin ma' impedituri moderati jew qawwija ta' CYP3A4 għandhom ikunu monitorati b'attenzjoni għal perjodu twil ta' żmien. Żieda fid-doża għandha ssir b'kawtela.

Fi studju ta' interazzjoni farmakokinetika, instab li l-konċentrazzjoni massima ta' fentanyl li jittiehed mill-immieher ġol-plażma tnaqqset b'50% bl-użu fl-istess hin ta' oxymetazoline, filwaqt li l-hin sabiex jintlaħaq C_{max} (T_{max}) kien irdoppjat. Dan jista' jnaqqas l-effikaċja ta' Instanyl. Huwa rakkomandat li l-użu fl-istess hin ma' dekonġestanti tal-immieher jiġi evitat (ara sezzjoni 5.2).

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' sedattivi oħra li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali (li jinkludu opiojdi, sedattivi, ipnotiċi, anestetiki ġenerali, phenothiazines, kalmanti, antiġistamini sedattivi u alkoħol), rilassaturi tal-muskoli skelettriċi u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin) jistgħu jikkawżaw effetti depressanti addittivi: jistgħu jseħħu iperventilazzjoni, pressjoni baxxa, sedazzjoni qawwija, depressjoni respiratorja, koma jew mewt. Għalhekk, l-użu ta' kwalunkwe wieħed minn dawn il-prodotti mediċinali fl-istess hin ma' Instanyl jeħtieġ kura speċjali u osservazzjoni tal-pazjent.

L-użu fl-istess hin ta' opiojdi ma' mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati jżid ir-riskju ta' sedazzjoni, depressjoni respiratorja, koma u mewt minhabba effett depressanti fuq is-CNS addittiv. Id-doża u t-tul ta' żmien tal-użu fl-istess hin għandhom ikunu limitati (ara sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess hin ta' agonisti/antagonisti ta' opiojdi parzjali (eż. buprenorphine, nalbuphine, pentazocine) mhux rakkomandat. Huma għandhom affinità għolja għal riċettaturi tal-opiojdi b'attività intrinsika relattivament baxxa u għalhekk parzjalment jantagonizzaw l-effett anaġeżiku ta' fentanyl, u jistgħu jinduċu sintomi ta' nuqqas ta' teħid tal-prodott f'pazjenti dipendenti fuq opiojdi.

L-użu fl-istess hin ta' Instanyl ma' prodotti mediċinali oħrajn (għajr oxymetazoline) mogħtjin mill-immieher ma' ġieħ evalwat fil-provi kliniċi. Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat modi alternattivi ta' għoti għal trattament fl-istess hin ta' mard konkurrenti li jista' jiġi ttrattat billi jingħata mill-immieher.

4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Tqala

M'hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta' fentanyl waqt it-tqala. Studji f'annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala jekk m'hemmx b'żonn ċar u jekk il-benefiċċju potenzjali ma jkunx akbar mir-riskji.

Wara trattament fuq perjodu ta' żmien twil, fentanyl jista' jikkawża effetti ta' rtirar fit-tarbija li għadha titwieled.

Huwa rakkomandat sabiex fentanyl ma jintużax waqt il-ħlas u t-twelid (li tinkludi biċ-ċesarja) peress li fentanyl jgħaddi minn ġol-plaċenta u jista' jikkawża depressjoni respiratorja fit-tarbija tat-twelid. Jekk ingħata Instanyl, antidot għat-tarbija għandu jkun faċilment disponibbli.

Treddigh

Fentanyl jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider u jista' jikkawża sedazzjoni u depressjoni respiratorja fit-tarbija li qed tiġi mredda'. Fentanyl m'għandux jintuża minn nisa li qed iredgħu u t-treddigh m'għandux jerga jinbeda qabel ta' l-inqas 5 ijiem wara l-aħħar għoti ta' fentanyl.

Fertilità

M'hemmx tagħrif disponibbli dwar kif jaffettwa l-fertilità fil-bniedem. Fi studji fuq l-animalli, il-fertilità tar-raġel u tal-mara kienet indebolita f' doži sedattivi (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-hila biex issuq jew thaddem magni. Madankollu, analġeżiċi ta' opiojodi huma magħrufin li jimpedixxu l-abbilità mentali u/jew fiżika meħtieġa biex issuq jew thaddem inġenji. Il-pazjenti li qegħdin jingħataw trattament b'Instanyl għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew ihaddmu magni. Instanyl jista' jikkawża ngħas, ikollhom sturdamenti, disturbi viżivi jew reazzjonijiet avversi oħra li jistgħu jaffettwaw il-hila għas-sewqan jew it-thaddim ta' magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi tipiċi għal opiojodi huma mistennija b'Instanyl. B'mod frekwenti, hafna minn dawn ma jibqgħux jew jonqsu mill-intensità bl-użu kontinwu tal-prodott mediċinali. L-aktar reazzjonijiet avversi serji huma depressjoni respiratorja (li jista' jwassal għal apnea jew arrest respiratorju), depressjoni ċirkulatorja, pressjoni baxxa u xokk u kull pazjent għandu jiġi monitorat mill-qrib għal dawn.

Ir-reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma tal-anqas possibilmment marbuta ma' trattament fil-provi kliniċi ta' Instanyl huma inklużi fit-tabella hawn isfel.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

Il-kategoriji li ġejjin huma użati biex jiggradaw l-effetti mhux mixtieqa skont kif isehħu: komuni hafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa $< 1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1000$ sa $< 1/100$); rari ($\geq 1/10,000$ sa $< 1/1000$); u rari hafna ($< 1/10,000$), mhux magħruf (ma tistax tittiehed stima mid-data disponibbli). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżlin skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu irrapportati b'Instanyl u/jew komposti oħra li fihom fentanyl waqt studji kliniċi u fl-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq:

| Sistema tal-klassifika tal-organi | Komuni | Mhux komuni | Mhux magħruf |
|---|----------------------------------|--|---|
| Disturbi fis-sistema immunitarja | | | Xokk anafilattiku, reazzjoni anafilattika, sensitività eċċessiva |
| Disturbi psikjatriċi | | Nuqqas ta' rqaq | Alluċinazzjoni, delirju, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga |
| Disturbi fis-sistema nervuża | Nghas, sturdament, uġiġh ta' ras | Sedazzjoni, mijklonus, paraestesja, disaestesja, disġewsja | Konvulzjonijiet, telf ta' konossenza |
| Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika | Vertiġini | Deni taċ-ċaqlieq | |
| Disturbi fil-qalb | | Pressjoni baxxa | |
| Disturbi vaskulari | Fwawar, fawra sħuna | | |
| Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali | Irritazzjoni fil-grizmejn | Depressjoni respiratorja, epistassi, ulċera nażali, rinorrea | Perforazzjoni tas-septum tal-imnieher, qtugħ ta' nifs |
| Disturbi gastro-intestinali | Tqalligħ, remettar | Stitikezza, stomatite, ħalq xott | Dijarea |
| Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata | | Deni | Għeja kbira, telqa edema periferali, sindrome ta' rtirar tal-mediċina*, sindromu ta' rtirar fit-tarbija tat-twelid, tolleranza għall-mediċina |
| Korriment, avvelenament u komplikazzjonijiet ta' xi proċedura | | | Waqa' |

*sintomi ta' rtirar ta' opioids bħal dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir, roghda, u għaraq kienu osservati b'fentanyl transmukżali

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Tolleranza

Tista' tiżviluppa tolleranza mal-użu ripetut.

Dipendenza fuq il-mediċina

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal għal dipendenza fuq il-mediċina, anki f'dozi terapewtiċi. Ir-riskju ta' dipendenza fuq il-mediċina jista' jvarja skont il-fatturi ta' riskju individwali tal-pazjent, id-dożaġġ, u t-tul tat-trattament bl-oppjojdi (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrapportati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżzla f' [Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Is-sinjali u s-sintomi ta' doża eċċessiva b'fentanyl huma mistennija li jkunu estensjoni tal-azzjonijiet farmakoloġiċi tiegħu eż. għeja eċċessiva, koma u dipressjoni respiratorja severa. Sinjali oħra għandhom mnejn jinkludu ipotermja, tnaqqis fit-tonalità muskolari, bradikardja u pressjoni baxxa. Sinjali ta' tossiċità huma sedazzjoni profonda, atassja, mijosi, konvulsjonijiet u depressjoni respiratorja, bħala s-sintomu ewlieni. Ġiet osservata wkoll lewkoenċefalopatija tossika b' doża eċċessiva ta' fentanyl.

Ġew osservati każijiet ta' respirazzjoni ta' Cheynes Stokes b' doża eċċessiva ta' fentanyl, b' mod partikolari f' pazjenti bi storja medika ta' insuffiċjenza tal-qalb.

Trattament

Għal ġestjoni ta' depressjoni respiratorja kontramiżuri immedjati għandhom jinbdew li jinkludu stimolazzjoni fiżika u verbali tal-pazjent. Dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu segwiti bl-għoti ta' antagonista opiojdi speċifiku bħal naloxone. Depressjoni respiratorja li ssegwi doża eċċessiva tista' tibqa' għaddejja lil hinn mit-tul ta' azzjoni tal-antagonista opiojdi. Il-half-life tal-antagonista tista' tkun qasira, għalhekk l-għoti ripetuti jew infużjoni kontinwa tista' tkun meħtieġa. L-invers tal-effett narkotiku jista' jirriżulta fil-bidu ta' uġiġħ akut u r-rilaxx ta' catecholamines.

Jekk is-sitwazzjoni klinika tkun teħtieġ, passaġġ tal-arja patenti għandu jiġi stabbilit u mantnut, possibilmment b' tubu orofaringeali jew endotrakeali u l-ossigenu għandu jiġi amministrat u r-respirazzjoni tiġi assistita jew ikkontrollata, kif meħtieġ. Temperatura adegwata tal-ġisem u t-tehid ta' fluwidu għandu jiġi mantnut.

Jekk pressjoni baxxa severa jew persistenti sseħħ, għandha tiġi kkonsiderata l-ipovolemja u l-kundizzjoni għandha tiġi ġestita b' terapija bi fluwidu parenterali xieraq.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Analġeżiċi, opiojdi, Kodiċi ATC: N02AB03

Mekkaniżmu t'azzjoni

Fentanyl huwa analġeżiku opiojdi li jirreaġixxi prinċipalment mar-riċettatur tal-opiojdi μ bħala agonista pur b'affinità baxxa għar-riċettaturi tal-opiojdi δ u κ . L-azzjoni terapewtika primarja hi analġesja. L-effetti farmakoloġiċi sekondarji huma depressjoni sekondarja, bradikardja, stitikezza, mijosi, dipendenza fiżika u ewforja.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl (50, 100 u 200 mikrogramma) ġew assessjati f'żewġ studji każwali, double-blind, inkroċjati u pivotali kontrollati bi placebo f'279 pazjent adult bil-kanċer li huma tolleranti għal opiojdi (fl-etajiet 32-86 sena) b'uġiġħ qawwi li jiġi f'daqqa (BTP). Il-pazjenti kellhom

medja ta' bejn 1 sa 4 episodji kuljum waqt li kienu qed jieħdu terapija ta' manteniment ta' opiojdi. Pazjenti li kienu fit-tieni studju pivotali kienu pparteċipaw qabel fl-istudju farmakokinetiku ta' Instanyl jew fl-ewwel studju pivotali.

L-istudji kliniċi wrew l-effikaċja u s-sigurtà ta' Instanyl. Ma giet stabilita ebda korelazzjoni bejn id-doża ta' manteniment b'opiojdi u doži b'Instanyl, madankollu fit-tieni studju pivotali, il-pazjenti li rċievew doża ta' manteniment baxxa ta' opiojdi wrew tendenza li l-uġiġh jittaffa' b' mod aktar effettiv b'qawwa aktar baxxa ta' Instanyl meta mqabbla ma' pazjenti li kienu qed jieħdu doża ta' manteniment ta' opiojdi oġhla. Din l-osservazzjoni dehret l-aktar f'pazjenti li rċievew Instanyl ta' 50 mikrogramma. Fl-istudji kliniċi f'pazjenti b'kanċer, il-qawwiet użati l-aktar frekwenti kienu daww tal-100 u 200 mikrogramma; madankollu, il-pazjenti għandhom jiġu ttitrati għad-doża ottimali ta' Instanyl għat-trattament ta' BTP f'kanċer (ara sezzjoni 4.2).

It-tliet qawwiet ta' Instanyl urew differenzi statistikament sinifikanti ($p < 0.001$) fl-intensità ta' uġiġh oġhla wara 10 minuti (PID_{10}) meta mqabbla mal-plaċebo. Barra minn hekk Instanyl kien sinifikament superjuri sabiex jittaffa l-uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa wara 10, 20, 40 u 60 minuta wara li nġhata. Ir-riżultati ta' sommarju ta' PID wara 60 minuta ($SPID_{0-60}$) urew li kull qawwa ta' Instanyl kellha punteġġi medji sinifikament oġhla ta' $SPID_{0-60}$ meta mqabbla ma' plaċebo ($p < 0.001$) li juri li l-uġiġh jittaffa' aħjar b'Instanyl meta mqabbel ma' plaċebo għal 60 minuta.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Instanyl ġew ivvalutati f'pazjenti li kienu qed jieħdu l-prodott mediċinali fil-bidu tal-episodju ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. Instanyl m'għandux jintgħata minn qabel biex jilqa' għal episodji prevedibbli ta' uġiġh.

Hemm biss esperjenza ristretta b'Instanyl f'pazjenti bi trattament ta' opiojdi fl-isfond ekwivalenti għal ≥ 500 mg/jum morfina jew ≥ 200 mikrogramma/sieġha b'fentanyl li jingħata minn ġol-ġilda.

Instanyl f'doži oġhla minn 400 mikrogramma ma ġewx valutati fi provi kliniċi.

L-opjojdi jistgħu jinfluwenzaw l-assi ipotalamika-pitwitarja-adrenali jew -gonadali. Xi bidliet li jistgħu jiġu osservati jinkludu żieda tal-prolactin fis-serum, u tnaqqis ta' cortisol u testosterone fil-plażma. Sinjali u sintomi kliniċi jistgħu jidhru minn dawn il-bidliet ormonali.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fentanyl huwa lipofiliku ħafna. Fentanyl jesebixxi tliet kinetiċi ta' distribuzzjoni kompartmentali. Minn tagħrif miġbur mill-annimali wara li jiġi assorbit, fentanyl jiġi distribwit malajr fil-moħħ, il-qalb, il-pulmun u l-milsa li jiġu segwiti f'distribuzzjoni mill-ġdid għal muskoli u l-grass. Il-proteini fil-plażma ta' fentanyl hu madwar 80%. Il-bijodisponibilità assoluta ta' Instanyl hi madwar 89%. Tagħrif kliniku juri li fentanyl jiġi assorbit malajr ħafna mill-mukosa tal-immieher. L-għoti ta' Instanyl f'doži waħdanin li jvarjaw minn 50 sa 200 mikrogramma ta' fentanyl kull doża f'pazjenti bil-kanċer li saru tolleranti għal opiojdi jirriżulta f'livell rapidu ta' C_{max} ta' bejn 0.35 sa 1.2 ng/ml. It- T_{max} medjan korrispondenti huwa ta' bejn 12-15 minuta. Madankollu, ġew osservati valuri oġhla għal T_{max} fi studju tal-proporzjonalità tad-doża f'voluntiera b'saħħithom.

Distribuzzjoni

Wara l-għoti minn ġol-vina ta' fentanyl il-half-life tal-firxa inizjali hi madwar 6 minuti u half-life simili tidher wara l-għoti mill-immieher ta' Instanyl. Il-half-life ta' eliminazzjoni hi madwar 3-4 sieġha għal Instanyl f'pazjenti bil-kanċer.

Bijotrasformazzjoni

Fentanyl jiġi metabolizzat prinċipalment fil-fwied b'CYP3A4. Il-metabolit ewlieni, norfentanyl mhux attiv.

Eliminazzjoni

Madwar 75% ta' fentanyl jiġi eliminat fl-urina, prinċipalment permezz ta' metaboliti mhux attivi, b'inqas minn 10% tas-sustanza attiva ma tkunx mibdula. Madwar 9% tad-doża hija rkuprata fl-ippurġar prinċipalment bhala metaboliti.

Linearità

Instanyl juri kinetiċi linejari. Il-linearità ġiet murija f'individwi b'saħħithom li ngħataw bejn 50 mikrogrammi sa 400 mikrogramma Instanyl. Sar studju dwar l-interazzjonijiet ta' bejn mediċina u oħra ma' mediċina li ddejjjaq il-važi tal-immieher (oxymetazoline). Individwi b'rinite allergika ħadu oxymetazoline bhala sprej tal-immieher siegħa qabel Instanyl. Kien hemm bijodisponibilità komparabbli (AUC) għal fentanyl bi u mingħajr oxymetazoline, waqt li kien hemm tnaqqis ta' C_{max} u żieda f' T_{max} ta' fentanyl b'fattur ta' tnejn meta ngħata oxymetazoline. Il-firxa globali tal-espożizzjoni ta' fentanyl f'individwi b'rinite allergika mingħajr trattament ta' qabel b'mediċina li ddejjjaq il-važi tal-immieher hi komparabbli għal dik f'individwi b'saħħithom. L-użu konkormittanti ta' mediċina li ddejjjaq il-važi tal-immieher għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5).

Bijoekwivalenza

Studju farmakokinetiku wera li l-isprej ta' Instanyl ta' doża waħda u ta' multidoži huma bijoekwivalenti.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn doži ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u riskju ta' kanċer ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bniedem.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp embrijoniku bikri fil-firien, effett fuq l-irġiel ġie osservat f'doži għoljin (300 µg/kg/jum, s.c.) u hu konsistenti mal-effetti sedattivi ta' fentanyl fi studji fuq l-annimali. Barra minn hekk studji f'firien nisa wrew fertilità mnaqqsa u żieda fil-mortalità embrijonali. Studji aktar riċenti wrew li effetti fuq l-embrijo kienu dovuti għal tossiċità maternali u mhux għal effetti diretti tas-sustanzi fuq l-embriju li qed jiżviluppa. Fi studju dwar l-iżvilupp ta' qabel u wara t-twelid ir-rata ta' sopravivenza tal-wild kien mnaqqas b'mod sinifikanti f'doži li naqqsu l-piż maternali bi f'tit. Dan l-effett jista' jkun dovut għal kura mibdula tal-omm jew effett dirett ta' fentanyl fuq il-frieħ. Ma kienux osservati effetti fuq l-iżvilupp somatiku u mgieba tal-wild. Effetti teratoġeniċi ma ntwerewx.

Studji ta' tolleranza lokali b'Instanyl fi qżieqez żgħar urew li l-għoti ta' Instanyl kien tollerat sew.

Studji dwar il-karċinoġeniċità (bijoanalizi alternattiv tal-ġilda ta' 26 ġimgħa fi ġrieden Tg.AC transġeniċi; studju ta' sentejn dwar il-karċinoġeniċità taħt il-ġilda fil-firien) b'fentanyl ma żvelax sejbiet li jindikaw potenzjal onkoġeniku. Evalwazzjoni ta' slides tal-moħħ mill-istudju dwar il-karċinoġeniċità żvelat leżjonijiet fil-moħħ fl-annimali li ngħataw doži għoljin ta' fentanyl citrate. Mhix magħrufa r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet għall-bnedmin.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Disodium phosphate dihydrate
Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

2 snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Ahżen f' temperatura taħt 30 °C.
Tagħmlux fil-friża.
Żomm maħżun wieqaf.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Kontenitur tal-polypropylene (PP) sprej nażali jikkonsisti fi flixxkun tal-ħġieġ (kannella tal-ħġieġ Tip 1) bil-pompa metraġġ. Il-kontenitur tal-isprej nażali għandu display elettroniku, kontro doża, mekkaniżmu lock out u għatu rezistenti għat-tfal.

Jiġi fil-prezentazzjonijiet li ġejjin:

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni. DoseGuard

3.2 ml li fiha 1.60 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 50 mikrogramma
4.3 ml li fiha 2.15 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 30 doża ta' 50 mikrogramma
5.3 ml li fiha 2.65 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 50 mikrogramma

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni. DoseGuard

3.2 ml li fiha 3.20 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 100 mikrogramma
4.3 ml li fiha 4.30 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 30 doża ta' 100 mikrogramma
5.3 ml li fiha 5.30 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 100 mikrogramma

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-immieher, soluzzjoni. DoseGuard

3.2 ml li fiha 6.40 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 20 doża ta' 200 mikrogramma
4.3 ml li fiha 8.60 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 30 doża ta' 100 mikrogramma
5.3 ml li fiha 10.60 mg fentanyl li tiżgura l-forniment ta' 40 doża ta' 200 mikrogramma

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema

Minħabba l-użu ħażin possibbli ta' fentanyl u l-ammont possibbli ta' soluzzjoni li jkun fadal, kwalunkwe sprej nażali użat jew mhux użat irid jiġi rritornat b'mod sistematiku u jintrema kif suppost skont ir-rekwiżiti lokali jew jittiehed lura għand l-ispiżjar.

Il-kontenitur tal-isprej nażali fih il-batteriji. Il-batteriji ma jistgħux jinbidlu.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka
medinfoEMEA@takeda.com

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Instanyl 50 mikrogrammi/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni DoseGuard
EU/1/09/531/023-025

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni DoseGuard
EU/1/09/531/027-029

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni DoseGuard
EU/1/09/531/031-033

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta' Lulju 2009
Data tal-aħħar tiġdid: 01 ta' Lulju 2019

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

ANNEX II

- A. MANIFATTURI RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

A. MANIFATTURI RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott għall

Curida AS
Solbærvegen 5
NO-2409 Elverum
In-Norveġja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta speċjali u ristretta tat-tabib (Ara Anness I: Sommarju tal- Karatteristiċi tal-Prodott, sezzjoni 4.2).

C. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- **Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

- **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi preżentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

- **Miżuri addizzjonali għall-minimizzazzjoni tar-riskji**

Qabel it-tnedija tal-prodott ta' diversi dozi u ta' doża waħda f'kull Stat Membru, id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħod fis-Suq għandu jaqbel mal-Awtorità Nazzjonali Kompetenti dwar l-aħħar materjal edukattiv.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq għandu jiżgura li t-tobba, l-ispiżjara u l-pazjenti kollha li mistennija jippreskrivu/jagħtu/jużaw Instanyl jingħataw materjal edukattiv dwar l-użu korrett u sikur tal-prodott.

Materjal edukattiv għall-pazjenti se jinkludi dan li ġej:

- Fuljett ta' informazzjoni għall-pazjent
- Gwida għall-pazjenti/persuna li tiegħu hsiebhom
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għall-pazjenti/persuna li tiegħu hsiebhom

- Instanyl għandu jintuża biss jekk il-pazjenti/persuni li jiehdu hsiebhom ikunu rċevew l-informazzjoni xierqa dwar l-użu tal-apparat u l-prekawzjonijiet ta' sigurtà.
- Spjegazzjoni tal-indikazzjoni.
- Spjegazzjoni ta' Wgħigh għal Għarrieda, tal-Perċezzjoni li għandhom il-pazjenti dwar l-ugħigh u t-trattament tiegħu.
- Spjegazzjoni tal-użu mhux skont it-tikketta, tal-użu ħażin, tal-abbuż, tal-iżball fil-medikazzjoni, tad-doża eċċessiva, tal-mewt u tad-dipendenza fuq il-medicina.
- Definizzjoni ta' pazjent li jinsab f'riskju ta' doża eċċessiva, abbuż, użu ħażin, dipendenza u vizzju sabiex jiġu mgħarrfa l-persuni li jagħtu r-ricetti/l-ispizjara.
- Biex Instanyl ma jintużax għall-kura ta' kwalunkwe wgħigh iehor jew stat ta' wgħigh fuq perjodu ta' żmien qasir u/jew għall-kura ta' aktar minn 4 episodji ta' wgħigh tal-kanċer li jizdied f'daqqa kuljum (sezzjoni 3 PIL).
- Il-formulazzjonijiet mhumiex interkambjabbli.
- Il-bżonn li jirreferu għal min tahom ir-ricetta/l-ispizjara f'każ ta' xi mistoqsija.

Kif tuża Instanyl

- Istruzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat tal-isprej għall-immieher.
- Istruzzjonijiet dwar kif tinfetaħ u tingħalaq il-kaxxa li hija rezistenti għat-tfal (għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži), l-għatu rezistenti għat-tfal (għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži DoseGuard) jew il-folja (għall-isprej għall-immieher ta' doża waħda).
- Għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži u għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži DoseGuard: informazzjoni dwar l-iskema tal-għadd ta' doži.
- Għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži jew għall-isprej għall-immieher ta' ħafna doži DoseGuard, l-apparat kollu li ma jintużax jew kontenituri vojta għandhom jintraddu lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- Għall-isprej għall-immieher ta' doża waħda, l-apparat kollu li ma jintużax għandu jintradd lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- Parir dwar kif wiehed jista' jsib informazzjoni diġitali u vidjows bl-istruzzjonijiet.

Materjal edukattiv għat-tobba se jkun fih dan li ġej:

- Is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott u Fuljett ta' tagħrif
- Gwida għat-Tobba
- Lista ta' verifika għal min jagħti r-ricetta
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għat-Tobba

- It-trattament għandu jinbeda/jsir taħt is-superviżjoni ta' tabib li għandu esperjenza fl-immaniġġar ta' terapija bl-opiojdi f'pazjenti bil-kanċer, b'mod partikolari fit-tranzizzjoni mill-isptar għad-dar.
- Spjegazzjoni tal-uži mhux skont it-tikketta (jiġifieri: indikazzjoni, età) u tar-riskji serji marbutin mal-użu ħażin, mal-abbuż, mal-iżball fil-medikazzjoni, ma' doża eċċessiva, mewt u mad-dipendenza fuq il-medicina.
- Il-bżonn ta' komunikazzjoni mal-pazjenti/persuni li jiehdu hsiebhom:
 - Immaniġġar tat-trattament u r-riskji ta' abbuż u dipendenza fuq il-medicina.
 - Il-bżonn ta' revizjoni periodika mill-persuni li jagħtu r-ricetta.
 - Inkoraġġiment biex tiġi rrapportata kwalunkwe problema fl-immaniġġar tat-trattament.

- L-identifikazzjoni u l-monitoraġġ ta' pazjenti li jinsabu f'riskju ta' abbuż u użu hażin qabel u waqt it-trattament biex jiġu identifikati l-karatteristiċi ewlenin ta' disturb minħabba l-użu tal-opiojdi (opiooid use disorder, OUD): karatteristiċi distinti ta' effetti sekondarji relatati mal-opiojdi u ta' disturb minħabba l-użu tal-opiojdi.
- L-importanza li jiġu rrapportati l-użu mhux skont it-tikketta, l-użu hażin, l-abbuż, id-dipendenza fuq il-medicina u doża eċċessiva.
- Il-bżonn li tiġi ppersonalizzata t-terapija jekk jiġi identifikat OUD.

Il-persuni li jagħtu riċetta għall-użu tal-isprej għall-imnieher Instanyl għandhom jagħzlu l-pazjenti b'mod kritiku, u jagħtuhom pariri dwar:

- L-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat tal-isprej għall-imnieher
- L-istruzzjonijiet dwar kif tinfetaħ u tingħalaq il-kaxxa li hija rezistenti għat-tfal (għal sprej għall-imnieher ta' hafna doži), l-għatu rezistenti għat-tfal (għall-isprej għall-imnieher ta' hafna doži DoseGuard) jew il-folja (għall-isprej għall-imnieher ta' doża waħda)
- L-informazzjoni dwar l-iskema tal-għadd tad-doži inkluża fit-tikketta u fil-materjal edukattiv għall-isprej għall-imnieher ta' hafna doži.
- Għall-isprej għall-imnieher ta' hafna doži u l-isprej għall-imnieher ta' hafna doži (DoseGuard), l-apparat kollu li ma jintużax jew il-kontenituri vojta għandhom jintraddu lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- Għall-użu tal-isprej għall-imnieher b'doża waħda l-apparati kollha li ma jintużawx għandhom jintraddu lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- Li qatt m'għandhom jaqsmu l-medicini tagħhom jew jużawhom għal skopijiet oħra.
- Informazzjoni tat-tikketti li tkun aġġornata u li tinkludi iperalgeżija, l-użu fit-tqala, interazzjonijiet bejn medicina u oħra bħal dawk ma' benzodiazepines, vizzju jatroġeniku, rtirar u dipendenza.
- Il-persuna li tagħti r-riċetta għandha tuża l-lista ta' verifika għall-persuni li jagħtu r-riċetti.

Lista ta' verifika għal min jagħti r-riċetta

Azzjonijiet meħtieġa qabel ma tingħata r-riċetta għal Instanyl. Jekk jogħġbok ara li tagħmel dawn il-passi kollha li ġejjin qabel ma tagħti riċetta għall-isprej għall-imnieher Instanyl ta' doża waħda jew ta' hafna doži jew sprej għall-imnieher ta' hafna doži DoseGuard:

- Żgura li jiġu sodisfatti l-elementi kollha għall-indikazzjoni approvata.
- Ipprovi l-istruzzjonijiet għall-użu tal-isprej għall-imnieher lill-pazjenti u/jew lill-persuni li jieħdu hsiebhom.
- Għall-isprej għall-imnieher ta' doża waħda biss: Informa lill-pazjent li l-isprej għall-imnieher huwa għall-użu ta' darba (kull sprej għall-imnieher fih biss doża waħda u l-plaġer għandu jingħafas biss meta l-ponta tal-isprej tkun imdaħħla fl-imnieher, m'għandux jiġi ttestjat qabel l-użu).
- Żgura li l-pazjent jaqra' l-fuljett ta' tagħrif li hemm ġol-kaxxa ta' Instanyl.
- Lill-pazjent ipprovdih bil-fuljett ta' Instanyl għall-pazjent li jkopri dawn t'hawn taht:
 - Kanċer u Wġiġh.
 - Instanyl. X'inhu? Kif nużah?
 - Instanyl. Riskji ta' użu hażin.
- Agħti parir lill-pazjent dwar kif għandu jiftaħ il-folja rezistenti għat-tfal (għal Instanyl ta' użu ta' darba), il-kaxxa rezistenti għat-tfal (għal Instanyl ta' hafna doži) jew l-għatu rezistenti għat-tfal (għal Instanyl DoseGuard ta' hafna doži) kif hemm deskritt fil-fuljett għall-pazjent 'Instanyl. X'inhu? Kif nużah?'
- Spjega r-riskji assoċjati ma' użu ta' ammont ta' Instanyl li jaqbeż l-ammont rakkomandat.
- Spjega l-użu tal-kards għall-monitoraġġ tad-doża.
- Informa lill-pazjent bis-sinjali ta' doża eċċessiva ta' fentanyl u l-bżonn ta' assistenza medika immedjata.
- Spjega dwar il-ħażna sigura u l-bżonn biex jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
- Spjega dwar ir-rimi xieraq tal-isprej għall-imnieher Instanyl ta' doża waħda jew ta' hafna doži jew l-isprej għall-imnieher ta' hafna doži DoseGuard.

- Fakkur lill-pazjenti/persuna li tiegħu hsielhom li għandhom isaqsu lit-tabib tagħhom jekk ikollhom xi mistoqsija jew thassib dwar kif għandhom jużaw Instanyl jew dwar ir-riskji assoċjati mal-użu ta' hażin u l-abbuż.

Materjal edukattiv għall-ispizjara se jkun fih dan li ġej:

- Is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott u l-Fuljett ta' Tagħrif
- Gwida għall-Ispizjara
- Lista' ta' verifika għall-għoti
- Informazzjoni dwar aċċess diġitali mtejjeb

Gwida għall-Ispizjara

- It-trattament għandu jinbeda/jsir taht is-superviżjoni ta' tabib li għandu esperjenza fl-immaniġġar ta' terapija bl-opiojdi f'pazjenti bil-kanċer, b'mod partikolari fit-tranzizzjoni mill-isptar għad-dar.
- Spjegazzjoni tal-użi mhux skont it-tikketta (jiġifieri: indikazzjoni, età) u tar-riskji serji marbutin mal-użu ta' hażin, mal-abbuż, mal-iżball fil-medikazzjoni, ma' doża eċċessiva, mewt u mad-dipendenza fuq il-medicina.
- Il-bżonn ta' komunikazzjoni mal-pazjenti/persuni li jiehdu hsielhom:
 - Immaniġġar tat-trattament u r-riskji ta' abbuż u dipendenza fuq il-medicina.
 - Il-bżonn ta' revizjoni perjodika mill-persuni li jagħtu r-ricetta.
 - Inkoraġġiment biex tiġi rrapportata kwalunkwe problema fl-immaniġġar tat-trattament.
- Il-monitoraġġ ta' pazjenti li jinsabu f'riskju ta' abbuż u użu ta' hażin waqt it-trattament biex jiġu identifikati l-karatteristiċi ewlenin ta' disturb minhabba l-użu tal-opiojdi (OUD): karatteristiċi distinti ta' effetti sekondarji relatati mal-opiojdi u ta' disturb minhabba l-użu tal-opiojdi.
- L-importanza li jiġu rrapportati l-użu mhux skont it-tikketta, l-użu ta' hażin, l-abbuż, id-dipendenza fuq il-medicina u doża eċċessiva.
- Jekk jiġi identifikat OUD, għandu jiġi kkuntattjat it-tabib.
- L-ispizjar għandu jkun familjari mal-materjali edukattivi qabel ma jingħata lill-pazjent.
- L-isprej għall-imnieher Instanyl mhuwiex interkambjabbli ma' prodotti oħra ta' fentanyl.

L-ispizjara li jagħtu l-isprej għall-imnieher Instanyl lill-pazjenti jridu jagħtuhom pariri dwar:

- Istruzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat tal-isprej għall-imnieher.
- Istruzzjonijiet dwar kif tinfetaħ u tingħalaq il-kaxxa li hija reżistenti għat-tfal (għal sprej għall-imnieher ta' hafna dozi), l-għatu reżistenti għat-tfal (għall-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi DoseGuard) jew il-folja (għall-isprej għall-imnieher ta' doża waħda).
- Informazzjoni dwar l-iskema tal-għadd tad-dozi inkluża fit-tikketta u fil-materjal edukattiv għall-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi jew għall-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi DoseGuard.
- L-ispizjar għandu jgħarraf lill-pazjenti li sabiex jevitaw is-serq u l-użu mhux korrett tal-isprej għall-imnieher Instanyl, huma għandhom iżommuh f'post sigur sabiex jevitaw l-użu mhux korrett u d-diverżjoni.
- Għall-użu tal-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi jew l-isprej għall-imnieher b'hafna dozi DoseGuard, l-apparat kollu li ma jintużax jew il-kontenituri vojta għandhom jintraddu lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- Għall-użu tal-isprej għall-imnieher b'doża waħda l-apparat kollu li ma jintużax għandhom jintraddu lura b'mod sistematiku skont ir-regolamenti lokali.
- L-ispizjar għandu juża l-lista ta' verifika għall-ispizjara.

Lista' ta' verifika għall-għoti

Azzjonijiet meħtieġa qabel ma tipprovdi Instanyl. Jekk jogħġbok ara li tagħmel dawn il-passi kollha li ġejjin qabel ma tipprovdi l-isprej għall-imnieher Instanyl ta' doża waħda, l-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi jew l-isprej għall-imnieher ta' hafna dozi DoseGuard:

- Żgura li jiġu sodisfatti l-elementi kollha għall-indikazzjoni approvata.
- Ipprovdi l-istruzzjonijiet għall-użu tal-isprej għall-imnieher lill-pazjenti u/jew lil persuni li jiehdu hsielhom.

- Għall-isprej għall-immieher ta' doża waħda biss: Informa lill-pazjent li l-isprej għall-immieher huwa għall-użu ta' darba (kull sprej għall-immieher fih biss doża waħda u l-plaġer għandu jingħafas biss meta l-ponta tal-isprej tkun imdaħħla fl-immieher, m'għandux jiġi ttestjat qabel l-użu).
- Żgura li l-pazjent jaqra' l-fuljett ta' taġħrif ta' Instanyl fil-kaxxa ta' doża waħda, ta' hafna doži jew dik ta' hafna doži DoseGuard.
- Lill-pazjent ipprovdih bil-fuljett ta' Instanyl għall-pazjent li jkopri dawn t'hawn taht:
 - Kanċer u Wġiġh.
 - Instanyl. X'inhu? Kif nużah?
 - Instanyl. Riskji ta' użu hażin.
- Aġti parir lill-pazjent dwar kif għandu jiftaħ il-folja rezistenti għat-tfal (għal Instanyl ta' użu ta' darba), il-kaxxa rezistenti għat-tfal (għal Instanyl ta' hafna doži) jew l-għatu rezistenti għat-tfal (għall-isprej għall-immieher ta' hafna doži Instanyl DoseGuard) kif hemm deskritt fil-fuljett għall-pazjent 'Instanyl. X'inhu? Kif nużah?'
- Spjega r-riskji assoċjati ma' użu ta' ammont ta' Instanyl li jaqbeż l-ammont rakkomandat.
- Spjega l-użu tal-kards għall-monitoraġġ tad-doża.
- Informa lill-pazjent bis-sinjali ta' doża eċċessiva ta' fentanyl u l-bżonn ta' assistenza medika immedjata.
- Spjega dwar il-ħażna sigura u l-bżonn biex jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
- Spjega dwar ir-rimi xieraq tal-isprej għall-immieher Instanyl ta' doża waħda jew ta' hafna doži jew tal-isprej għall-immieher ta' hafna doži DoseGuard.

Aċċess diġitali għall-materjal edukattiv

Se jiġi mtejjeb l-aċċess diġitali għall-aġġornamenti kollha tal-materjal edukattiv. Materjal edukattiv għal min jagħti r-riċetta (tabib), għall-ispizjara u għall-pazjenti se jkun aċċessibbli fuq is-sit web, u se jkun disponibbli biex jitniżżel. Vidjows b'istruzzjonijiet fuq l-użu tal-prodott se jkunu disponibbli fuq is-sit web ukoll. Id-dettalji ta' aċċessibilità diġitali mtejjba se jiġu diskussi mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti u mal-EMA malli jiġi approvat dan l-RMP, kif ikun xieraq.

ANNES III

TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA REŻISTENTI GHAT-TFAL (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 50 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 doži

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.


Użu għall-imnieher

Struzzjonijiet biex tiftaħ u taghlaq il-kaxxa:


- Iġbor il-kaxxa




- Nehhi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ
- Poġġi s-saba' l-kbir u s-saba' l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub



- Aghfas il-lametti billi tuża s-saba' l-kbir u l-fustani.
- Fl-istess hin, poġġi is-saba' l-kbir l-iehor fuq il-pad tal-pessjoni ta'quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll
- Ibqa' aghfas fuq it-tliet postijiet




- Iġbed l-ghatu biex tiftah
- Wara li Instanyl jintuza, l-isprej irid jiddaħħal fit-trej ta' ġewwa għal darb' oħra u l-kaxxa tingħalaq



- Meta l-kaxxa tingħalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidhlu lura fl-islotts
- Aghfas 'l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxxa ta' 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]



Dejjem zomm l-isprej għall-immieħer gol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal wara li jintuza.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Żomm il-flixxkun maħżun rasu 'l fuq.
Tagħmlux fil-friza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

EU/1/09/531/001
EU/1/09/531/002
EU/1/09/531/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGħATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / FLIXKUN (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 50 mikrogramma/sprej tal-immieħer iddożat
fentanyl

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 doži
2.9 ml - 20 doża
5.0 ml - 40 doża

6. OHRAJN

L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA REŻISTENTI GHAT-TFAL (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 100 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 doži

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.


Użu għall-imnieher

Struzzjonijiet biex tiftaħ u taghlaq il-kaxxa:

- Iġbor il-kaxxa




- Nehhi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ
- Poġġi s-saba' l-kbir u s-saba' l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub



- Aghfas il-lametti billi tuża s-saba' l-kbir u l-fustani.
- Fl-istess hin, poġġi is-saba' l-kbir l-iehor fuq il-pad tal-pressjoni ta' quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll
- Ibqa' aghfas fuq it-tliet postijiet




- Iġbed l-ġhatu biex tiftah
- Wara li Instanyl jintuża, l-isprej irid jiddaħhal fit-trej ta' ġewwa għal darb' oħra u l-kaxxa tinghalaq



- Meta l-kaxxa tinghalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidhlu lura fl-islotts
- Aghfas 'l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxxa ta' 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]



Dejjem żomm l-isprej għall-immieher għol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal wara li jintuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Żomm il-flixxun maħżun rasu 'l fuq.
Tagħmlux fil-friza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

EU/1/09/531/004
EU/1/09/531/005
EU/1/09/531/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGħATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / FLIXKUN (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 100 mikrogramma/sprej tal-immieħer iddożat
fentanyl

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 doži
2.9 ml - 20 doża
5.0 ml - 40 doża

6. OHRAJN

L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA REŻISTENTI GHAT-TFAL (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 200 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 1.8 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 2.9 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.0 ml

1.8 ml - 10 doži

2.9 ml - 20 doża

5.0 ml - 40 doża


5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.


Użu għall-imnieher

Struzzjonijiet biex tiftaħ u taghlaq il-kaxxa:

- Iġbor il-kaxxa




- Nehhi l-evidenza tas-siġill l-ewwel darba li l-kaxxa tinfetaħ
- Poġġi s-saba' l-kbir u s-saba' l-fustani fuq il-lametti tal-ġnub



- Aghfas il-lametti billi tuża s-saba' l-kbir u l-fustani.
- Fl-istess hin, poġġi is-saba' l-kbir l-iehor fuq il-pad tal-pressjoni ta' quddiem u mbotta l-ġewwa wkoll
- Ibqa' aghfas fuq it-tliet postijiet




- Iġbed l-ġhatu biex tiftah
- Wara li Instanyl jintuża, l-isprej irid jiddaħhal fit-trej ta' ġewwa għal darb' oħra u l-kaxxa tinghalaq



- Meta l-kaxxa tinghalaq, kun żgur li l-lametti tal-ġnub jidhlu lura fl-islotts
- Aghfas 'l isfel sew sakemm il-lametti jikklikkjaw fil-pożizzjoni

Immarka kaxxa waħda wara kull doża

[Immarka l-kaxxa ta' 10, 20 jew 40 kaxxa biex timmarka fuqha]



Dejjem żomm l-isprej għall-immieher għol-kaxxa li hi reżistenti għal ftuh mit-tfal wara li jintuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Żomm il-flixxun maħżun rasu 'l fuq.
Tagħmlux fil-friza.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

EU/1/09/531/007
EU/1/09/531/008
EU/1/09/531/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGħATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 200

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / FLIXKUN (Hafna doži)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 200 micrograms/sprej tal-immieher iddożat
fentanyl

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.8 ml - 10 doži
2.9 ml - 20 doża
5.0 ml - 40 doża

6. OHRAJN

L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA - KARTUNA (Doża Wahda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma sprej għall-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur b'doża wahda fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża wahda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 50 mikrogramma (μg) fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher,

2 kontenituri tal-isprej b'doża wahda
6 kontenituri tal-isprej b'doża wahda
8 kontenituri tal-isprej b'doża wahda
10 kontenituri tal-isprej b'doża wahda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieher

Il-kontenitur tal-isprej fih doża wahda biss. M'għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-tehid ta' opjojdi oħra.

L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Ahžen f' temperatura taht 30 °C.
Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Refer to the package leaflet for information on disposal

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/09/531/010
EU/1/09/531/011
EU/1/09/531/012
EU/1/09/531/013

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50, doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
FOLJA REŻISTENTI GHALL-FTUH MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża Wahda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma ta' sprej għall-imnieher
fentanyl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

Użu għall-imnieher
Doża 1
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEHER TA' (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 50 µg sprej għall-imnieher
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA – KARTUNA (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma sprej għall-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur ta' doża waħda fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 100 mikrogramma (μg) fentanyl

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni

2 kontenituri b'doża waħda
6 kontenituri b'doża waħda
8 kontenituri b'doża waħda
10 kontenituri b'doża waħda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għall-imnieher
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Il-kontenitur tal-isprej fih doża waħda biss. M'għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.
L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Ahżen f' temperatura taht 30 °C.
Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/09/531/014
EU/1/09/531/015
EU/1/09/531/016
EU/1/09/531/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 100, doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

PAKKETT TAL-FOLJA REŻISTENTI GHALL-FTUH MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża Wahda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma ta' sprej għall-imnieher
fentanyl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

Użu għall-imnieher
Doża 1
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEHER TA' DOŻA WAHDA**

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 100 µg sprej għall-imnieher
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA – KARTUNA (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma sprej għall-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur ta' doża waħda fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 200 mikrogramma (μg) fentanyl

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ilma għall-injezzjonijiet

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni

2 kontenituri b'doża waħda
6 kontenituri b'doża waħda
8 kontenituri b'doża waħda
10 kontenituri b'doża waħda

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Użu għall-imnieher

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Il-kontenitur tal-isprej fih doża waħda biss. M'għandekx tittestja qabel ma tuża.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.

L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Ahżen f' temperatura taht 30 °C.
Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/09/531/018
EU/1/09/531/019
EU/1/09/531/020
EU/1/09/531/021

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 200, doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI
PAKKETT TAL-FOLJA REŻISTENTI GHALL-FTUH MIT-TFAL INTERMEDJARJU (Doża Wahda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma ta' sprej għall-imnieher
fentanyl

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OHRAJN

Użu għall-imnieher
Doża 1
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN
TIKKETTA / SPREJ TAL-IMNIEHER TA' (Doża Waħda)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 200 µg sprej għall-imnieher
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1

6. OHRAJN

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA REŻISTENTI GHAT-TFAL DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 50 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.3 ml

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieher

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.
L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Tagħmlux fil-friza.
Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GħAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GħAT-TQEGħID FIS-SUQ

EU/1/09/531/023
EU/1/09/531/024
EU/1/09/531/025

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGħATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Instanyl 50

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 50 mikrogramma/sprej tal-imnieher iddożat
fentanyl
Użu għall-imnieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 doża (3.2 ml)
20 doża (4.3 ml)
40 doża (5.3 ml)

6. OHRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

TIKKETTA/SPREJ NAŻALI DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 100 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.3 ml

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieher

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.

L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Tagħmlux fil-frیža.
Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/09/531/027
EU/1/09/531/028
EU/1/09/531/029

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Instanyl 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 100 mikrogramma/sprej tal-immieher iddożat
fentanyl
Użu għall-immieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 doża (3.2 ml)
20 doża (4.3 ml)
40 doża (5.3 ml)

6. OHRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TA' BARRA REŻISTENTI GHAT-TFAL DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat għall-imnieher, soluzzjoni fentanyl

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl. Doża waħda ta' 100 mikrolitru hi ugwali għal 200 mikrogramma fentanyl.

3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma ppurifikat

4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

DoseGuard

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 3.2 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 4.3 ml

Sprej għall-imnieher, soluzzjoni 5.3 ml

20 doża (3.2 ml)

20 doża (4.3 ml)

40 doża (5.3 ml)

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-imnieher

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA

Użat biss għall-uġiġh kroniku mill-kanċer waqt it-teħid ta' opjojdi oħra.

L-użu aċċidentali jista' jikkawża korriment serju u jista' jkun fatali.

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN

Aħżen f' temperatura taħt 30 °C.
Tagħmlux fil-frیža.
Żomm maħżun wieqaf.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Irreferi għall-fuljett ta' tagħrif għal informazzjoni dwar ir-rimi

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/09/531/031
EU/1/09/531/032
EU/1/09/531/033

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Instanyl 200

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluz.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - *DATA* LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC
SN
NN

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN

TIKKETTA / FLIXKUN DoseGuard

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA

Instanyl 200 mikrogramma/sprej tal-immieher iddożat
fentanyl
Użu għall-immieher

2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA

3. DATA TA' SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

20 doża (3.2 ml)
20 doża (4.3 ml)
40 doża (5.3 ml)

6. OHRAJN

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.
Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.
L-użu aċċidentali jista' jkun fatali.

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhum Instanyl u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl
3. Kif għandek tuża Instanyl
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahzen Instanyl
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhum Instanyl u għalxiex jintuża

Instanyl fih is-sustanza attiva fentanyl u jappartjeni għal grupp ta' medicini qawwija li jtaffu l-uġiġħ msejja opiojdi. Opiojdi jaġixxu billi jimblukaw is-sinjali ta' uġiġħ li jmorru fil-moħħ. Instanyl jaġixxi b'mod mgħaġġel ħafna u jintuża biex itaffi l-uġiġħ qawwi f'pazjenti bil-kancer li jbatu uġiġħ qawwi f'daqqa u li diġà kienu trattati b'opiojdi għal uġiġħ normali tagħhom. Uġiġħ qawwi f'daqqa huwa uġiġħ addizzjonali li jiġi f'daqqa minkejja li tkun ħadt l'opiojdi tas-soltu biex itaffu l-uġiġħ.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl

Tużax Instanyl:

- jekk inti allergiku għal fentanyl jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżzla fis-sezzjoni 6).
- Jekk m'intix qed tuża b'mod regolari medicina opoid (eż codeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine) preskritta kuljum fuq skeda regolari, għal ta' l-inqas ġimgħa, għall-kontroll tal-uġiġħ persistenti tiegħek. Jekk ma kontx qed tuża dawn il-medicini, m'għandekx tuża Instanyl, minħabba li dan jista' jżid ir-riskju li n-nifs jista' jsir bil-mod u/jew baxx b'mod perikoluż, jew anki jieqaf.
- Jekk qed tieħu medicina li fiha sodium oxybate.
- Jekk issofri minn uġiġħ li jdum għal tul ta' żmien qasir minbarra uġiġħ li jinħass, bħal uġiġħ ikkawżat minn korriment jew kirurġija, uġiġħ ta' ras jew emigranja;
- jekk għandek problemi serji biex tieħu n-nifs jew tbatu minn xi impediment serju ta' mard tal-pulmun;
- jekk qabel tkun irċevejt radjoterapija fuq il-wiċċ;
- jekk tinfareġ b'mod rikorrenti.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Ahżen din il-medicina f' post sikur u sigur fejn persuni ohrajn ma jistgħux jaçcessawha (ara sezzjoni 5. 'Kif taħzen Instanyl' għal aktar informazzjoni).

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tuża Instanyl, speċjalment:

- jekk tbatu minn mard tal-pulmun ostruttiv għal perjodu ta' żmien twil, in-nifs tiegħek jista' jiġi mxekkel b'Instanyl.
- jekk għandek problemi b'qalbek b'mod speċjali rata baxxa ta' taħbit tal-qalb, pressjoni tad-demem baxxa jew volum baxx ta' demem.
- jekk għandek problema bil-fwied jew bil-kliewi tiegħek.
- jekk għandek problemi bil-funzjoni tal-moħħ tiegħek, eż. minhabba xi tumor fil-moħħ, ferita f'rasek jew pressjoni intrakranjali oghla.
- jekk qatt żviluppajt insuffiċjenza adrenali jew nuqqas ta' ormoni tas-sess (defiċjenza ta' androgen) bl-użu tal-opjojdi.
- jekk tiegħu medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- jekk tiegħu antidipressanti jew antipsikotiċi (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- jekk tiegħu medicini msejha agonist/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazoncine (medicini għat-trattament tal-uġiġh) għax jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar. Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl' għal aktar informazzjoni.
- jekk tuża prodotti ta' sprej għall-immieher oħra eż. għal riħ komuni jew allergija.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

Instanyl jista' jikkawża disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad bħal apnea tal-irqad (pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad) u ipossemija relatata mal-irqad (livell baxx ta' ossiġnu fid-demem). Is-sintomi jistgħu jinkludu pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad, qawmien matul il-lejl minhabba qtugħ ta' nifs, diffikultajiet biex wiehed jibqa' rieqed jew hedla eċċessiva matul il-jum. Jekk inti jew persuna oħra tosservaw dawn is-sintomi, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jikkunsidra li jnaqqas id-doża.

Jekk ikollok problemi biex tiegħu n-nifs waqt li tkun qed tiegħu l-kura b'Instanyl, huwa importanti ħafna li tikkuntattja lit-tabib tiegħek jew lill-isptar minnufih.

Ikkonsulta lit-tabib tiegħek waqt li qed tuża Instanyl, jekk:

- ikollok uġiġh jew zieda fis-sensittività għall-uġiġh (iperalġeżija) li ma tirrispondix għal doża oghla tal-medicina tiegħek kif mogħtija b'ricetta mit-tabib tiegħek.
- ikollok taħlita tas-sintomi li ġejjin: dardir, rimettar, anoressija, għeja, dgħufija, sturdament u pressjoni tad-demem baxxa. Flimkien, dawn is-sintomi jistgħu jkunu sinjal ta' kundizzjoni potenzjalment ta' periklu għall-hajja msejha insuffiċjenza adrenali. Din hi kundizzjoni li fiha l-glandoli adrenali ma jipproduċux biżżejjed ormoni.

Jekk tinfaġġ b'mod rikorrenti jew tħoss imniehrek qed idejpek waqt li qed tiegħu l-kura b'Instanyl, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, li għandu mnejn jikkonsidra trattament alternattiv għal uġiġh qawwi li jiġi f' daqqa.

Użu fit-tul u tolleranza

Din il-medicina fiha fentanyl li huwa medicina oppjojde. L-użu ripetut ta' medicini oppjojdi li jtaffu l-uġiġh jista' jirriżulta f'li l-medicina tkun inqas effettiva (tidraha, magħrufa bħala tolleranza tal-medicina). Tista' ssir aktar sensitiv għall-uġiġh waqt li tkun qed tuża Instanyl. Dan huwa magħruf bħala iperalġeżija. Iż-zieda fid-doża ta' Instanyl tista' tgħin sabiex ikompli jitnaqqas l-uġiġh tiegħek għal ftit żmien, iżda tista' tkun ta' ħsara wkoll. Jekk tinnota li l-medicina tiegħek issir inqas effettiva, kellem lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeciedi jekk huwiex aħjar għalik li żżid id-doża jew li tnaqqas gradwalment l-użu tiegħek ta' Instanyl.

Dipendenza

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal ukoll għal dipendenza u abbuż li jistgħu jirriżultaw f' doża eċċessiva ta' periklu għall-ħajja. Ir-riskju ta' dawn l-effetti sekondarji jista' jizzied b' doża ogħla u tul ta' żmien itwal ta' użu. Id-dipendenza tista' gġiegħlek thoss li m'għadekx tikkontrolla kemm għandek bżonn tuża medicina jew kemm għandek bżonn tużaha ta' spiss. Tista' thoss li għandek bżonn tkompli tuża l-medicina tiegħek, anke meta ma tgħinx ittaffi l-uġiġh tiegħek.

Ir-riskju li persuna ssir dipendenti jvarja minn persuna għal oħra. Jista' jkollok riskju akbar li ssir dipendenti fuq Instanyl jekk:

- inti jew xi hadd fil-familja tiegħek qatt abbuża jew kien dipendenti fuq l-alkoħol, medicini bir-riċetta jew medicina illegali (“dipendenza”).
- inti persuna li tpejjep.
- inti qatt kellek problemi bil-burdata tiegħek (dipressjoni, ansjetà jew disturb tal-personalità) jew ġejt ittrattat minn psikjatra għal mard mentali ieħor.

Jekk tinnota xi wiehed mis-sinjali li ġejjin waqt li qed tuża Instanyl, jista' jkun sinjal li inti sirt dipendenti jew vizzjat.

- għandek bżonn tuża l-medicina għal żmien itwal minn dak irrakkomandat mit-tabib tiegħek
- għandek bżonn tuża aktar mid-doża rakkomandata
- qed tuża l-medicina għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk preskritti, pereżempju, “biex tibqa' kalm” jew “tgħinek torqod”
- għamilt tentattivi ripetuti, mingħajr suċċess biex tieqaf jew tikkontrolla l-użu tal-medicina
- meta tieqaf tieħu l-medicina thossok ma tiflahx (eż. dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u ħruġ ta' għaraq), u thossok aħjar ladarba terġa' tuża l-medicina (“effetti tat-twaqqif”)

Jekk tinnota xi wiehed minn dawn is-sinjali, kellem lit-tabib tiegħek biex tiddiskuti l-aħjar mod ta' trattament għalik, inkluż meta jkun xieraq li tieqaf u kif tieqaf b' mod sikur.

Tfal u adolexxenti

Instanyl m'għandux jintuża fi tfal u adolexxenti li għadhom m'għalqux 18-il sena.

Medicini oħra u Instanyl

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicina oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Instanyl jista' jaffettwa jew jiġi affettwat b' medicini oħra.

Attenzjoni speċjali għandha tittieħed jekk inti qed tiġi kkurat b' xi wiehed mill-medicini li ġejjin:

- Medicini oħra għall-uġiġh u xi medicini li jtaffu l-uġiġh għal uġiġh fin-nervituri (bħal gabapentin u pregabalin).
- kull medicina li ġeneralment theddlek (għandha effett seduttiv) bħal pilloli tal-irqad, medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati, medicini użati biex jittrattaw l-ansjetà, antiġistamini, jew kalmanti, rilassaturi tal-muskoli skelettriċi u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin). L-użu ta' medicini oħra bħal dawn fl-istess ħin ma' Instanyl, jista' jikkawża r-riskju ta' nġhas, sedazzjoni qawwija u jaffettwa l-ħila tiegħek biex tieħu n-nifs (depressjoni respiratorja), li jista' jwassal għal koma u jista' jkun ta' periklu għas-saħħa. Minhabba dan, l-użu fl-istess ħin għandu jiġi kkunsidrat biss meta ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament oħrajn. Madankollu, jekk it-tabib tiegħek jöhroglok riċetta għal Instanyl flimkien ma' medicini sedattivi, id-doża u t-tul tat-trattament fl-istess ħin għandhom ikunu limitati mit-tabib tiegħek. Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek dwar il-medicini sedattivi kollha li qed tieħu, u segwi mill-qrib ir-rakkomandazzjoni tat-tabib tiegħek dwar id-doża. Jista' jkun ta' għajjnuna li tinforma lill-ħbieb jew lill-qraba dwar is-sinjali u s-sintomi deskritti hawn fuq. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek meta jkollok dawn is-sintomi.
- kull medicina li jista' jkollha effett fuq il-mod kif ġismek ikisser Instanyl, bħal:
 - ritonavir, nelfinavir, amprenavir, u fosamprenavir (medicini li jgħinu jikkontrollaw l-infezzjoni ta' HIV) ;

- impedituri CYP3A4 bħal ketoconazole, itraconazole, jew fluconazole (użati fit-trattament għal infezzjonijiet tal-moffa) ;
 - troleandomycin, clarithromycin, jew erythromycin (medicini użati għal trattament ta' infezzjonijiet batteriċi) ;
 - aprepitant (użat biex jittratta tqalligh sever) ;
 - diltiazem u verapamil (medicini użati għal pressjoni tad-demem għolja jew mard tal-qalb).
- medicini msejja inibituri ta' monoamine-oxidase (MAO) (użati għal depressjoni severa) jew ħadt dawn fl-aħħar ġimagħtejn.
- Ir-riskju ta' effetti sekondarji jżdid jekk qiegħed tieħu medicini bħal ċerti antidipressanti jew antipsikotiċi. Instanyl jista' jinteraġixxi ma' dawn il-medicini u jista' jkollok bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), u effetti oħra bħal temperatura tal-ġisem oġħla minn 38 °C, żieda fir-rata tat-taħbita tal-qalb, pressjoni tad-demem instabbli, u esagerazzjoni tar-riflessi, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea). It-tabib tiegħek se jgħidlek jekk Instanyl huwiex tajjeb għalik.
- medicini li jissejħu agonisti/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazocine (medicini għat-trattament tal-uġiġħ). Jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar tal-medicina (dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir, roġħda, u għaraq).
- medicini oħra li jittieħdu mill-immieħer, speċjalment oxymetazoline, xylometazoline u medicini simili, li jintużaw għal serħan minn kongestjoni nażali.

Instanyl ma' ikel, xorb u alkoħol

M'għandekx tixrob alkoħol waqt li qed tiġi trattat b'Instanyl, peress li jista' jżid ir-riskju li jkollok effetti perikolużi oħrajn.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma ddiskutejtx dwar dan mat-tabib tiegħek.

Instanyl m'għandux jintuża fit-twelid peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tat-teħid tan-nifs fit-tarbija li għadha titwieled.

Fentanyl jista' jgħaddi fil-ħalib tas-sider u jista' jikkawża effetti mhux mixtieqa fit-tarbija li qed terda. Tużax Instanyl jekk qed tredda'. M'għandekx tibda t-treddiġħ qabel mill-inqas 5 ijiem wara l-aħħar doża ta' Instanyl.

Sewqan u thaddim ta' magni

M'għandekx issuq jew tuża inġenji waqt li tkun qed tiġi trattat b'Instanyl. Instanyl jista' jikkawża sturdamenti, nġhas u disturbi viżwali, li jistgħu jaffettwaw il-ħila tiegħek biex issuq u thaddem magni.

3. Kif għandek tuża Instanyl

Qabel tibda t-trattament u regolarment matul it-trattament, it-tabib tiegħek se jiddiskuti wkoll miegħek x'tista' tistenna mill-użu ta' Instanyl, meta u kemm għandek bżonn toħodha, meta tikkuntattja lit-tabib tiegħek, u meta għandek bżonn twaqqafha (ara wkoll sezzjoni 2).

Dejjem għandek tuża medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża ta' Instanyl li tingħata hija indipendenti mit-trattament għall-uġiġħ mill-kancer li ġeneralment tingħata.

Meta tibda tieħu Instanyl, it-tabib tiegħek ser jaħdem miegħek sabiex isib l-aħjar doża li ttaffilek l-uġiġħ qawwi li jiġik f'daqqa.

Id-doża tal-bidu hija nefha waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minħar jekk ikollok episodju ta' uġigh qawwi li jiġik f'daqqa. Waqt lit kun qed tiġi stabbilita d-doża tiegħek, it-tabib tiegħek jista' jagħtik struzzjonijiet biex tiddel għal doża aktar qawwija.

Jekk l-uġigh qawwi li jiġik f'daqqa ma jittafhiex wara 10 minuti, tista' tuża biss nefha oħra biss għal dan l-episodju.

Ġeneralment għandek tħalli 4 sigħat jgħaddu qabel ma tkun tista' terġa' tieħu darb oħra għal episodju li jmiss għall-uġigh qawwi li jiġi b'daqqa. F'okkazzjonijiet eċċezzjonali meta inti jkollok episodju ġdid ta' uġigh qawwi li jiġi f'daqqa li jiġi b'mod bikri, tista' tuża Instanyl biex tittratta imma għandek tistenna tal-anqas sagħtejn biex tagħmel hekk. Jekk inti regolarment ikollok episodji ta' uġigh qawwi li jiġuk f'daqqa li jkunu inqas minn erba' sigħat bejn episodju u ieħor, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, peress li t-trattament għall-uġigh tal-kanċer li s-soltu tieħu għandu mnejn ikun irid jinbidel.

Inti tista' tuża Instanyl sabiex tittratta sa erba episodji ta' uġigh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Jekk ikollok aktar minn erba' episodji ta' uġigh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum, ikkuntattja t-tabib tiegħek peress li t-trattament għall-uġigh mill-kanċer tiegħek għandu mnejn ikun irid jinbidel changed.

Sabiex jinżamm rendikont tal-għadd ta' dozi ta' Instanyl użati, inti għandek tuża l-kaxxi biex timmarka fuqhom li jinsabu fuq il-kaxxa ta' barra rezistenti għat-tfal.

Taqbadx tiddel id-doża ta' Instanyl jew ta' mediċini tal-uġigh minn jeddek. Il-bidla fid-doża trid issir flimkien mat-tabib tiegħek.

Instanyl huwa għal użu mill-immieħer.

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet għall-użu fit-tmiem ta' dan il-fuljett biex titgħallem kif tuża Instanyl.

Jekk tuża Instanyl aktar milli suppost jew jekk taħseb li xi hadd uża Instanyl b'mod aċċidentali
Għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, l-isptar jew is-sala tal-emergenza sabiex issir analiżi tar-riskju u għal pariri jekk inti hadt aktar Instanyl milli suppost.

Sintomi ta' doża eċċessiva jinkludu:

Ħedla, mġhas, sturdament, temperatura tal-ġisem mnaqqsa, qalb tħabbat bil-mod, diffikultà tikkordina ir-riglejn u d-dirġajn.

F'każijiet serji is-sintomi ta' meta tieħu wisq Instanyl jistgħu jinkludu koma, sedazzjoni, konvulżjonijiet jew diffikultajiet severi biex tieħu n-nifs (nifs bil-mod hafna jew dgħajjef). Doża eċċessiva tista' tirriżulta wkoll f'disturb tal-moħħ magħruf bħala lewkoencefalopatija tossika. Jekk thoss xi wieħed minn dawn is-sintomi għandek tfittex l-assistenza medika.

Nota lil persuni li jieħdu ħsieb oħrajn

Jekk tara lil persuna li qed tieħu Instanyl f'daqqa waħda qed taġixxi bil-mod, għandha diffikultajiet biex tieħu n-nifs, għandhek diffikultà biex tqajjem lil persuna:

- minnufih inti għandek tgħajjat għal għajnuna ta' emergenza.
- waqt li tkun qed tistenna l-għajnuna tal-emergenza, inti għandek tipprova żżomm l-persuna mqajma billi tkellimha jew iċċaqlaqha bil-mod kull tant ħin.
- jekk il-persuna għandha diffikultà biex tieħu n-nifs, inti għandek thegġeġ lil persuna tieħu nifs 'il ġewwa kull 5-10 sekondi.
- jekk il-persuna waqfet tieħu n-nifs, inti għandek tipprova tirisuxxitha/tirisuxxitha sakemm tasal l-għajnuna ta' emergenza.

Jekk taħseb li xi hadd ħa Instanyl, jekk jogħġbok fittex l-assistenza medika. Ipprova żżomm 'il persuna mqajma sakemm l-għajnuna ta' emergenza tasal.

Jekk xi hadd ħa Instanyl b'mod aċċidentali, jista' jkollhom l-istess sintomi bħal dawk deskritti hawn fuq għal doża eċċessiva.

Jekk tinsa tuża Instanyl

Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa ma jittafiex, tista' tiehu Instanyl kif qallek li għandek tiehdu t-tabib tiegħek. Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa waqaf, m'għandekx tiehu Instanyl sal-episodju li jmiss ta' uġiġh qawwi li jaqbdek f'daqqa.

Jekk tieqaf tuża Instanyl

Għandek tieqaf tuża Instanyl meta ma jibqax ikollok uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. Madankollu xorta għandek tibqa' tiehu l-medicina li tiehu ssoltu biex ittaffi l-uġiġh sabiex tittratta l-uġiġh tal-kanċer. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek sabiex tikkonferma d-doża korretta għal medicina li generalment tiehu jekk m'intix żgur.

Tista' tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' tehid tal-prodott simili għall-effetti sekondarji possibbli ta' Instanyl meta twaqqaf Instanyl. Jekk tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' tehid, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jevalwa jekk tkunx tehtieg medicina biex tnaqqas jew telimina s-sintomi ta' nuqqas ta' tehid tal-prodott.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bhal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

L-effetti sekondarji ta' spiss jieqfu jew jonqsu mill-intensità b'użu kontinwu tal-prodott.

Waqaf it-trattament minnufih u kkuntattja lit-tabib tiegħek, sptar jew sala tal-emergenza, jekk:

- ikollok reazzjoni severa f'daqqa b'diffikultà biex tiehu n-nifs, nefha, sturdament, taħbit tal-qalb mgħaġġel, għaraq jew telf ta' konoxxenza.
- ikollok diffikultajiet severi biex tiehu n-nifs.
- ikollok ħoss ta' ċekċik meta tiehu nifs 'il ġewwa,.
- ikollok uġiġh konvulsiv.
- ikollok sturdament estrem.

Dawn l-effetti sekondarji jistgħu jkunu serji hafna.

Effetti oħra rapportati wara l-użu ta' Instanyl:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni):

Ħedla, stordament anke b'diffikultajiet biex iżzomm il-bilanċ, uġiġh ta' ras, irritazzjoni tal-grizmejn, tqalligh, remettar, fwawar, thossok shun hafna, tagħraq hafna.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna):

Ma tistax torqod, ngħas, kontrazzjonijiet konvulżivi tal-muskoli, sensazzjoni abnormali fuq il-ġilda anke spjaċevoli, bidla fit-togħma, deni taċ-ċaqlieq, pressjoni baxxa tad-dem, problemi severi biex tiehu n-nifs, l-immieher jinfaraġ, ulċera fl-immieher, flisjoni, stitikezza, infjammazzjoni tal-ħalq, ħalq xott, uġiġh tal-ġilda, ħakk tal-ġilda, deni.

Mhux magħrufa (frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli):

Reazzjoni allergika, waqa', dijarea, konvulżjonijiet, telf ta' konoxxenza, nefha fid-dirgħajn jew fir-riġlejn, tara jew tisma affarijiet li mhux vera hemm (allucinazzjonijiet), delirju (is-sintmoni jistgħu jinkludu taħlita ta' aġitazzjoni, nuqqas ta' kwiet, disorjentament, konfużjoni, biża', tara' jew tisma' affarijiet li mhumiex vera hemm, disturb fl-irqad, ħmar il-lejl), tolleranza għall-medicina, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga (ara sezzjoni 2), għeja kbira, telqa, sindrome ta' rtirar tal-medicina (tista' tiġi osservata bl-okkorrenza tal-effetti sekondarji li ġejjin, dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir, roġħda, u għaraq), qtugħ ta' nifs.

Kien hemm ukoll rapporti ta' pazjenti li żviluppaw toqba fis-septum tal-immieher – l-istruttura li tissepara l-immifsejn.

It-trattament fit-tul b'fentanyl waqt it-tqala jista' jikkawża sintomi ta' meta wiehed jieqaf jieħu l-medicina fit-tarbija tat-twelid, u dan jista' jkun ta' periklu għall-hajja (ara sezzjoni 2).

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk ikollok episodji fejn l-immieher jinfaraġ b'mod rikorrenti jew ikollok immieħrek idejtek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

5. Kif taħzen Instanyl

Il-medicina li ttaffi l-uġiġh f'Instanyl hi qawwija hafna u tista' tkun ta' periklu għal hajja għat-tfal. Instanyl għandu jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal. Dejjem qiegħed l-isprej tal-immieher f'kaxxa li hi rezistenti għal ftuħ mit-tfal wara l-użu.

Aħżen din il-medicina f'post sikur u sigur fejn il-persuni l-oħra ma jkunux jistgħu jaċċessawha. Tista' tikkawża ħsara serja u tkun fatali għal nies li jistgħu jieħdu din il-medicina bi żball, jew intenzjonalment meta ma tkunx ingħatat riċetta għalihom.

Tużax Instanyl wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxkun wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar jum ta' dak ix-xahar.

Aħżen f'temperatura taħt 30 °C. Żomm il-flixxkun l-isprej nażali maħżun rasu 'l fuq. Tagħmlux fil-friża. Jekk l-isprej għall-immieher ta' Instanyl jiffriża, il-pompa tal-isprej tista' tixxaqqaq. Jekk m'intix żgur kif il-pompa għet maħżuna, għandek tiċċekkja l-pompa tal-isprej qabel ma tużha.

Jekk id-data ta' meta tiskadi tkun għaddiet jew ma jkunx għadu meħtieġ, Instanyl xorta għad ikun fih biżżejjed medicina li jista' jkun ta' ħsara għal persuni oħra, speċjalment tfal. Tarmix medicini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Kull sprej nażali flixxkun użat jew mhux użat għandu jintrema b'mod sistematiku b'mod konformi mal-ħtiġijiet lokali jew jiġi ritornat fl-ispizzerija fil-kaxxa ta' barra li hi rezistenti għal ftuħ mit-tfal. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi medicini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Instanyl

Is-sustanza attiva hi fentanyl. Il-kontenut hu:

50 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 50 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 50 mikrogramma fentanyl.

100 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 100 mikrogramma fentanyl.

200 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 200 mikrogramma fentanyl.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, u ilma ppurifikat

Kif jidher Instanyl u l-kontenut tal-pakkett

Instanyl huwa soluzzjoni ta' sprej għall-immieher. Is-soluzzjoni hi ċara u mingħajr kulur. Huwa jiġi fi flixxkun tal-ħġieġ kannella b'tagħmir li jippompja bil-kejl.

It-tagħmir tal-isprej jiġi f'kaxxa ta' barra li hi reżistenti għal ftuħ mit-tfal u jiġi fi tliet daqsijiet differenti ta' pakkett: 1.8 ml (ugwali għal 10 doża), 2.9 ml (ugwali għal 20 doża) u 5.0 ml (ugwali għal 40 doża).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

It-tikkettar tat-tliet qawwiet ta' Instanyl huma divrenzjati skont il-kulur:

It-tikkettar tal-50 mikrogramma/doża hu oranġjo

It-tikkettar tal-100 mikrogramma/doża hu vjola

It-tikkettar tal-200 mikrogramma/doża hu blu fl-aħdar.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand

Id-Danimarka

Manifattur

Curida AS

Solbærvegen 5

NO-2409 Elverum

In-Norveġja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium NV

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

medinfoEMEA@takeda.com

България

Такеда България ЕООД

Тел.: + 359 2 958 27 36

medinfoEMEA@takeda.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium NV

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel.: +36 1 270 7030

medinfoEMEA@takeda.com

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 10 10

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Takeda HELLAS S.A.

Tel: +30 210 6387800

medinfoEMEA@takeda.com

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0)800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

medinfoEMEA@takeda.com

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 800 800 30

medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα

Takeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A.
Tel: +34 917 90 42 22
medinfoEMEA@takeda.com

France

Takeda France SAS
Tél: +33 1 40 67 33 00
medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 96
medinfoEMEA@takeda.com

Ireland

Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 970
medinfoEMEA@takeda.com

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
medinfoEMEA@takeda.com

Italia

Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601
medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος

Takeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082
medinfoEMEA@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 800-20 80 50
medinfoEMEA@takeda.com

Polska

Takeda Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48223062447
medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457
medinfoEMEA@takeda.com

România

Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba
d.o.o.
Tel: +386 (0) 59 082 480
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600
medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland

Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 051
medinfoEMEA@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 079
medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0) 2830 640 902
medinfoEMEA@takeda.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU TA' INSTANYL SPREJ NAŻALI


Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin bir-reqqa biex titgħallem kif tuża Instanyl sprej nażali:

Kif tipprepara l-isprej għall-imnieher Instanyl għall-użu:


- Qabel tuża l-isprej għall-imnieher l-ewwel darba:
 - Irid jiġi ppumpjat 3 jew 4 darbiet (ipprajmjat) sakemm jidher irxiex fin.
- **Matul dan il-proċess ta' pprajmjar, il-medicina se tintefa' 'il barra. Għalhekk:**
 - **L-ipprajmjar għandu jitwettaq f'żona b'ventilazzjoni tajba.**
 - **Tippuntax l-isprej nażali fid-direzzjoni tiegħek stess u ta' persuni oħrajn.**
 - **Tippuntax fid-direzzjoni ta' wċuħ u oġġetti li jistghu jiġu f'kuntatt ma' persuni oħrajn, partikularment tfal.**
- Jekk ma użajt Instanyl għal aktar minn 7 ijiem il-pompa trid tigi pprajmjata mill-ġdid billi tisprejja darba fl-ajru qabel ma tittiehed d-doża li jmiss.

L-Isprej għall-imnieher Instanyl għandu jintuża b'dan il-mod:

1. Naddaf imniehrek jekk thossu misdud jew jekk għandek riħ.
2. Għandek tpoġġi jew toqgħod f'pożizzjoni wieqfa.
3. Nehhi l-għatu protettiv minn fuq l-isprej.




4. Żomm l-isprej għall-imnieher rasu 'l fuq.
5. Baxxi r-ras daqsxejn 'il quddiem.
6. Aghlaq wiehed mill-imnefsejn billi tpoġġi subgħajk man-naħa tal-imnieher u daħhal ir-ras tal-isprej fil-minfes l-ieħor (madwar 1 ċm). Ma jimpurtax liema minfes tuża. Jekk ikollok tieħu t-tieni doża wara 10 minuti biex tikseb serħan biżżejjed, din id-doża għandha tittiehed fil-minfes l-ieħor.



7. Aghfas il-pompa 'l isfel kompletament u f'salt b'żewġt iswaba, darba waħda, waqt li tieħu n-nifs minn imniehrek. Kun ċert li l-pompa hija magħfusa kompletament 'l isfel. Tista' ma thossx id-doża f'imniehrek, iżda tkun irċivejtha meta tkun għafast il-pompa.
8. Naddaf il-ponta tal-isprej għall-imnieher wara użu b'*tissue* nadifa, u mbaġhad armi t-tissue.

Jekk wara 10 minuti jkollok bżonn it-tieni doża ta' Instanyl biex ittaffi l-uġiġh tiegħek, irrepeti l-passi 1 sa 8 fil-minfes l-ieħor.

Dejjem poġġi Instanyl fil-kaxxa li hi rezistenti għal ftuħ mit-tfal wara li tużah. **Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.**



Żomm kont ta' kemm il-doża ħadt u kemm għad fadallek fl-isprej għall-imnieher billi tuża l-kard għall-għadd tad-doži li hija pprovduta mal-isprej għall-imnieher Instanyl. Kull darba li tuża l-isprej għall-imnieher Instanyl, ara li inti jew min jieħu ħsiebek, tiktbu l-informazzjoni fuq il-kard.

Jekk l-isprej għall-imnieher Instanyl ikun imblukkat jew ma jisprejjax kif suppost:

- Jekk ikun imblukkat, immira l-isprej għall-imnieher 'il bogħod minnek (u minn kwalunkwe nies oħra) u aghfas il-pompa b'mod sod 'l isfel. Dan għandu jneħhi kwalunkwe imblukkar.
- Jekk l-isprej għall-imnieher ikun għadu mhux qed jaħdem kif suppost, kellem lill-ispizjar tiegħek. **Qatt m'għandek tipprova ssewwi l-isprej għall-imnieher inti stess jew iżżarmah.** Dan għax jista' jkun li mbagħad jagħtik doża ħażina.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Instanyl 50 mikrogramma sprej tal-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur b'doża waħda
Instanyl 100 mikrogramma sprej tal-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur b'doża waħda
Instanyl 200 mikrogramma sprej tal-imnieher, soluzzjoni f'kontenitur b'doża waħda
fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Instanyl u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl
3. Kif għandek tuża Instanyl
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahžen Instanyl
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Instanyl u għalxiex jintuża

Instanyl fih is-sustanza attiva fentanyl u jappartjeni għal grupp ta' medicini qawwija li jtaffu l-uġiġħ msejha opiojdi. Opiojdi jaġixxu billi jimblukkaw is-sinjali ta' uġiġħ li jmorru fil-moħħ. Instanyl jaġixxi b'mod mġhaġġel ħafna u jintuża biex itaffi l-uġiġħ qawwi f'pazjenti bil-kancer li jbatu uġiġħ qawwi f'daqqa u li diġà kienu trattati b'opiojdi għal uġiġħ normali tagħhom. Uġiġħ qawwi f'daqqa huwa uġiġħ addizzjonali li jiġi f'daqqa minkejja li tkun ħadt l'opiojdi tas-soltu biex itaffu l-uġiġħ.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl

Tużax Instanyl:

- jekk inti allergiku għal fentanyl jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imniżżla fis-sezzjoni 6).
- jekk m'intix qed tuża b'mod regolari medicina opoid (eż codeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine) preskritta kuljum fuq skeda regolari, għal ta' l-inqas ġimgħa, għall-kontroll tal-uġiġħ persistenti tiegħek. Jekk ma kontx qed tuża dawn il-medicini, m'għandekx tuża Instanyl, minħabba li dan jista' jżid ir-riskju li n-nifs jista' jsir bil-mod u/jew baxx b'mod perikoluż, jew anki jieqaf.
- jekk qed tieħu medicina li fiha sodium oxybate.
- jekk issofri minn uġiġħ li jdum għal tul ta' żmien qasir minbarra uġiġħ li jinħass, bħal uġiġħ ikkawżat minn korriment jew kirurġija, uġiġħ ta' ras jew emigranja.
- jekk għandek problemi serji biex tieħu n-nifs jew tbatu minn xi impediment serju ta' mard tal-pulmun.
- jekk qabel tkun irċevejt radjoterapija fuq il-wiċċ.
- jekk tinfareġ b'mod rikorrenti.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Ahżen din il-medicina f' post sikur u sigur fejn persuni oħrajn ma jistgħux jačcessawha (ara sezzjoni 5. 'Kif taħzen Instanyl' għal aktar informazzjoni).

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tuża Instanyl, speċjalment:

- jekk tbatu minn mard tal-pulmun ostruttiv għal perjodu ta' żmien twil, in-nifs tiegħek jista' jiġi mxekkel b'Instanyl.
- jekk għandek problemi b'qalbek b'mod speċjali rata baxxa ta' taħbit tal-qalb, pressjoni tad-demem baxxa jew volum baxx ta' demem.
- jekk għandek problema bil-fwied jew bil-kliewi tiegħek.
- jekk għandek problemi bil-funzjoni tal-moħħ tiegħek, eż. minħabba xi tumor fil-moħħ, ferita f'rasek jew pressjoni intrakranjali oghla.
- jekk qatt żviluppajt insuffiċjenza adrenali jew nuqqas ta' ormoni tas-sess (defiċjenza ta' androgen) bl-użu tal-opjojdi.
- jekk tiegħu medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- Jekk tiegħu antidipressanti jew antipsikotiċi (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- jekk tiegħu medicini msejha agonist/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazoncine (medicini għat-trattament tal-uġiġh) għax jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar. Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl' għal aktar informazzjoni.
- jekk tuża prodotti ta' sprej għall-immieher oħra eż. għal riħ komuni jew allergija.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

Instanyl jista' jikkawża disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad bħal apnea tal-irqad (pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad) u ipossemija relatata mal-irqad (livell baxx ta' ossiġnu fid-demem). Is-sintomi jistgħu jinkludu pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad, qawmien matul il-lejl minħabba qtugħ ta' nifs, diffikultajiet biex wiehed jibqa' rieqed jew hedla eċċessiva matul il-jum. Jekk inti jew persuna oħra tosservaw dawn is-sintomi, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jikkunsidra li jnaqqas id-doża.

Jekk ikollok problemi biex tiegħu n-nifs waqt li tkun qed tiegħu l-kura b'Instanyl, huwa importanti ħafna li tikkuntattja lit-tabib tiegħek jew lill-isptar minnufih.

Ikkonsulta lit-tabib tiegħek waqt li qed tuża Instanyl, jekk:

- ikollok uġiġh jew zieda fis-sensittività għall-uġiġh (iperalġeżija) li ma tirrispondix għal doża oghla tal-medicina tiegħek kif mogħtija b'ricetta mit-tabib tiegħek.
- ikollok taħlita tas-sintomi li ġejjin: dardir, rimettar, anoressija, għeja, dgħufija, sturdament u pressjoni tad-demem baxxa. Flimkien, dawn is-sintomi jistgħu jkunu sinjal ta' kundizzjoni potenzjalment ta' periklu għall-ħajja msejha insuffiċjenza adrenali. Din hi kundizzjoni li fiha l-glandoli adrenali ma jipproduċux biżżejjed ormoni.

Jekk tinfaġġ b'mod rikorrenti jew tħoss imniehrek qed idejjeq waqt li qed tiegħu l-kura b'Instanyl, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, li għandu mnejn jikkonsidra trattament alternattiv għal uġiġh qawwi li jiġi f' daqqa.

Użu fit-tul u tolleranza

Din il-medicina fiha fentanyl li huwa medicina oppjojde. L-użu ripetut ta' medicini oppjojdi li jtaffu l-uġiġh jista' jirriżulta f'li l-medicina tkun inqas effettiva (tidraha, magħrufa bħala tolleranza tal-medicina). Tista' ssir aktar sensitiv għall-uġiġh waqt li tkun qed tuża Instanyl. Dan huwa magħruf bħala iperalġeżija. Iż-zieda fid-doża ta' Instanyl tista' tgħin sabiex ikompli jitnaqqas l-uġiġh tiegħek għal ftit żmien, iżda tista' tkun ta' ħsara wkoll. Jekk tinnota li l-medicina tiegħek issir inqas effettiva, kellem lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk huwiex aħjar għalik li żżid id-doża jew li tnaqqas gradwalment l-użu tiegħek ta' Instanyl.

Dipendenza

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal ukoll għal dipendenza u abbuż li jistgħu jirriżultaw f' doża eċċessiva ta' periklu għall-ħajja. Ir-riskju ta' dawn l-effetti sekondarji jista' jżied b' doża oghla u tul ta' żmien itwal ta' użu. Id-dipendenza tista' għiegħlek thoss li m'għadekx tikkontrolla kemm għandek bżonn tuża mediċina jew kemm għandek bżonn tużaha ta' spiss. Tista' thoss li għandek bżonn tkompli tuża l-mediċina tiegħek, anke meta ma tgħinx ittaffi l-uġiġh tiegħek.

Ir-riskju li persuna ssir dipendenti jvarja minn persuna għal oħra. Jista' jkollok riskju akbar li ssir dipendenti fuq Instanyl jekk:

- inti jew xi hadd fil-familja tiegħek qatt abbuża jew kien dipendenti fuq l-alkoħol, mediċini bir-riċetta jew mediċina illegali (“dipendenza”).
- inti persuna li tpejjep.
- inti qatt kellek problemi bil-burdata tiegħek (dipressjoni, ansjetà jew disturb tal-personalità) jew ġejt ittrattat minn psikjatra għal mard mentali ieħor.

Jekk tinnota xi wiehed mis-sinjali li ġejjin waqt li qed tuża Instanyl, jista' jkun sinjal li inti sirt dipendenti jew vizzjat.

- għandek bżonn tuża l-mediċina għal żmien itwal minn dak irrakkomandat mit-tabib tiegħek
- għandek bżonn tuża aktar mid-doża rakkomandata
- qed tuża l-mediċina għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk preskritti, pereżempju, “biex tibqa' kalm” jew “tgħinek torqod”
- għamilt tentattivi ripetuti, mingħajr suċċess biex tieqaf jew tikkontrolla l-użu tal-mediċina
- meta tieqaf tieħu l-mediċina thossok ma tiflahx (eż. dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u ħruġ ta' għaraq), u thossok aħjar ladarba terġa' tuża l-mediċina (“effetti tat-twaqqif”)

Jekk tinnota xi wiehed minn dawn is-sinjali, kellem lit-tabib tiegħek biex tiddiskuti l-aħjar mod ta' trattament għalik, inkluż meta jkun xieraq li tieqaf u kif tieqaf b' mod sikur.

Tfal u adolexxenti

Instanyl m'għandux jintuża fi tfal u adolexxenti li għadhom m'għalqux 18-il sena.

Mediċini oħra u Instanyl

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi mediċina oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Instanyl jista' jaffettwa jew jiġi affettwat b' mediċini oħra.

Attenzjoni speċjali għandha tittieħed jekk inti qed tiġi kkurat b' xi wiehed mill-mediċini li ġejjin:

- Mediċini oħra għall-uġiġh u xi mediċini li jtaffu l-uġiġh għal uġiġh fin-nervituri (bħal gabapentin u pregabalin).
- kull mediċina li ġeneralment tħeddlek (għandha effett seduttiv) bħal pilloli tal-irqad, mediċini sedattivi bħal benzodiazepines jew mediċini relatati, mediċini użati biex jittrattaw l-ansjetà, antiġistamini, jew kalmanti, rilassaturi tal-muskoli skelettriċi u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin). L-użu ta' mediċini oħra bħal dawn fl-istess ħin ma' Instanyl, jista' jikkawża r-riskju ta' nġhas, sedazzjoni qawwija u jaffettwa l-ħila tiegħek biex tieħu n-nifs (depressjoni respiratorja), li jista' jwassal għal koma u jista' jkun ta' periklu għas-saħħa. Minħabba dan, l-użu fl-istess ħin għandu jiġi kkunsidrat biss meta ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament oħrajn. Madankollu, jekk it-tabib tiegħek johroġlok riċetta għal Instanyl flimkien ma' mediċini sedattivi, id-doża u t-tul tat-trattament fl-istess ħin għandhom ikunu limitati mit-tabib tiegħek. Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek dwar il-mediċini sedattivi kollha li qed tieħu, u segwi mill-qrib ir-rakkomandazzjoni tat-tabib tiegħek dwar id-doża. Jista' jkun ta' għajna li tinforma lill-ħbieb jew lill-qraba dwar is-sinjali u s-sintomi deskritti hawn fuq. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek meta jkollok dawn is-sintomi.
- kull mediċina li jista' jkollha effett fuq il-mod kif ġismek ikisser Instanyl, bħal :
 - ritonavir, nelfinavir, amprenavir, u fosamprenavir (mediċini li jgħinu jikkontrollaw l-infezzjoni ta' HIV);
 - impedituri CYP3A4 bħal ketoconazole, itraconazole, jew fluconazole (użati fit-trattament għal infezzjonijiet tal-moffa);

- troleandomycin, clarithromycin, jew erythromycin (medicini użati għal trattament ta' infezzjonijiet batteriċi);
 - aprepitant (użat biex jittratta tqalligh sever);
 - diltiazem u verapamil (medicini użati għal pressjoni tad-demem għolja jew mard tal-qalb).
- medicini msejja inibituri ta' monoamine-oxidase (MAO) (użati għal depressjoni severa) jew hađt dawn fl-aħħar ġimagħtejn.
- ir-riskju ta' effetti sekondarji jżdid jekk qiegħed tieħu medicini bħal ċerti antidipressanti jew antipsikotiċi. Instanyl jista' jinteraġixxi ma' dawn il-medicini u jista' jkollok bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), u effetti oħra bħal temperatura tal-ġisem oġħla minn 38 °C, żieda fir-rata tat-taħbita tal-qalb, pressjoni tad-demem instabbli, u esaġerazzjoni tar-riflessi, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea). It-tabib tiegħek se jgħidlek jekk Instanyl huwiex tajjeb għalik.
- medicini li jissejħu agonisti/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazocine (medicini għat-trattament tal-uġiġħ). Jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar tal-medicina (dardir, rimettar, dijarea, ansjeta, tertir, roġħda, u għaraq).
- medicini oħra li jittieħdu mill-immieħer, speċjalment oxymetazoline, xylometazoline u medicini simili, li jintużaw għal serħan minn kongestjoni nażali.

Instanyl ma' ikel, xorb u alkoħol

M'għandekx tixrob alkoħol waqt li qed tiġi trattat b'Instanyl, peress li jista' jżid ir-riskju li jkollok effetti perikolużi oħrajn.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma ddiskutejtx dwar dan mat-tabib tiegħek.

Instanyl m'għandux jintuża fit-twelid peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tat-teħid tan-nifs fit-tarbija li għadha titwieled.

Fentanyl jista' jgħaddi fil-ħalib tas-sider u jista' jikkawża effetti mhux mixtieqa fit-tarbija li qed terda. Tużax Instanyl jekk qed tredda'. M'għandekx tibda t-treddiġħ qabel mill-inqas 5 ijiem wara l-aħħar doża ta' Instanyl.

Sewqan u thaddim ta' magni

M'għandekx issuq jew tuża inġenji waqt li tkun qed tiġi trattat b'Instanyl. Instanyl jista' jikkawża sturdamenti, nġhas u disturbi viżwali, li jistgħu jaffettwaw il-ħila tiegħek biex issuq u thaddem magni.

3. Kif għandek tuża Instanyl

Qabel tibda t-trattament u regolarment matul it-trattament, it-tabib tiegħek se jiddiskuti wkoll miegħek x'tista' tistenna mill-użu ta' Instanyl, meta u kemm għandek bżonn toħodha, meta tikkuntattja lit-tabib tiegħek, u meta għandek bżonn twaqqafha (ara wkoll sezzjoni 2).

Dejjem għandek tuża medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża ta' Instanyl li tingħata hija indipendenti mit-trattament għall-uġiġħ mill-kanċer li ġeneralment tingħata.

Meta tibda tieħu Instanyl, it-tabib tiegħek ser jaħdem miegħek sabiex isib l-aħjar doża li ttaffilek l-uġiġħ qawwi li jiġik f'daqqa.

Id-doża tal-bidu hija nefha waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minħar jekk ikollok episodju ta' uġiġh qawwi li jiġik f'daqqa. Waqt lit kun qed tiġi stabbilita d-doża tiegħek, it-tabib tiegħek jista' jagħtik struzzjonijiet biex tiddel għal doża aktar qawwija.

Jekk l-uġiġh qawwi li jiġik f'daqqa ma jittafhiex wara 10 minuti, tista' tuża biss nefha oħra biss għal dan l-episodju.

Ġeneralment għandek tħalli 4 sigħat jgħaddu qabel ma tkun tista' terġa' tieħu darb oħra għal episodju li jmiss għall-uġiġh qawwi li jiġi b'daqqa. F'okkazzjonijiet eċċezzjonali meta inti jkollok episodju ġdid ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa li jiġi b'mod bikri, tista' tuża Instanyl biex tittratta imma għandek tistenna tal-anqas sagħtejn biex tagħmel hekk.

Jekk inti regolarment ikollok episodji ta' uġiġh qawwi li jiġuk f'daqqa li jkunu inqas minn erba' sigħat bejn episodju u iehor, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, peress li t-treatment għall-uġiġh tal-kanċer li s-soltu tieħu għandu mnejn ikun irid jinbidel.

Inti tista' tuża Instanyl sabiex tittratta sa erba episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Jekk ikollok aktar minn erba' episodji ta' uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa kuljum, ikkuntattja t-tabib tiegħek peress li t-treatment għall-uġiġh mill-kanċer tiegħek għandu mnejn ikun irid jinbidel changed.

Taqbadx tiddel id-doża ta' Instanyl jew ta' mediċini tal-uġiġh minn jeddek. Il-bidla fid-doża trid issir flimkien mat-tabib tiegħek.

Instanyl huwa għal użu mill-imnieher.

Jekk jogħġbok agra l-istruzzjonijiet għall-użu fit-tmiem ta' dan il-fuljett biex titgħallem kif tuża Instanyl.

Jekk tuża Instanyl aktar milli suppost jew jekk taħseb li xi hadd uża Instanyl b'mod aċċidentali Għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, l-isptar jew is-sala tal-emergenza sabiex issir analiżi tar-riskju u għal pariri jekk inti ħadt aktar Instanyl milli suppost.

Sintomi ta' doża eċċessiva jinkludu:

Hedla, mghas, sturdament, temperatura tal-ġisem mnaqqsqa, qalb tħabbat bil-mod, diffikultà tikkordina ir-riglejn u d-dirgħajn.

F'każijiet serji is-sintomi ta' meta tieħu wisq Instanyl jistgħu jinkludu koma, sedazzjoni, konvulżjonijiet jew diffikultajiet severi biex tieħu n-nifs (nifs bil-mod hafna jew dgħajjef). Doża eċċessiva tista' tirriżulta wkoll f'disturb tal-moħħ magħruf bħala lewkoencefalopatija tossika. Jekk thoss xi wieħed minn dawn is-sintomi għandek tfittex l-assistenza medika.

Nota lil persuni li jieħdu ħsieb oħrajn

Jekk tara lil persuna li qed tieħu Instanyl f'daqqa waħda qed taġixxi bil-mod, għandha diffikultajiet biex tieħu n-nifs, għandhek diffikultà biex tqajjem lil persuna:

- minnufih inti għandek tgħajjat għal għajnuna ta' emergenza.
- waqt li tkun qed tistenna l-għajnuna tal-emergenza, inti għandek tipprova żżomm l-persuna mqajma billi tkellimha jew iċċaqlaqha bil-mod kull tant ħin.
- jekk il-persuna għandha diffikultà biex tieħu n-nifs, inti għandek tteġġeg lil persuna tieħu nifs 'il gēwwa kull 5-10 sekondi.
- jekk il-persuna waqfet tieħu n-nifs, inti għandek tipprova ttrissuxxitha/ttrissuxxitha sakemm tasal l-għajnuna ta' emergenza.

Jekk taħseb li xi hadd ħa Instanyl, jekk jogħġbok fittex l-assistenza medika. Iprova żomm 'il persuna mqajma sakemm l-għajnuna ta' emergenza tasal.

Jekk xi hadd ħa Instanyl b'mod aċċidentali, jista' jkollhom l-istess sintomi bħal dawk deskritti hawn fuq għal doża eċċessiva.

Jekk tinsa tuża Instanyl

Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa ma jittafiex, tista' tieħu Instanyl kif qallek li għandek tieħdu t-tabib tiegħek. Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa waqaf, m'għandekx tieħu Instanyl sal-episodju li jmiss ta' uġiġh qawwi li jaqbdex f'daqqa.

Jekk tieqaf tuża Instanyl

Għandek tieqaf tuża Instanyl meta ma jibqax ikollok uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. Madankollu xorta għandek tibqa' tieħu l-medicina li tieħu ssoltu biex ittaffi l-uġiġh sabiex tittratta l-uġiġh tal-kanċer. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek sabiex tikkonferma d-doża korretta għal medicina li ġeneralment tieħu jekk m'intix żgur.

Tista' tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' teħid tal-prodott simili għall-effetti sekondarji possibbli ta' Instanyl meta twaqqaf Instanyl. Jekk tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' teħid, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jevalwa jekk tkunx teħtieġ medicina biex tnaqqas jew telimina s-sintomi ta' nuqqas ta' teħid tal-prodott.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd.

L-effetti sekondarji ta' spiss jieqfu jew jonqsu mill-intensità b'użu kontinwu tal-prodott.

Waqf it-trattament minnufih u kkuntattja lit-tabib tiegħek, sptar jew sala tal-emergenza, jekk:

- ikollok reazzjoni severa f'daqqa b'diffikultà biex tieħu n-nifs, nefha, sturdament, taħbit tal-qalb mgħaġġel, għaraq jew telf ta' konoxxenza.
- ikollok diffikultajiet severi biex tieħu n-nifs.
- ikollok ħoss ta' ċekċik meta tieħu nifs 'il ġewwa.
- ikollok uġiġh konvulsiv.
- ikollok sturdament estrem.

Dawn l-effetti sekondarji jistgħu jkunu serji hafna.

Effetti oħra rapportati wara l-użu ta' Instanyl:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni):

Ħedla, stordament anke b'diffikultajiet biex iżzomm il-bilanċ, uġiġh ta' ras, irritazzjoni tal-grizmejn, tqalligħ, remettar, fwawar, thossok shun hafna, tagħraq hafna.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna):

Ma tistax torqod, ngħas, kontrazzjonijiet konvulżivi tal-muskoli, sensazzjoni abnormali fuq il-ġilda anke spjaċevoli, bidla fit-togħma, deni taċ-ċaqlieq, pressjoni baxxa tad-dem, problemi severi biex tieħu n-nifs, l-immieher jinfaraġ, ulċera fl-immieher, flisjoni, stitikezza, infjammazzjoni tal-ħalq, ħalq xott, uġiġh tal-ġilda, ħakk tal-ġilda, deni.

Mhux magħrufa (frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli):

Reazzjoni allergika, waqa', dijarea, konvulzjonijiet, telf ta' konoxxenza, nefha fid-dirgħajn jew fir-riġlejn, tara jew tisma affarijiet li mhux vera hemm (allucinazzjonijiet), delirju (is-sintmoni jistgħu jinkludu taħlita ta' aġitazzjoni, nuqqas ta' kwiet, disorjament, konfużjoni, biza', tara' jew tisma' affarijiet li mhumiex vera hemm, disturb fl-irqad, ħmar il-lejl), tolleranza għall-medicina, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga (ara sezzjoni 2), għeja kbira, telqa, sindrome ta' rtirar tal-medicina (tista' tiġi osservata bl-okkorrenza tal-effetti sekondarji li ġejjin, dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir, roġħda, u għaraq), qtugħ ta' nifs.

Kien hemm ukoll rapporti ta' pazjenti li żviluppaw toqba fis-septum tal-immieher – l-istruttura li tissepara l-immifsejn.

It-trattament fit-tul b'fentanyl waqt it-tqala jista' jikkawża sintomi ta' meta wiehed jieqaf jieħu l-mediċina fit-tarbija tat-twelid, u dan jista' jkun ta' periklu għall-ħajja (ara sezzjoni 2).

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk ikollok episodji fejn l-immieħer jinfaraġ b'mod rikorrenti jew ikollok immieħrek idejpek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effetti sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħzen Instanyl

Il-mediċina li ttaffi l-uġiħ f'Instanyl hi qawwija ħafna u tista' tkun ta' periklu għal ħajja għat-tfal. Instanyl għandu jinżamm fejn ma jidherx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħzen din il-mediċina f'post sikur u sigur fejn il-persuni l-oħra ma jkunux jistgħu jaċċessawha. Tista' tikkawża ħsara serja u tkun fatali għal nies li jistgħu jieħdu din il-mediċina bi żball, jew intenzjonalment meta ma tkunx ingħatat riċetta għalihom.

Tużax Instanyl wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l-kontenitur ta' doża waħda wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar jum ta' dak ix-xahar.

Aħzen f'temperatura taħt 30 °C. Żomm il-folja fil-kartuna ta' barra. Żomm maħżun wieqaf.

Instanyl jista' jikkawża ħsara lil persuni oħra, speċjalment tfal Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranagġ jew mal-iskart domestiku. Kull kontenitur ta' doża waħda li ma jkunux intużaw għandhom jiġu ritornati b'mod sistematiku u xieraq fil-folja li hija rezistenti għal ftuħ mit-tfal b'mod konformi mal-ħtiġijiet lokali jew jiġi ritornat fl-ispizjerija. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Instanyl

Is-sustanza attiva hi fentanyl. Il-kontenut hu:

50 mikrogramma: doża 1 (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 50 mikrogramma fentanyl.

100 mikrogramma: doża 1 (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 100 mikrogramma fentanyl.

200 mikrogramma: dose 1 (100 mikrolitru) fiha fentanyl citrate ekwivalenti għal 200 mikrogramma fentanyl.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Instanyl u l-kontenut tal-pakkett

Instanyl huwa soluzzjoni f'kontenitur ta' sprej ta' doża waħda, bħala sprej għall-immieħer.

Is-soluzzjoni hija ċara u mingħajr kulur.

Il-kontenitur b'doża waħda fiha doża waħda ta' Instanyl u jiġi go folja li hija rezistenti għall-ftuħ mit-tfal. Instanyl jiġi f'daqsijiet ta' kontenituri ta' doża waħda differenti ta' 2, 6, 8 u 10.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

It-tikkettar tat-tliet qawwiet ta' Instanyl huma divrenzjati skont il-kulur:
It-tikkettar tal-50 mikrogramma hu oranjjo
It-tikkettar tal-100 mikrogramma hu vjola
It-tikkettar tal-200 mikrogramma hu blu fl-ahdar.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni ghat-Tqeghid fis-Suq

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbaek Strand
Id-Danimarka

Manifattur

Curida AS
Solbærvegen 5
NO-2409 Elverum
In-Norveġja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni ghat-Tqeghid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB
Tel: +370 521 09 070
medinfoEMEA@takeda.com

България

Такеда България ЕООД
Тел.: + 359 2 958 27 36
medinfoEMEA@takeda.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium NV
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Tel: + 420 234 722 722
medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország

Takeda Pharma Kft.
Tel.: +36 1 270 7030
medinfoEMEA@takeda.com

Danmark

Takeda Pharma A/S
Tlf: +45 46 77 10 10
medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Takeda HELLAS S.A.
Tel: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Deutschland

Takeda GmbH
Tel: +49 (0)800 825 3325
medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.
Tel: +31 20 203 5492
medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 669
medinfoEMEA@takeda.com

Norge

Takeda AS
Tlf: +47 800 800 30
medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα

Takeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 800-20 80 50
medinfoEMEA@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A.
Tel: +34 917 90 42 22
medinfoEMEA@takeda.com

France

Takeda France SAS
Tél: +33 1 40 67 33 00
medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 96
medinfoEMEA@takeda.com

Ireland

Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 970
medinfoEMEA@takeda.com

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
medinfoEMEA@takeda.com

Italia

Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601
medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος

Takeda Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082
medinfoEMEA@takeda.com

Polska

Takeda Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48223062447
medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457
medinfoEMEA@takeda.com

România

Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba
d.o.o.
Tel: +386 (0) 59 082 480
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600
medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland

Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 051
medinfoEMEA@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 079
medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0) 2830 640 902
medinfoEMEA@takeda.com


Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

ISTRUZZJONIJIET GHALL-ISPREG TAL-IMNIEHER INSTANYL TA' DOŻA WAHDA

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin bir-reqqa biex titgħallem kif tuża għall-isprej tal-imnieher instanyl ta' doża waħda:

- Kull kontenitur għall-imnieher ta' doża waħda huwa ssiġillat f' folja li hija reżistenti għall-ftuħ mit-tfal. M'għandekx tiftaħ il-folja qabel ma tkun lest biex tuża l-isprej. Kull kontenitur għall-imnieher ta' doża waħda għandu doża waħda biss ta' Instanyl. M'għandekx tittestja qabel ma tuża.
- Biex tiftaħ aqta' b'imqass tul il-linja pperforata tal-folja (fuq is-simbolu tal-imqass). Żomm it-tarf tal-fojl, qaxxar il-fojl lura u oħroġ l-isprej għall-imnieher 'il barra.
- Naddaf imniehrek jekk thossu bblokkat jew jekk għandek xi riħ.
- B'attenzjoni żomm il-kontenitur għall-imnieher ta' doża waħda bil-behem, billi tappoġġah mal-plaġer fin-naħa t'isfel, u bis-saba' tal-werrej u l-fustani fuq kull naħa tar-rastal-isprej (ara l-istampa). M'għandekx tagħfas il-plaġer għalissa.



- Imblokka naħa waħda mill-imnifsejn billi tqiegħed is-saba' l-kbir ma' naħa waħda tal-imnieher u dahhal ir-ras tal-isprejjer ġol-minfes (madwar 1 ċm). Ma jimpurtax liema mill-imnifsejn tuża. Jekk ikun meħtieġ li tieħu doża oħra wara 10 minuti sabiex jittaffa b'mod suffiċjenti l-uġiħ, din id-doża trid tittieħed mill-minfes l-iehor.



- Żomm rasek 'il fuq.
- Aghfas waħda sew il-plaġer sabiex toħroġ id-doża bil-behem filwaqt li tieħu nifs 'il ġewwa bil-mod minn imniehrek, u mbagħad neħhi l-isprej nażali minn imniehrek. Għandu mnejn li ma thossx id-doża f'imniehrek, imma inti tkun hadtha meta l-plaġer kien imbuttat 'il fuq.

Il-kontenitur tal-imnieher ta' doża waħda tiegħek issa huwa vojta.

Fuljett ta' taghrif: Informazzjoni għall-utent

Instanyl 50 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 100 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
Instanyl 200 mikrogramma/sprej iddożat tal-imnieher, soluzzjoni
fentanyl

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Instanyl u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl
3. Kif għandek tuża Instanyl
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahžen Instanyl
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Instanyl u għalxiex jintuża

Instanyl fih is-sustanza attiva fentanyl u jappartjeni għal grupp ta' medicini qawwija li jtaffu l-uġiġħ msejha opiojdi. Opiojdi jaġixxu billi jimblukaw is-sinjali ta' uġiġħ li jmorru fil-moħħ. Instanyl jaġixxi b'mod mgħaġġel ħafna u jintuża biex itaffi l-uġiġħ qawwi f'pazjenti bil-kancer li jbatu uġiġħ qawwi f'daqqa u li diġà kienu trattati b'opiojdi għal uġiġħ normali tagħhom. Uġiġħ qawwi f'daqqa huwa uġiġħ addizzjonali li jiġi f'daqqa minkejja li tkun ħadt l'opiojdi tas-soltu biex itaffu l-uġiġħ.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Instanyl

Tużax Instanyl:

- jekk inti allergiku għal fentanyl jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (imnizzlafis-sezzjoni 6).
- jekk m'intix qed tuża b'mod regolari medicina opoid (eż codeine, fentanyl, hydromorphone, morphine, oxycodone, pethidine) preskritta kuljum fuq skeda regolari, għal ta' l-inqas ġimgħa, għall-kontroll tal-uġiġħ persistenti tiegħek. Jekk ma kontx qed tuża dawn il-medicini, m'għandekx tuża Instanyl, minħabba li dan jista' jżid ir-riskju li n-nifs jista' jsir bil-mod u/jew baxx b'mod perikoluż, jew anki jieqaf.
- jekk qed tieħu medicina li fiha sodium oxybate.
- jekk issofri minn uġiġħ li jdum għal tul ta' żmien qasir minbarra uġiġħ li jinħass, bħal uġiġħ ikkawżat minn korriment jew kirurġija, uġiġħ ta' ras jew emigranja.
- jekk għandek problemi serji biex tieħu n-nifs jew tbatu minn xi impediment serju ta' mard tal-pulmun.
- jekk qabel tkun irċevejt radjoterapija fuq il-wiċċ.
- jekk tinfareġ b'mod rikorrenti.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Ahżen din il-medicina f' post sikur u sigur fejn persuni oħrajn ma jistgħux jačcessawha (ara sezzjoni 5. 'Kif taħzen Instanyl' għal aktar informazzjoni).

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tuża Instanyl, speċjalment:

- jekk tbatu minn mard tal-pulmun ostruttiv għal perjodu ta' żmien twil, in-nifs tiegħek jista' jiġi mxekkel b'Instanyl.
- jekk għandek problemi b'qalbek b'mod speċjali rata baxxa ta' taħbit tal-qalb, pressjoni tad-demem baxxa jew volum baxx ta' demem.
- jekk għandek problema bil-fwied jew bil-kliewi tiegħek.
- jekk għandek problemi bil-funzjoni tal-moħħ tiegħek, eż. minħabba xi tumor fil-moħħ, ferita f'rasek jew pressjoni intrakranjali oghla.
- jekk qatt żviluppajt insuffiċjenza adrenali jew nuqqas ta' ormoni tas-sess (defiċjenza ta' androġen) bl-użu tal-opjojdi.
- jekk tiegħu medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- jekk tiegħu antidipressanti jew antipsikotiċi (jekk jogħġbok irreferi wkoll għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl').
- jekk tiegħu medicini msejha agonist/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazoncine (medicini għat-trattament tal-uġiġh) għax jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar. Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni 'Medicini oħra u Instanyl' għal aktar informazzjoni.
- jekk tuża prodotti ta' sprej għall-immieher oħra eż. għal riħ komuni jew allergija.

Disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad

Instanyl jista' jikkawża disturbi fit-tehid tan-nifs relatati mal-irqad bħal apnea tal-irqad (pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad) u ipossemija relatata mal-irqad (livell baxx ta' ossiġnu fid-demem). Is-sintomi jistgħu jinkludu pawzi fit-tehid tan-nifs waqt l-irqad, qawmien matul il-lejl minħabba qtugħ ta' nifs, diffikultajiet biex wiehed jibqa' rieqed jew hedla eċċessiva matul il-jum. Jekk inti jew persuna oħra tosservaw dawn is-sintomi, ikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jista' jikkunsidra li jnaqqas id-doża.

Jekk ikollok problemi biex tiegħu n-nifs waqt li tkun qed tiegħu l-kura b'Instanyl, huwa importanti ħafna li tikkuntattja lit-tabib tiegħek jew lill-isptar minnufih.

Ikkonsulta littabib tiegħek waqt li qed tuża Instanyl, jekk:

- ikollok uġiġh jew zieda fis-sensittività għall-uġiġh (iperalġeżija) li ma tirrispondix għal doża oghla tal-medicina tiegħek kif mogħtija b'riċetta mit-tabib tiegħek.
- ikollok taħlita tas-sintomi li ġejjin: dardir, rimettar, anoressija, għeja, dgħufija, sturdament u pressjoni tad-demem baxxa. Flimkien, dawn is-sintomi jistgħu jkunu sinjal ta' kundizzjoni potenzjalment ta' periklu għall-ħajja msejha insuffiċjenza adrenali. Din hi kundizzjoni li fiha l-glandoli adrenali ma jipproduċux biżżejjed ormoni.

Jekk tinfaġġ b'mod rikorrenti jew tħoss imniehrek qed idejjeq waqt li qed tiegħu l-kura b'Instanyl, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, li għandu mnejn jikkonsidra trattament alternattiv għal uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa.

Użu fit-tul u tolleranza

Din il-medicina fiha fentanyl li huwa medicina oppjojde. L-użu ripetut ta' medicini oppjojdi li jtaffu l-uġiġh jista' jirriżulta f'li l-medicina tkun inqas effettiva (tidraha, magħrufa bħala tolleranza tal-medicina). Tista' ssir aktar sensitiv għall-uġiġh waqt li tkun qed tuża Instanyl. Dan huwa magħruf bħala iperalġeżija. Iż-zieda fid-doża ta' Instanyl tista' tgħin sabiex ikompli jitnaqqas l-uġiġh tiegħek għal ftit żmien, iżda tista' tkun ta' ħsara wkoll. Jekk tinnota li l-medicina tiegħek issir inqas effettiva, kellem lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek se jiddeciedi jekk huwiex aħjar għalik li żżid id-doża jew li tnaqqas gradwalment l-użu tiegħek ta' Instanyl.

Dipendenza

L-użu ripetut ta' Instanyl jista' jwassal ukoll għal dipendenza u abbuż li jistgħu jirriżultaw f' doża eċċessiva ta' periklu għall-ħajja. Ir-riskju ta' dawn l-effetti sekondarji jista' jżied b' doża oghla u tul ta' żmien itwal ta' użu. Id-dipendenza tista' għieghlek thoss li m'għadekx tikkontrolla kemm għandek bżonn tuża medicina jew kemm għandek bżonn tużaha ta' spiss. Tista' thoss li għandek bżonn tkompli tuża l-medicina tiegħek, anke meta ma tgħinx ittaffi l-uġiegh tiegħek.

Ir-riskju li persuna ssir dipendenti jvarja minn persuna għal oħra. Jista' jkollok riskju akbar li ssir dipendenti fuq Instanyl jekk:

- inti jew xi hadd fil-familja tiegħek qatt abbuża jew kien dipendenti fuq l-alkoħol, medicini bir-riċetta jew medicina illegali (“dipendenza”).
- inti persuna li tpejjep.
- inti qatt kellek problemi bil-burdata tiegħek (dipressjoni, ansjetà jew disturb tal-personalità) jew ġejt ittrattat minn psikjatra għal mard mentali ieħor.

Jekk tinnota xi wiehed mis-sinjali li ġejjin waqt li qed tuża Instanyl, jista' jkun sinjal li inti sirt dipendenti jew vizzjat.

- għandek bżonn tuża l-medicina għal żmien itwal minn dak irrakkomandat mit-tabib tiegħek
- għandek bżonn tuża aktar mid-doża rakkomandata
- qed tuża l-medicina għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk preskritti, pereżempju, “biex tibqa' kalm” jew “tgħinek torqod”
- għamilt tentattivi ripetuti, mingħajr suċċess biex tieqaf jew tikkontrolla l-użu tal-medicina
- meta tieqaf tieħu l-medicina thossok ma tiflahx (eż. dardir, rimettar, dijarea, ansjetà, tertir ta' bard, roġħda, u ħruġ ta' għaraq), u thossok aħjar ladarba terġa' tuża l-medicina (“effetti tat-twaqqif”)

Jekk tinnota xi wiehed minn dawn is-sinjali, kellem lit-tabib tiegħek biex tiddiskuti l-aħjar mod ta' trattament għalik, inkluż meta jkun xieraq li tieqaf u kif tieqaf b' mod sikur.

Tfal u adolexxenti

Instanyl m'għandux jintuża fi tfal u adolexxenti li għadhom m'għalqux 18-il sena.

Medicini oħra u Instanyl

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qieghed tieħu, hadt dan l-aħħar jew tista' tieħu xi medicina oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Instanyl jista' jaffettwa jew jiġi affettwat b' medicini oħra.

Attenzjoni speċjali għandha tittiehed jekk inti qed tiġi kkurat b' xi wiehed mill-medicini li ġejjin:

- Medicini oħra għall-uġiegh u xi medicini li jtaffu l-uġiegh għal uġiegh fin-nervituri (bħal gabapentin u pregabalin).
- kull medicina li ġeneralment theddlek (għandha effett seduttiv) bħal pilloli tal-irqad, medicini sedattivi bħal benzodiazepines jew medicini relatati, medicini użati biex jittrattaw l-ansjetà, antiġistamini, jew kalmanti, rilassaturi tal-muskoli skelettriċi u gabapentinoids (gabapentin u pregabalin). L-użu ta' medicini oħra bħal dawn fl-istess hin ma' Instanyl, jista' jikkawża r-riskju ta' nġhas, sedazzjoni qawwija u jaffettwa l-ħila tiegħek biex tieħu n-nifs (depressjoni respiratorja), li jista' jwassal għal koma u jista' jkun ta' periklu għas-saħħa. Minhabba dan, l-użu fl-istess hin għandu jiġi kkunsidrat biss meta ma jkunux possibbli għażliet ta' trattament oħrajn. Madankollu, jekk it-tabib tiegħek johroġlok riċetta għal Instanyl flimkien ma' medicini sedattivi, id-doża u t-tul tat-trattament fl-istess hin għandhom ikunu limitati mit-tabib tiegħek. Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek dwar il-medicini sedattivi kollha li qed tieħu, u segwi mill-qrib ir-rakkomandazzjoni tat-tabib tiegħek dwar id-doża. Jista' jkun ta' għajnuna li tinforma lill-ħbieb jew lill-qraba dwar is-sinjali u s-sintomi deskritti hawn fuq. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek meta jkollok dawn is-sintomi.
- kull medicina li jista' jkollha effett fuq il-mod kif ġismek ikisser Instanyl, bħal :
 - ritonavir, nelfinavir, amprenavir, u fosamprenavir (medicini li jgħinu jikkontrollaw l-infezzjoni ta' HIV);
 - impedituri CYP3A4 bħal ketoconazole, itraconazole, jew fluconazole (użati fit-trattament għal infezzjonijiet tal-moffa);

- troleandomycin, clarithromycin, jew erythromycin (medicini użati għal trattament ta' infezzjonijiet batteriċi);
 - aprepitant (użat biex jittratta tqalligh sever);
 - diltiazem u verapamil (medicini użati għal pressjoni tad-demem għolja jew mard tal-qalb).
- medicini msejja inibituri ta' monoamine-oxidase (MAO) (użati għal depressjoni severa) jew hađt dawn fl-aħħar ġimagħtejn.
- ir-riskju ta' effetti sekondarji jżdid jekk qiegħed tieħu medicini bħal ċerti antidipressanti jew antipsikotiċi. Instanyl jista' jinteraġixxi ma' dawn il-medicini u jista' jkollok bidliet fl-istat mentali (eż. aġitazzjoni, allucinazzjonijiet, koma), u effetti oħra bħal temperatura tal-ġisem oġħla minn 38 °C, żieda fir-rata tat-taħbita tal-qalb, pressjoni tad-demem instabbli, u esagerazzjoni tar-riflessi, riġidità fil-muskoli, nuqqas ta' koordinazzjoni u/jew sintomi gastrointestinali (eż. dardir, rimettar, dijarea). It-tabib tiegħek se jgħidlek jekk Instanyl huwiex tajjeb għalik.
- medicini li jissejħu agonisti/antagonisti parzjali eż. buprenorphine, nalbuphine u pentazocine (medicini għat-trattament tal-uġiġħ). Jista' jkollok sintomi ta' sindrome ta' rtirar tal-medicina (dardir, rimettar, dijarea, ansjeta, tertir, roġħda, u għaraq).
- medicini oħra li jittieħdu mill-immieħer, speċjalment oxymetazoline, xylometazoline u medicini simili, li jintużaw għal serħan minn kongestjoni nażali.

Instanyl ma' ikel, xorb u alkoħol

M'għandekx tixrob alkoħol waqt li qed tiġi trattat b'Instanyl, peress li jista' jżid ir-riskju li jkollok effetti perikolużi oħrajn.

Tqala u treddiġħ

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

Instanyl m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma ddiskutejtx dwar dan mat-tabib tiegħek.

Instanyl m'għandux jintuża fit-twelid peress li fentanyl jista' jikkawża problemi tat-teħid tan-nifs fit-tarbija li għadha titwieled.

Fentanyl jista' jgħaddi fil-ħalib tas-sider u jista' jikkawża effetti mhux mixtieqa fit-tarbija li qed terda. Tużax Instanyl jekk qed tredda'. M'għandekx tibda t-treddiġħ qabel mill-inqas 5 ijiem wara l-aħħar doża ta' Instanyl.

Sewqan u thaddim ta' magni

M'għandekx issuq jew tuża inġenji waqt li tkun qed tiġi trattat b'Instanyl. Instanyl jista' jikkawża sturdamenti, ngħas u disturbi viżwali, li jistgħu jaffettwaw il-hila tiegħek biex issuq u thaddem magni.

3. Kif għandek tuża Instanyl

Qabel tibda t-trattament u regolarment matul it-trattament, it-tabib tiegħek se jiddiskuti wkoll miegħek x'tista' tistenna mill-użu ta' Instanyl, meta u kemm għandek bżonn toħodha, meta tikkuntattja lit-tabib tiegħek, u meta għandek bżonn twaqqafha (ara wkoll sezzjoni 2).

Dejjem għandek tuża medicina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża ta' Instanyl li tingħata hija indipendenti mit-trattament għall-uġiġħ mill-kanċer li ġeneralment tingħata.

Meta tibda tieħu Instanyl, it-tabib tiegħek ser jaħdem miegħek sabiex isib l-aħjar doża li ttaffilek l-uġiġħ qawwi li jiġik f'daqqa.

Id-doża tal-bidu hija nefħa waħda ta' 50 mikrogramma f'kull minħar jekk ikollok episodju ta' uġiġħ qawwi li jiġik f'daqqa. Waqt lit kun qed tiġi stabbilita d-doża tiegħek, it-tabib tiegħek jista' jagħtik struzzjonijiet biex tiddel għal doża aktar qawwija.

Jekk l-uġiġ qawwi li jiġi f'daqqa ma jittafhiex wara 10 minuti, tista' tuża biss nefha oħra biss għal dan l-episodju.

Ġeneralment għandek thalli 4 sigħat jgħaddu qabel ma tkun tista' terġa' tiehu darb oħra għal episodju li jmiss għall-uġiġ qawwi li jiġi b'daqqa. F'okkazzjonijiet eċċezzjonali meta inti jkollok episodju ġdid ta' uġiġ qawwi li jiġi f'daqqa li jiġi b'mod bikri, tista' tuża Instanyl biex tittrattah imma għandek tistenna tal-anqas sagħtejn biex tagħmel hekk. Jekk inti regolarment ikollok episodji ta' uġiġ qawwi li jiġi f'daqqa li jkunu inqas minn erba' sigħat bejn episodju u ieħor, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, peress li t-trattament għall-uġiġ tal-kanċer li s-soltu tiehu għandu mnejn ikun irid jinbidel.

Inti tista' tuża Instanyl sabiex tittratta sa erba episodji ta' uġiġ qawwi li jiġi f'daqqa kuljum.

Jekk ikollok aktar minn erba' episodji ta' uġiġ qawwi li jiġi f'daqqa kuljum, ikkuntattja t-tabib tiegħek peress li t-trattament għall-uġiġ mill-kanċer tiegħek għandu mnejn ikun irid jinbidel changed.

Taqbadx tibdel id-doża ta' Instanyl jew ta' mediċini tal-uġiġ minn jeddek. Il-bidla fid-doża trid issir flimkien mat-tabib tiegħek.

Instanyl jinkorpora counter elettroniku tad-doži, u perjodu bejn id-doži li fih it-tagħmir ikun imsakkar biex jitnaqqas ir-riskju ta' doża eċċessiva, u jgħinek tużah b'mod adegwat. Il-counter tad-doži jippermetti lilek u lit-tabib tiegħek, biex timmonitorjaw u tadattaw l-użu tiegħek. Wara li jittiehdu żewġ doži fi żmien 60 minuta, Instanyl se jissakkar għal perjodu ta' sagħtejn, mill-ewwel doża meħuda, sakemm doża oħra tkun tista' tingħata.

Instanyl huwa għal użu mill-imnieħer.

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet għall-użu fuq in-naħa ta' wara ta' dan il-fuljett biex titgħallem kif tuża l-isprej nażali.

Jekk tuża Instanyl aktar milli suppost jew jekk taħseb li xi hadd uża Instanyl b'mod aċċidentali Għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, l-isptar jew is-sala tal-emergenza sabiex issir analiżi tar-riskju u għal pariri jekk inti hadt aktar Instanyl milli suppost.

Sintomi ta' doża eċċessiva jinkludu:

Ĥedla, mgħas, sturdament, temperatura tal-gisem mnaqqsa, qalb thabbat bil-mod, diffikultà tikkoordina ir-riglejn u d-dirgħajn.

F'każijiet serji is-sintomi ta' meta tiehu wisq Instanyl jistgħu jinkludu koma, sedazzjoni, konvulżjonijiet jew diffikultajiet severi biex tiehu n-nifs (nifs bil-mod hafna jew dgħajjed). Doża eċċessiva tista' tirriżulta wkoll f'disturb tal-moħħ magħruf bħala lewkoencefalopatija tossika. Jekk thoss xi wieħed minn dawn is-sintomi għandek tfittex l-assistenza medika.

Nota lil persuni li jieħdu ħsieb oħrajn

Jekk tara lil persuna li qed tiehu Instanyl f'daqqa waħda qed taġixxi bil-mod, għandha diffikultajiet biex tiehu n-nifs, għandhek diffikultà biex tqajjem lil persuna:

- minnufih inti għandek tgħajjat għal għajnuna ta' emergenza.
- waqt li tkun qed tistenna l-għajnuna tal-emergenza, inti għandek tipprova żżomm l-persuna mqajma billi tkellimha jew iċċaqlaqha bil-mod kull tant ħin.
- jekk il-persuna għandha diffikultà biex tiehu n-nifs, inti għandek thegġeġ lil persuna tiehu nifs 'il gēwwa kull 5-10 sekondi.
- jekk il-persuna waqfet tiehu n-nifs, inti għandek tipprova tirisuxxitha/tirisuxxitha sakemm tasal l-għajnuna ta' emergenza.

Jekk taħseb li xi hadd ħa Instanyl, jekk jogħġbok fittex l-assistenza medika. Ipprova żomm 'il persuna mqajma sakemm l-għajnuna ta' emergenza tasal.

Jekk xi hadd ha Instanyl b'mod aċċidentali, jista' jkollhom l-istess sintomi b'hal dawk deskritti hawn fuq g'hal doża eċċessiva.

Jekk tinsa tuża Instanyl

Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa ma jittafix, tista' tiehu Instanyl kif qallek li g'handek tiehdu t-tabib tiegħek. Jekk l-uġiġh qawwi f'daqqa waqaf, m'g'handekx tiehu Instanyl sal-episodju li jmiss ta' uġiġh qawwi li jaqbdek f'daqqa.

Jekk tieqaf tuża Instanyl

G'handek tieqaf tuża Instanyl meta ma jibqax ikollok uġiġh qawwi li jiġi f'daqqa. Madankollu xorta g'handek tibqa' tiehu l-medicina li tiehu ssoltu biex ittaffi l-uġiġh sabiex tittratta l-uġiġh tal-kancer. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek sabiex tikkonferma d-doża korretta g'hal medicina li g'eneralment tiehu jekk m'intix żgur.

Tista' tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' tehid tal-prodott simili g'hall-effetti sekondarji possibbli ta' Instanyl meta twaqqaf Instanyl. Jekk tesperjenza sintomu ta' nuqqas ta' tehid, g'handek tikkuntattja lit-tabib tiegħek. It-tabib tiegħek jevalwa jekk tkunx tehtieg medicina biex tnaqqas jew telimina s-sintomi ta' nuqqas ta' tehid tal-prodott.

Jekk g'handek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

B'hal kull medicina oħra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, g'hal-kemm ma jidhrux f'kulhadd.

L-effetti sekondarji ta' spiss jieqfu jew jonqsu mill-intensità b'użu kontinwu tal-prodott.

Waqaf it-trattament minnufih u kkuntattja lit-tabib tiegħek, sptar jew sala tal-emergenza, jekk:

- ikollok reazzjoni severa f'daqqa b'diffikultà biex tiehu n-nifs, nefha, sturdament, taħbit tal-qalb mgħaġġel, g'haraq jew telf ta' konoxxenza.
- ikollok diffikultajiet severi biex tiehu n-nifs.
- ikollok hoss ta' ċekċik meta tiehu nifs 'il g'ewwa.
- ikollok uġiġh konvulsiv.
- ikollok sturdament estrem.

Dawn l-effetti sekondarji jistgħu jkunu serji hafna.

Effetti oħra rapportati wara l-użu ta' Instanyl:

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni):

Hedla, stordament anke b'diffikultajiet biex iżzomm il-bilanċ, uġiġh ta' ras, irritazzjoni tal-grizmejn, tqalligħ, remettar, fwawar, thossok shun hafna, tagħraq hafna.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna):

Ma tistax torqod, ngħas, kontrazzjonijiet konvulżivi tal-muskoli, sensazzjoni abnormali fuq il-ġilda anke spjaċevoli, bidla fit-togħma, deni taċ-ċaqlicq, pressjoni baxxa tad-dem, problemi severi biex tiehu n-nifs, l-immieher jinfaraġ, ulċera fl-immieher, flisjoni, stitikezza, infjammazzjoni tal-ħalq, ħalq xott, uġiġh tal-ġilda, ħakk tal-ġilda, deni.

Mhux magħrufa (frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-data disponibbli):

Reazzjoni allergika, waqa', dijarea, konvulżjonijiet, telf ta' konoxxenza, nefha fid-dirghajn jew fir-riġlejn, tara jew tisma affarijiet li mhux vera hemm (allucinazzjonijiet), delirju (is-sintmoni jistgħu jinkludu taħlita ta' aġitazzjoni, nuqqas ta' kwiet, disorjentament, konfużjoni, biza', tara' jew tisma' affarijiet li mhumiex vera hemm, disturb fl-irqad, ħmar il-lejl), tolleranza g'hall-medicina, dipendenza fuq id-drogi (vizzju), abbuż mid-droga (ara sezzjoni 2), g'heja kbira, telqa, sindrome ta' rtirar tal-medicina (tista' tiġi osservata bl-okkorrenza tal-effetti sekondarji li ġejjin, dardir, rimettar, dijarea, ansjeta, tertir, rogħda, u g'haraq), qtugħ ta' nifs.

Kien hemm ukoll rapporti ta' pazjenti li żviluppaw toqba fis-septum tal-immieher – l-istruttura li tissepara l-immifsejn.

It-trattament fit-tul b'fentanyl waqt it-tqala jista' jikkawża sintomi ta' meta wiehed jieqaf jieħu l-mediċina fit-tarbija tat-twelid, u dan jista' jkun ta' periklu għall-ħajja (ara sezzjoni 2).

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk ikollok episodji fejn l-immieher jinfaraġ b' mod rikorrenti jew ikollok immieħrek idejpek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhux elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f' [Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħzen Instanyl

Il-mediċina li ttaffi l-uġiħ f'Instanyl hi qawwija hafna u tista' tkun ta' periklu għal ħajja għat-tfal. Instanyl għandu jinżamm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. Dejjem aghlaq wara l-użu billi tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali.

Aħzen din il-mediċina f' post sikur u sigur fejn il-persuni l-oħra ma jkunux jistgħu jaċċessawha. Tista' tikkawża ħsara serja u tkun fatali għal nies li jistgħu jieħdu din il-mediċina bi żball, jew intenzjonalment meta ma tkunx ingħatat riċetta għalihom.

Tużax Instanyl wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxkun wara JIS. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar jum ta' dak ix-xahar.

Aħzen f' temperatura taħt 30 °C. Żomm l-isprej nażali maħżun wieqaf. Tagħmlux fil-friża. Jekk l-isprej għall-immieher ta' Instanyl jiffriża, il-pompa tal-isprej tista' tixxaqqaq. Jekk m'intix żgur kif il-pompa giet maħżuna, għandek tiċċekkja l-pompa tal-isprej qabel ma tużha.

Jekk id-data ta' meta tiskadi tkun għaddiet jew ma jkunx għadu meħtieġ, Instanyl xorta għad ikun fih biżżejjed mediċina li jista' jkun ta' ħsara għal persuni oħra, speċjalment tfal.



Dan l-istrument hu tikkettat skont id-Direttiva tal-UE dwar Skart Magħmul minn Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE). Tarmix mediċini mal-ilma tad-draġġ jew mal-iskart domestiku kwalunwe sprej nażali użat jew mhux użat għandu jittiehed lura lill-ispizjerija jew jintrema skont rekwiżiti lokali oħra. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Instanyl

Is-sustanza attiva hi fentanyl. Il-kontenut hu:

50 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 500 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 50 mikrogramma fentanyl.

100 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 1,000 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 100 mikrogramma fentanyl.

200 mikrogramma/doża: 1 ml fih fentanyl citrate ekwivalenti għal 2,000 mikrogramma fentanyl. Nefha waħda (100 mikrolitru) fiha 200 mikrogramma fentanyl.

Is-sustanzi l-oħra huma sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, u ilma ppurifikat

Kif jidher Instanyl u l-kontenut tal-pakkett

Instanyl DoseGuard hu sprej nażali, soluzzjoni. Is-soluzzjoni hi ċara u mingħajr kulur.

Jinsab fi sprej nażali b'metering pump, display elettronika, counter tad-doża, mekkaniżmu lock-out integrat u għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal.

L-isprej nażali jiġi fi tliet daqsijiet ta' pakketti differenti: 3.2 ml (ugwali għal 20 doża), 4.3 ml (ugwali għal 30 doża) u 5.3 ml (ugwali għal 40 doża).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

It-tikkettar tat-tliet qawwiet ta' Instanyl huma divrenzjati skont il-kulur:

It-tikkettar tal-50 mikrogramma/doża hu oranġjo

It-tikkettar tal-100 mikrogramma/doża hu vjola

It-tikkettar tal-200 mikrogramma/doża hu blu fl-aħdar.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand

Id-Danimarka

Manifattur

Curida AS

Solbærvegen 5

NO-2409 Elverum

In-Norveġja

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium NV

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

medinfoEMEA@takeda.com

България

Такеда България ЕООД

Тел.: + 359 2 958 27 36

medinfoEMEA@takeda.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium NV

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel.: +36 1 270 7030

medinfoEMEA@takeda.com

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 10 10

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Takeda HELLAS S.A.

Tel: +30 210 6387800

medinfoEMEA@takeda.com

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0)800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS
Tel: +372 6177 669
medinfoEMEA@takeda.com

Ελλάδα

Takeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A.
Tel: +34 917 90 42 22
medinfoEMEA@takeda.com

France

Takeda France SAS
Tél: +33 1 40 67 33 00
medinfoEMEA@takeda.com

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 377 88 96
medinfoEMEA@takeda.com

Ireland

Takeda Products Ireland Ltd
Tel: 1800 937 970
medinfoEMEA@takeda.com

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
medinfoEMEA@takeda.com

Italia

Takeda Italia S.p.A.
Tel: +39 06 502601
medinfoEMEA@takeda.com

Κύπρος

Takeda ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τηλ: +30 210 6387800
medinfoEMEA@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA
Tel: +371 67840082
medinfoEMEA@takeda.com

Norge

Takeda AS
Tlf: +47 800 800 30
medinfoEMEA@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 800-20 80 50
medinfoEMEA@takeda.com

Polska

Takeda Pharma Sp. z o.o.
Tel.: +48223062447
medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.
Tel: + 351 21 120 1457
medinfoEMEA@takeda.com

România

Takeda Pharmaceuticals SRL
Tel: +40 21 335 03 91
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba
d.o.o.
Tel: +386 (0) 59 082 480
medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421 (2) 20 602 600
medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland

Takeda Oy
Puh/Tel: 0800 774 051
medinfoEMEA@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB
Tel: 020 795 079
medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd
Tel: +44 (0) 2830 640 902
medinfoEMEA@takeda.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Medicini <http://www.ema.europa.eu/>.

ISTRUZZJONIJIET GHALL-UŻU TA' INSTANYL


Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin bir-reqqa biex titgħallem kif tuża l-isprej nażali Instanyl.

Informazzjoni importanti qabel l-użu:


- Timmodifikax l-apparat.
- Thallix li jidhol xi likwidu fl-apparat.

L-isprej nażali Instanyl fih:


- Karatteristika integrata lock-out li tikkontrolla kemm ta' spiss l-isprej nażali jista' jintuża
- Għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal, li jrid jitpoġġa fuq l-isprej nażali, meta l-isprej nażali ma jkunx qed jintuża
- Display elettronika li:
 - turi kemm-il darba għandek tippompja (tipprajmja) l-prodott tiegħek qabel tużah
 - turi n-numru ta' doži li jkun fadal
 - turi jekk l-isprej nażali jkunx imsakkar jew lest għall-użu



Kif tneħhi u terġa' twaħħal l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal




Nehhi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal billi tagħfas fuq iż-żewġ naħat tal-għatu u mbagħad dawru lejn ix-xellug u tiġbdu 'l fuq.



Biex terġa' twaħħal l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal, poġġih fuq ir-ras taż-żennuna tal-isprej nażali u dawwar l-għatu lejn il-lemin. L-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal se jikklikkja meta jerġa' jitwaħħal.

Dejjem poġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nażali wara li tużah.

Kif tipprepara l-isprej nažali Instanyl



Qabel ma tuża l-isprej nažali għall-ewwel darba, dan irid jiġi pprajmjat sakemm id-display turi n-numru tad-dożi.


L-istruzzjonijiet għall-ipprajmjar tal-apparat huma elenkati hawn taħt (“Passi għall-ipprajmjar”).

Nota: Biex tippompja, poġġi 2 swaba’ fuq kull naħa tal-baži tar-ras taż-żennuna tal-isprej u poġġi s-saba’ l-kbir taħt l-apparat, imbagħad aghfas.

Twissija: Matul dan il-proċess ta’ pprajmjar, xi ffit mediċina se tintefa’ ’il barra. Għalhekk:

- L-ipprajmjar irid jitwettaq f’żona b’ventilazzjoni tajba.
- Tippuntax l-isprej nažali fid-direzzjoni tiegħek stess jew ta’ persuni oħrajn.
- Tippuntax l-isprej nažali fid-direzzjoni ta’ wċuħ u oġġetti li jistgħu jiġu f’kuntatt ma’ persuni oħrajn, partikularment tfal.
- Tihux il-mediċina li toħroġ waqt l-ipprajmjar man-nifs.

Passi għall-ipprajmjar:



1. Aghfas u erħi l-buttuna l-bajda fuq il-ġenb tal-isprej nažali. Id-display issa se tixgħel u turi "P5".




2. Żomm l-isprej nažali wieqaf u ppompja l-isprej nažali darba fl-arja. Id-display issa turi "P4" u jidher simbolu ta’ katnazz.



3. Meta s-simbolu tal-katnazz jibda jixgħel u jitfi, aghfas u erħi l-buttuna l-bajda tal-ġenb għal darb’oħra; is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi fid-display.




4. Żomm l-isprej nażali wieqaf u ppompja l-isprej nażali mill-ġdid fl-arja. Id-display issa se turi "P3" u s-simbolu tal-katnazz.




5. Meta s-simbolu tal-katnazz jibda jixgħel u jitfi, aghfas u erħi l-buttuna l-bajda tal-ġenb għal darb'ohra; is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi fid-display.




6. Żomm l-isprej nażali wieqaf u ppompja l-isprej nażali mill-ġdid fl-arja. Id-display issa se turi "P2" u jidher is-simbolu ta' katnazz.



7. Meta s-simbolu tal-katnazz jibda jixgħel u jitfi, aghfas u erħi l-buttuna l-bajda tal-ġenb; is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi fid-display.



8. Żomm l-isprej nażali wieqaf u ppompja l-isprej nażali mill-ġdid fl-arja. Id-display issa se turi "P1" u jidher is-simbolu ta' katnazz.



9. Meta s-simbolu tal-katnazz jibda jixgħel u jitfi, aghfas u erhi l-buttuna l-bajda tal-ġenb; is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi fid-display.



10. Żomm l-isprej nażali wieqaf u ppompja l-isprej nażali mill-ġdid fl-arja. Id-display issa se tinbidel u tibda turi n-numru ta' doži fl-isprej nażali (i.e. 20, 30 jew 40 doža) u simbolu tal-katnazz iteptep.

L-isprej nażali issa jkun lest biex jintuża.

Nota: Skont ir-riċetta tiegħek, in-numru tal-bidu jista' jkun 20, 30 jew 40.

L-ipprajmjar mill-ġdid tal-isprej nażali Instanyl (wara 7 ijiem jew aktar)




Jekk ma tkunx użajt Instanyl għal 7 ijiem jew aktar, l-isprej nażali għandu jiġi pprajmjat mill-ġdid billi tippompja darba qabel ma tittiehed id-doża li jmiss. Dan ikun indikat minn "P" fid-display.




Passi għall-ipprajmjar mill-ġdid:

1. Nehhi l-għatu.
2. Aghfas u erhi l-buttuna l-bajda tal-ġenb; is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi fid-display.



3. Id-display se turi 'P' mingħajr is-simbolu tal-katnazz, li jindika li l-apparat jista' jiġi ipprajmjat.



4. Żomm l-isprej nażali wieqaf u ppompja l-isprej nażali darba fl-arja.

Twissija: Matul dan il-proċess ta' pprajmjar, xi ftit medicina se tintefa' 'il barra. Għalhekk:

- L-ipprajmjar għandu jitwettaq f'zona b'ventilazzjoni tajba.
- Tippuntax l-isprej nażali fid-direzzjoni tiegħek stess jew ta' persuni ohra.

- **Tippuntax l-isprej nažali fid-direzzjoni ta' w'cuħ u oġġetti li jistghu jiġu f'kuntatt ma' persuni oħrajn, partikolarment tfal**



5. Ladarba jkun ipprajmjat, id-display se turi n-numru ta' doži li jkun fadal u l-isprej nažali jerga' jkun lest għall-użu.

Kif tuża Instanyl sprej nažali

L-isprej nažali jista' jintuża biss meta s-simbolu tal-katnazz ma jkunx jidher fid-display.



1. Naddaf imniehrek jekk thossu imblukkat jew jekk ikollok riħ.
2. Aħsel idejk.
3. Oqgħod bilqiegħda jew bilwieqfa.
4. Żomm l-isprej nažali wieqaf.
5. Aghfas u erħi l-buttuna l-bajda fuq il-ġenb tal-isprej nažali (is-simbolu tal-katnazz iteptep jisparixxi).
6. Mejjel rasek fit 'il quddiem.
7. Aghlaq minfes wiehed billi tpoġġi sebgħek ma' ġenb wiehed ta' mniehrek u ddaħħal il-ponta tal-isprej fil-minfes l-ieħor.
8. Aghfas il-pompa 'l isfel kompletament b'zewġt iswaba' darba waħda filwaqt li tieħu n-nifs minn imniehrek.
Nota: Se tisma' hoss ta' "klikk" meta l-pompa tkun magħfusa 'l isfel kompletament, u l-isprej nažali jkun ipprovdha d-doža.
9. In-numru fid-display jonqos b'wiehed u s-simbolu tal-katnazz jidher għal fit.
10. Jekk **wara 10 minuti** jkollok bżonn it-tieni doža ta' Instanyl biex ittaffi l-uġiħ tiegħek, irrepeti pass 1 sa 8 **fil-minfes l-ieħor**.
11. Naddaf il-ponta tal-isprej nažali wara kull użu b'tissue nadifa, u mbağħad it-tissue armiha.
12. Erga' waħħal l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal billi tpoġġih fuq ir-ras taż-żennuna tal-isprej nažali u dawwar l-għatu lejn il-lemin.

Ftakar biex tagħfas u terħi l-buttuna l-bajda fuq il-ġenb qabel ma tippompja l-isprej nažali.

Ftakar li għandek dejjem tpoġġi l-għatu li ma jistax jinfetaħ mit-tfal lura f'postu fuq l-isprej nažali u tagħalqu wara l-użu.

Ftakar li għandek iżżomm l-isprej nažali f'pożizzjoni wieqfa f'kull hin.



L-isprej nažali jippermetti sa żewġ doži għal kull episodju ta' uġiħ għal għarrieda.

Wara t-tieni doža, li tista' tittiehed 10 minuti wara l-ewwel doža, l-isprej nažali se jissakkar. Is-simbolu tal-katnazz jidher fid-display flimkien ma' simbolu ta' arloġġ tal-countdown, li juri l-hin li jkun fadal mill-perjodu li fih it-tagħmir ikun imsakkar qabel ma tkun tista' terġa' tuża l-isprej nažali (kull marka sewda tfisser 10 minuti).

Meta l-hin ikun għadda, is-simbolu tal-katnazz jibda jteptep. L-isprej nažali issa jkun lest għall-użu, meta jseħħ l-episodju li jmiss ta' wġiħ għal għarrieda.


Għandek tistenna għal 4 sigħat qabel ma tikkura l-episodju li jmiss ta' wġiġh għal għarrieda.

Tista' tuża Instanyl biex tikkura sa 4 episodji ta' wġiġh għal għarrieda kuljum. Jekk ikollok aktar minn 4 episodji ta' wġiġh għal għarrieda kuljum, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek, għax il-kura kontra l-uġiġh tas-soltu tiegħek tal-kanċer, jista' jkollha tinbidel.

Meta l-isprej nażali jkun vojtt id-display se turi "0" u s-simbolu tal-katnazz se jidher.

Rimi

Tarmix l-isprej nażali Instanyl mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Kwalunkwe sprej nażali użat jew mhux użat għandu jiġi rritornat lill-ispjizerija jew jintrema skont rekwiżiti lokali oħra. Staqsi lill-ispjizar tiegħek għal aktar informazzjoni dwar ir-rimi.



Batterija Baxxa

Jekk id-display turi simbolu ta' batterija, dan ifisser li l-batterija tkun tkun kwazi spiċċat. In-numru ta' doži fuq id-display se jinbidel għal "5". Dan hu bejn wieħed u ieħor in-numru doži, li jkunu jistgħu jiġu pprovduti mill-isprej nażali, qabel ma l-batterija tkun baxxa wisq u d-display tintefa. Jekk is-simbolu tal-batterija jidher fid-display, hu rakkomandat li tikkuntattja lit-tabib jew lill-ispjizar tiegħek biex tixtri sprej nażali ġdid.

Spjegazzjoni tas-Simboli fid-display elettronika



L-isprej nażali jrid jiġi ppumpjat 5 darbiet (ipprajmjat), qabel ma jkun jista' jintuża (ara s-sezzjoni 'Kif tipprepara l-isprej nażali Instanyl'). In-numru fid-display jonqos b'wiehed wara kull ippumpjar (P5, P4, P3, P2 u P1). L-isprej nażali jkun lest meta d-display turi n-numru ta' doži (i.e. 20, 30 jew 40 doża).

Meta tkun qed tipprajmja, jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet dwar it-twissijiet tas-sigurtà msemmija hawn fuq. (Ara s-sezzjoni ta' hawn fuq "Passi għall-Ipprajmjar").



L-isprej nażali ma jkunx intuża għal 7 ijiem jew aktar u għandu jerga' jiġi pprajmat billi jiġi ppumpjat darba fl-arja f'żona b'ventilazzjoni tajba qabel l-użu (ara hawn taħt).

Is-simbolu "P" se jisparixxi mid-display meta l-isprej nażali jiġi pprajmjat mill-ġdid.


Meta tkun qed tipprajmja mill-ġdid, jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet dwar it-twissijiet tas-sigurtà msemmija hawn fuq. (Ara s-sezzjoni ta' hawn fuq "Passi għall-Ipprajmjar mill-ġdid").



Simbolu tal-KATNAZZ

L-isprej nażali hu msakkar u ma jistax jintuża.

Meta jgħaddi l-perjodu li fih it-tagħmir ikun imsakkar, is-simbolu tal-katnazz jibda jteptep. Is-simbolu tal-katnazz se jisparixxi mid-display meta l-buttna l-bajda fil-ġenb tal-isprej nażali tingħafas; l-isprej nażali issa jista' jerga' jintuża meta jseħh episodju ta' wġiġh qawwi li jiġi f'daqqa.



Simbolu tal-ARLOGĠ TAL-COUNTDOWN

Juri kemm ikun fadal hin mill-perjodu li fih it-tagħmir ikun imsakkar.

L-arlogġ tal-countdown qed jgħodd bil-kontra. Kull marka sewda tfisser 10 minuti; il-perjodu massimu li fih it-tagħmir ikun imsakka hu ta' sagħtejn. Huwa rakkomandat li tistenna għal 4 sigħat qabel ma titratta l-episodju li jmiss ta' wġiġh qawwi li jiġi f'daqqa.

Is-simbolu tal-ARLOGĠ TAL-COUNTDOWN jintwera flimkien mas-simbolu tal-KATNAZZ.



In-numru ta' doži li jkun fadal fl-isprej nażali huwa muri. Wara kull doża, in-numru jonqos b'wiehed fuq id-display. Skont l-isprej nażali, in-numru tal-bidu jista' jkun 20, 30 jew 40.



Simbolu tal-BATTERIJA

Il-batterija waslet biex tispicča. In-numru ta' doži fid-display jinbidel għal 5.

Dan hu bejn wiehed u iehor in-numru doži, li jkunu jistgħu jiġu pprovduti mill-isprej nażali, qabel ma l-batterija tkun baxxa wisq u d-display tintefa.

Il-batterija ma tistax tinbidel u se jkun jeħtieġ li tikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek biex tixtri sprej nażali ġdid.

Jekk thoss li l-isprej nażali ma jkun qed jahdem kif deskritt fl-"Istruzzjonijiet għall-użu", jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

ANNEX IV

**KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI U RAĠUNIJIET GHALL-VARJAZZJONI GHAT-
TERMINI TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Konkluzjonijiet xjentifiċi

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta' Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal fentanyl (għoti transmukużali), il-konkluzjonijiet xjentifiċi tas-PRAC huma kif ġej:

Fid-dawl tar-rapporti fil-letteratura, rapporti spontanji u azzjonijiet preċedenti meħuda għal prodotti oħra tal-opjojdi (eż. irqajja' transdermali, soluzzjoni għall-injezzjoni ta' fentanyl), il-PRAC iqis li għandha tiġi kkomunikata aktar informazzjoni dwar id-Disturb Minħabba l-Użu tal-Opjojdi (OUD, *Opioid Use Disorder*) lil dawk li jippreskrivu l-prodott u lill-pazjenti. Il-PRAC ikkonkluda li l-informazzjoni dwar il-prodott tal-prodotti li fihom fentanyl (għoti transmukużali) għandha tiġi emendata kif xieraq.

Fid-dawl tar-rapporti fil-letteratura, rapporti spontanji u azzjonijiet preċedenti meħuda għal prodotti oħra tal-opjojdi (eż. irqajja' transdermali, soluzzjoni għall-injezzjoni ta' fentanyl), il-PRAC iqis li għandha tiġi kkomunikata aktar informazzjoni dwar il-ħażna f' post sigur u sikur fl-informazzjoni dwar il-prodott. Il-PRAC ikkonkluda li l-informazzjoni dwar il-prodott tal-prodotti li fihom fentanyl (għoti transmukużali) għandha tiġi emendata kif xieraq.

Fid-dawl tad-*data* disponibbli dwar lewkoenċefalopatija tossika f'kuntast ta' doża eċċessiva mill-letteratura u rapporti spontanji inklużi każijiet li għandhom mill-inqas possibbiltà raġonevoli ta' relazzjoni kawżali ma' doża eċċessiva ta' fentanyl, ir-Relatur tal-PRAC ikkonkluda li l-informazzjoni dwar il-prodott ta' prodotti li fihom fentanyl (għoti transmukużali) għandha tiġi emendata kif xieraq.

Wara li rreveda r-rakkomandazzjoni tal-PRAC, is-CHMP jaqbel mal-konkluzjonijiet ġenerali magħmula mill-PRAC u mar-raġunijiet għar-rakkomandazzjoni.

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq

Abbażi tal-konkluzjonijiet xjentifiċi għal fentanyl (għoti transmukużali) is-CHMP huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta' prodott(i) mediċinali li fih/fihom fentanyl (għoti transmukużali) mhuwiex mibdul sugġett għall-bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott.

Is-CHMP jirrakkomanda li t-termini għall-awtorizzazzjoni(jiet) għat-tqegħid fis-Suq għandhom ikunu varjati.