



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/46000/2008
EMA/V/C/000090

Purevax RCP (*kasside viirusliku rinotrahheiidi, kasside panleukopeenia (nõrgestatud, elus) ja kasside kalitsiviroosi (inaktiveeritud) vaktsiin*)

Vaktsiini Purevax RCP ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Mis on Purevax RCP ja milleks seda kasutatakse?

Veterinaarvaktsiini Purevax RCP kasutatakse vähemalt 8-nädalaste kasside vaktsineerimiseks järgmiste haiguste vastu:

- kasside viiruslik rinotrahheiid (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus),
- kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb suupõletik),
- kasside panleukopeenia (parvoviirusest põhjustatud raske haigus, mis tekitab verist kõhulahtisust).

Vaktsiin aitab vähendada nende haiguste sümptomeid. Samuti võib see aidata ära hoida panleukopeeniast põhjustatud surma.

Purevax RCP sisaldab järgmisi koostisosi:

- kasside nõrgestatud rinotrahheiidi herpesviirus (FHV F2 tüvi),
- inaktiveeritud (hävitatud) kalitsiviroosi antigeenid (tüved FCV 431 ja G1),
- kasside nõrgestatud panleukopeenia viirus (PLI IV).

Kuidas vaktsiini Purevax RCP kasutatakse?

Vaktsiini Purevax RCP turustatakse süstesuspensiooni lüofilisaadi (külmkuivatatud graanulid) ja lahustina. Vaktsiini manustatakse kahe nahaaluse süstina. Esimene süst tuleb teha vähemalt 8-nädalastele kassipoegadele ja teine süst 3 - 4 nädalat hiljem. Kui kassipojal on emalt üsasiseselt ja piimaga saadud antikehade suur sisaldus, tuleb esmane vaktsineerimine edasi lükata 12. elunädalani. Kass tuleb revaktsineerida kõigi komponentide vastu ühe aasta möödumisel esimesest vaktsineerimiskuurist ja seejärel iga kolme aasta tagant.

Kui vajate vaktsiiniga Purevax RCP toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole.



Kuidas Purevax RCP toimib?

Purevax RCP on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Purevax RCP sisaldab väikeses koguses nõrgestatud või hävitatud viirusi, mis põhjustavad kasside rinotrahheiiti, kalitsiviroosi ja panleukopeeniat.

Kui kassile antakse vaktsiini, peab looma immuunsüsteem nõrgestatud või hävitatud viirusi võõraks ja tekitab nende vastu antikehi. Kui immuunsüsteem puutub nende viirustega hiljem uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. Antikehad aitavad kaitsa haiguste eest, mida need viirused põhjustavad. Nende viiruste või bakteritega hiljem elu jooksul kokku puutudes kass ei nakatu või on nakkus märksa kergem.

Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Purevax RCP kasulikkus?

Vaktsiini Purevax RCP efektiivsust uuriti mitmes laboriuuringus, milles kasse vaktsineeriti ja nakatati virulentse herpesviiruse, kalitsiviiruse või parvoviirusega. Vaktsiini Purevax RCP väliuuringutes vaadeldi esmast vaktsineerimisskeemi (2 süsti 3 - 4-nädalase vahega) ja revaktsineerimisskeemi (ainult üks süst). Uuringutesse kaasati eri tõugu noored ja täiskasvanud kassid, kuid mitte väikeseid kassipoegi. Efektiivsuse põhinäitaja oli vaktsiinis sisalduvate viiruste vastaste antikehade sisaldus veres.

Laboritingimustes tõendati vaktsiini Purevax RCP efektiivsus kasside kaitsmisel eespool nimetatud haiguste eest. Esmase vaktsineerimise väliuuringus suurenes loomadel kasside rinotrahheiidi herpesviiruse, kalitsiviirusnakkuse ja kasside panleukopeenia viiruse vastaste antikehade sisaldus. Revaktsineerimise uuringus püsis loomadel rinotrahheiidi herpesviiruse, kalitsiviirusnakkuse ja kasside panleukopeenia viiruse vastaste antikehade sisaldus suur või suurenes mõnevõrra.

Mis riskid vaktsiiniga Purevax RCP kaasnevad?

Vaktsiini Purevax RCP kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 loomal 10st) on mööduv apaatia (huvipuudus ümbritseva vastu) ja anoreksia (isutus), samuti hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), mis kestab 1 - 2 päeva. Samuti võib tekkida süstekohal lokaalne reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel, sügelus või turse, mis möödub 1 või 2 nädalaga. Vaktsiini Purevax RCP kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Vaktsiini Purevax RCP ei tohi kasutada tiinetel ega imetavatel kassidel.

Vaktsiini Purevax RCP kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti.

Vaktsiini Purevax RCP Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Euroopa Raviamet otsustas, et vaktsiini Purevax RCP kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et vaktsiini kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave vaktsiini Purevax RCP kohta

Vaktsiini Purevax RCP müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 23. veebruaril 2005.

Lisateave vaktsiini Purevax RCP kohta on ameti veebilehel:

www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rcp

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2020.