

29.03.2017  
EMA/81869/2017

## Jylamvo (soluzzjoni orali metotressat): il-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandhom jingħataw gwida edukattiva sabiex ikun żgurat li l-mediċina tintuża b'mod tajjeb

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandhom jispiegaw bir-reqqa lill-pazjenti meta u kif għandhom jieħdu d-doža tagħhom

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa li huma mistennija li jagħtu b'riċetta u jqassmu Jylamvo għandhom jingħataw fuljett edukattiv sabiex jiżguraw li l-mediċina tintuża b'mod tajjeb. Jylamvo, soluzzjoni orali li fiha l-metotressat, jintuża fil-kura tal-artrite u tal-marda tal-ġilda, il-psorjasi, kif ukoll fil-kura ta' tip ta' kanċer tad-demm magħruf bħala lewkimja limfoblastika akuta (acute lymphoblastic leukaemia - ALL).

Il-gwida edukattiva ser tinforma lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa li fil-każ tal-artrite u tal-psorjasi Jylamvo jrid jittieħed darba fil-ġimgħa. Fil-każ tal-ALL biss, din il-mediċina tista' tittieħed aktar spiss. Huwa importanti li l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jispiegaw bir-reqqa lill-pazjenti meta u kif għandhom jieħdu d-doža tagħhom. Jekk il-mediċina tintuża għall-psorjasi jew għall-artrite u bi żball tittieħed darba kuljum minflok darba fil-ġimgħa, tista' ssir ħsara kbira.

Huwa importanti wkoll li l-pazjenti jingħataw struzzjonijiet čari ta' kif jiġbdu doža mill-flixxun bis-siringa pprovduta. Kwalunkwe żball fil-kejl tad-doža jista' jwassal biex il-pazjenti jieħdu inqas jew aktar mediċina milli suppost u dan jista' jkollu konsegwenzi serji.

### Informazzjoni għall-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom

- Jylamvo huwa disponibbli bħala soluzzjoni orali li fiha 2 mg ta' metotressat għal kull ml.
- Fil-każ tal-artrite u tal-mard tal-ġilda, Jylamvo għandu jittieħed darba fil-ġimgħa biss, fl-istess jum kull ġimgħa. Doža tipika tvarja bejn 7.5 mg (3.75 ml) sa 25 mg (12.5 ml) darba f'ġimgħa. Il-metotressat qatt ma tittieħed kuljum għall-artrite jew għall-mard tal-ġilda.
- It-tabib, l-infermier jew l-ispiżjar tiegħek ser jispiegalek kif tiġbed id-doža meħtieġa permezz tas-siringa pprovduta. Uža biss is-siringa pprovduta ma' Jylamvo sabiex tiġbed id-doža. Fit-tabella ta' hawn taħt għandek issib gwida dwar l-ammont f'mgħid li għandek tiġbed għad-doži differenti:

## Jylamvo (metotressat 2mg/ml)

<b>Doža f'mg</b>	5 mg	7.5 mg	10 mg	15	20 mg	25 mg
<b>Ammont li għandek tiġbed f'ml</b>	2.5 ml	3.75 ml	5 ml	7.5 ml	10 ml	12.5 ml

- Fil-każ tal-lewkimja limfoblastika akuta (ALL), id-doža normalment tkun oħla u jista' jkollok bżonn tieħu Jylamvo aktar spiss. Segwi l-istruzzjonijiet tal-professjonista tal-kura tas-saħħha.
- Jekk ikollok xi sinjali jew sintomi ta' doža żejda, ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih. Dawn jinkludu: fsada, sensazzjoni mhux tas-soltu ta' debbulizza, ulċeri fil-ħalq, tħossok ma tiflaħx, rimettar, ippurgar iswed jew bid-demmm, tisgħol id-demmm jew tirremetti d-demmm u awrina mnaqqsa.
- Jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar il-kura tiegħek, kellem lit-tabib, l-infermier jew l-ispiżjar tiegħek.

### **Informazzjoni għall-professjonisti tal-kura tas-saħħha**

- Jylamvo huwa disponibbli bħala soluzzjoni orali li fiha 2 mg ta' metotressat għal kull ml.
- Il-pazjenti għandhom jingħataw parir dwar kif jieħdu d-doža b'mod tajjeb: fil-każ ta' artrite u psorjas, Jylamvo għandu jittieħed darba f'ġimgħa biss, fl-istess jum kull ġimġha. Il-metotressat qatt ma tittieħed kuljum għall-artrite jew għall-mard tal-ġilda. Fil-każ tal-lewkimja limfoblastika akuta (ALL), id-doža normalment tkun oħla u tista' tingħata aktar spiss.
- Ma' Jylamvo tingħata siringa orali u huwa importanti li din is-siringa biss tintuża sabiex tiġbed id-doža. L-iskala fuq is-siringa hija maqsuma f'ml filwaqt li d-doža hija espressa f'mg. Meta jippreskrivu Jylamvo, it-tobba dejjem għandhom jippreskrivu d-doža f'mg u f'ml.
- Il-professjonisti tal-kura tas-saħħha għandhom jivvalutaw lil kull pazjent sabiex jiddeterminaw jekk humiex kapaċi jkejlu d-doža b'mod tajjeb. Huwa biss wara valutazzjoni bħal din li l-pazjenti għandhom jibdew jieħdu Jylamvo waħedhom id-dar.
- Ma' kull riċetta l-pazjenti għandhom jiġu mfakkra kif ikejlu d-doža b'mod tajjeb.
- Il-pazjenti għandhom ikunu ssorveljati għal sinjali u s-sintomi ta' doža żejda, bħal fsada, sensazzjoni mhux tas-soltu ta' debbulizza, ulċeri fil-ħalq, tħossok ma tiflaħx, rimettar, ippurgar iswed jew bid-demmm, tisgħol id-demmm jew tirremetti d-demmm u awrina mnaqqsa.

### **Aktar informazzjoni dwar il-mediċina**

Jylamvo huwa mediċina li tintuża għall-kura tal-infammazzjonijiet li ġejjin:

- artrite reumatika attiva, marda infammatorja tal-ġogi;
- artrite idjopatika ġovanili severa (juvenile idiopathic arthritis - JIA), marda tal-ġogi fit-tfal;
- psorijażi diżabilitanti severa, marda li tikkawża rqajja' ħomor, bil-qoxra fuq il-ġilda.
- artrite psorjatika severa, infammazzjoni tal-ġogi li sseħħ fil-pazjenti bi psorjas.

Jylamvo jintuża wkoll għall-kura ta' lewkimja limfoblastika akuta (ALL), kanċer taċ-ċelloli bojod tad-demm imsejħha limfoblasti fl-adulti u fit-tfal li għandhom tliet snin u iżjed.

Aktar informazzjoni dwar Jylamvo tista' tinsab fuq is-sit elettroniku tal-

Agenzija: [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003756/human\\_med\\_002083.jsp](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003756/human_med_002083.jsp)