

Приложение А

Процедурен номер	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Котки, кучета, говеда и свине	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Флакон (стъклен)	10 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Котки, кучета, говеда и свине	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Флакон (стъклен)	20 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Котки, кучета, говеда и свине	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Флакон (стъклен)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине и коне	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Флакон (стъклен)	50 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине, коне) Мляко: 5 дни (говеда)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине и коне	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Флакон (стъклен)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине, коне) Мляко: 5 дни (говеда)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Котки, кучета, говеда и свине	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Съставни опаковки	20 ml	5 флакони	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине)

Процедурен номер	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Котки, кучета, говеда и свине	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Съставни опаковки	20 ml	10 флакони	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине)
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, свине и коне	Интрамускулно, интравенозно или подкожно инжектиране	Съставни опаковки	100 ml	12 флакони	Месо и вътрешни органи: 15 дни (говеда), 5 дни (свине, коне) Мляко: 5 дни (говеда)