

ЕО Номер	Търговско наименование	Състав	Фармацевтич на форма	Видове животни за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържан ие	Опаковано количество	Карентен срок
EU/2/00/026/001	Porcilis AR-T DF	≥ 6.2 log ₂ TNтитър протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i> дермoneкротичен токсин) ≥ 5.5 log ₂ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella</i> <i>bronchiseptica</i> клетки	Суспензия за инжектиране	Прасета (основни и ремонтни свине- майки)	Интрамускулно	Флакон (стъклен)	20 ml (10 дози)	1 Флакон в картонена кутия	0 дни
EU/2/00/026/002	Porcilis AR-T DF	≥ 6.2 log ₂ TNтитър протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i> дермoneкротичен токсин) ≥ 5.5 log ₂ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella</i> <i>bronchiseptica</i> клетки	Суспензия за инжектиране	Прасета (основни и ремонтни свине- майки)	Интрамускулно	Флакон (стъклен)	50 ml (25 дози)	1 Флакон в картонена кутия	0 дни
EO/2/00/026/003	Porcilis AR-T DF	≥ 6.2 log ₂ TNтитър	Суспензия за	Прасета (основни и	Интрамускулно	Флакон	20 ml	1 Флакон в	0 дни

		протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i> дермонекротичен токсин) $\geq 5.5 \log_2$ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella</i> <i>bronchiseptica</i>	инжектиране	ремонтни свине- майки)		(полиетилен терефталат). PET .	(10 дози)	картонена кутия	
EO/2/00/026/004	Porcilis AR-T DF	$\geq 6.2 \log_2$ TNтитър протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i> дермонекротичен токсин) $\geq 5.5 \log_2$ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella</i> <i>bronchiseptica</i> клетки	Суспензия за инжектиране	Прасета (основни и ремонтни свине- майки)	Интармускулно	Флакон (полиетилен терефталат). PET	50 ml (25 дози) I	1 Флакон в картонена кутия	0 дни
EU/2/00/026/005		$\geq 6.2 \log_2$ TNтитър протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i>	Суспензия за инжектиране	Прасета (основни и ремонтни свине- майки)	Интармускулно	Флакон (полиетилен терефталат). PET	100 ml (50 дози)	1 Флакон в картонена кутия	0 дни

		дермoneкротичен токсин) ≥ 5.5 log ₂ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella bronchiseptica</i> клетки							
EU/2/00/026/006		≥ 6.2 log ₂ TNтитър протеин dO (нетоксичен дериват получен чрез делеция на <i>Pasteurella multocida</i> дермoneкротичен токсин) ≥ 5.5 log ₂ аглутинационен титър на инактивирани <i>Bordetella bronchiseptica</i>	Суспензия за инжектиране	Прасета (основни и ремонтни свине-майки)	Интармускулно	Флакон (полиетилен терефталат). PET	250 ml (125 дози	1 Флакон в картонена кутия	0 дни

¹Среден неутрализиращ титър, получен след неколkokратна ваксинация на зайци с 1/2 доза

²Среден аглутиниращ титър, получен след еднократна ваксинация на зайци с 1/2 доза.