

ПРИЛОЖЕНИЕ I

**СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА, ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ
ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ В
ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ВИДОВЕ
ЖИВТНИ, НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ,
ПОКАЗАНИЯ/КАРЕНТНИ СРОКОВЕ И
ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА В
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ**

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Австрия	Chevita Tierarzneimittel Gesellschaft m.b.H.Kaplanstraße 10 AT 4600 Wels АВСТРИЯ	Doxymax 500 mg/g - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen für Schweine und Hühner	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Перорален прах	Прасета, Пилета (бройлери)	Пилета: 3—5 дни, перорално с водата за пиене	Пилета: 25mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден = 1g прах/20 kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пилета (бройлери) 5 дни, Яйца: не се използва при носачки Показания: Инфекция на дихателните пътища, причинена от Mycoplasma spp. (M.gallisepticum, Escherichia coli, Сепсис, причинен от Pasteurella multocida
Белгия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 50% Dopharma	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Телета, свине, домашни птици	Домашни птици: 50mg/kg/ден	3—5 дни 500g/1000L вода за пиене	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: инфекции от микроорганизми в дихателната или стомашно-чревната система
Белгия	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS ФРАНЦИЯ	Pulmodox 50%	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Телета, свине, домашни птици	Домашни птици: 50mg/kg/ден	3—5 дни 500g/1000L вода за пиене	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: инфекции от микроорганизми в дихателната или стомашно-чревната система

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Белгия	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 50%	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Свине, домашни птици	Домашни птици: 10—20mg/kg/ден	3—4 дни 100—200g//1000L вода за пиене	Месо и вътрешни органи: 3 дни/10mg/kg 12 дни/20mg/kg Показания: респираторни заболявания
Белгия	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 15% ad. us. vet..	Доксициклин хиклат	150mg/g	Водоразтворим прах	Свине, телета, домашни птици, изсячни птици, гълъби	Домашни птици: 10—20mg/kg/ден	3—5 дни 500g/1000L вода за пиене	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: респираторни заболявания, причинени от микроби
Белгия	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	Hydrodoxx 500 mg/g water-soluble powder	Доксициклин хиклат	500mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за уговяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от <i>Mycoplasma gallisepticum</i> .

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
България	Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich БЪЛГАРИЯ	Doxinyl 10% Oral Suspension	Доксициклин хиклат	100mg/ml	Перорална суспензия	Домашни птици	Чрез водата за пиене	50—100 ml Doxinyl 10% в 100 l вода за пиене на ден (50—100mg доксидоксиклин в 1 l вода за пиене) 3—5 дни	Месо – 5 дни
България	Farma Sis OOD 4 San Stefano Str. Dobrich БЪЛГАРИЯ	Cyvadox 10%	Доксициклин хиклат	100mg/ml	Перорална суспензия	Домашни птици	Чрез водата за пиене	0,5—1 ml в 1 l вода за пиене на ден \3—5 дни\ 50—100 mg доксициклин	Месо – 7 дни
България	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 50% w.s.p.	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	500g Doxycycline 50% w.s.p. в 100 l вода за пиене /3—5 дни/	Месо – 4 дни
България	Farmavet OOD 40 Otec Paisij Str. Shumen БЪЛГАРИЯ	Doxycycline 20% Pulvis solubilis	Доксициклин хиклат	200mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	50g Doxycycline 20% в 100l вода за пиене /3—	Месо – 7 дни

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								5 дни/	
България	Interchemie Werken De Adelaar BV Hosterweg 26a 5811 Ccastenray НИДЕРЛАНДИЯ	Doxy – WS	Доксициклин хиклат	200mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	1kg Doxy-WS в 2000—4000l вода за пиене	Месо – 7 дни
България	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex ФРАНЦИЯ	Doxyvit 50 % WSP	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	2—3g Doxyvit 50% WSP в 10l. Вода за пиене - 5 дни /еквивалентно на 100—150mg Дохусуцилин в 1l вода	Месо – 7 дни
България	Ceva Sante Animale France La Balastiere 33501 Libourne Cedex ФРАНЦИЯ	Doxyvit 100	Доксициклин хиклат	100mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	10mg Doxyvit на kg телесно тегло на ден	Месо – 7 дни
България	Vetpartners OOD Ivan Asen Str. 4270 Parvomaj БЪЛГАРИЯ	Polidoxichem 500/WSP	Доксициклин хиклат	500mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	50—100mg Дохусуцилин в 1l вода за пиене /3—5 дни/ еквивалент	Месо – 7 дни

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								но на 0,1—0,2g Polidoxichem 500 WSP в 1l вода за пиене на ден	
България	Biovet AD 39 Petar Rakov Str. 4550 Peshtera БЪЛГАРИЯ	Vibravet 10% Water soluble premix	Доксициклин хиклат	100mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Чрез водата за пиене	1g Vibravet 10% в 1l вода за пиене /=67—100mg Doxycycline / на ден. 5 дни	Месо – 7 дни
Кипър	PREMIER SHUKUROGLOU LTD	HIPRADOXI -S	Доксициклин хиклат	100mg	Перорален разтвор	Прасета, пилета (бройлери)	Перорален път на въвеждане, чрез водата за пиене	Бройлери: 50—100 mg доксициклин хиклат/L вода за 3—5 дни	Бройлери: месо: 5 дни прасета: месо: 6 дни
Чешка република	Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ИТАЛИЯ	DOXIPAN 20	Доксициклин хиклат	20 g/100 g	Прах за перорален разтвор	Пилета – бройлери, пуйки	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 5 дни.	Бройлери: 5—7,5 g от продукта/10 l вода за пиене пуйки: 10—20 mg доксициклин/kg телесно тегло	Пилета бройлери: Месо и вътрешни органи: 5 дни. Пуйки: Месо и вътрешни органи: 10 дни Показания: Пилета бройлери: Хронични респираторни заболявания и свързаните с тях

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									инфекции. Пуйки: Заболявания, причинени от грам-положителни и грам-отрицателни микроорганизми и микоплазми, особено респираторен и ставен синдром, причинени от микоплазми и/или стафилококи.
Чешка република	Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Словашка република	DOXYGAL	Доксициклин хиклат	50 mg/1 g	Прах за перорален разтвор	Домашни птици	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	Терапевтично-превантивно: 50 mg доксициклин/1 l вода за пиене Терапевтично: 100 mg доксициклин/1 l вода за пиене	Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Използва се за лечение на вторични бактериални инфекции след заболявания с вирусен произход. Домашни птици: Хронични респираторни заболявания (микоплазмоза), колибацилоза

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Чешка република	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Унгария	DOXYVIT 40 %	Доксициклин хиклат	40g/100g	Прах за перорален разтвор	Пилета – бройлери, пуйки	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	1. Продължителна терапия: 1,0g DOXYVIT 40% на 3—6 L вода за пиене 2. Пулсова терапия: 10—20mg доксициклин / kg телесно тегло, през 4—8 часа.	Пилета бройлери, пуйки: Месо и вътрешни органи: 4 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение и превенция на респираторни, чревни и системни инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин, при бройлери и пуйки. Хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum, Escherichia coli) Aerosaculitis (Mycoplasma meleagridis) Инфекциозен синовит (Mycoplasma synoviae) Холера по птиците (Pasteurella multocida) бордетела инфекции по пуйките (Bordetella avium) Инфекциозна хрема (Haemophilus

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									paragallinarum) Колибацилоза (Escherichia coli) некротичен ентерит (Clostridium perfringens) Хламидоза (Chlamydia psittaci)

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Чешка република	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	KARIDOX 100 mg/ml	Доксициклин хиклат	100 mg/1 ml	Перорален разтвор	Пилета-бройлери	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	10 – 20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден (т.е. 0,5–1,0 ml от продукта/l вода за пиене /ден).	Пилета (бройлери): Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Превенция и лечение на хронично респираторна болест (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Чешка република	Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Чешка република	MEDITEK DOX 100	Доксициклин хиклат	100g/kg	Прах за перорален разтвор	Бройлери	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	10 mg Доксициклин хиклат/1kg телесно тегло (1,0kg продукт/1000 l вода за пиене)	Пилета (бройлери): Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Превенция и лечение на инфекциозни заболявания на респираторната и стомашно-чревната система тракт при прасета и бройлери, причинени от патогени, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									Продуктът е ефикасен при някои бактерии, които са резистентни на тетрациклините от първа генерация.
Чешка република	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	ORIDOX 100 mg/ml, perorální roztok pro podání v pitné vodě pro brojleri a prasata	Доксициклин хиклат	100 mg/1ml	Перорален разтвор	Пилета-бройлери	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	10 – 20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден (т.е. 0,5–1,0 ml продукт/l вода за пиене /ден	Пилета (бройлери): Месо и вътрешни органи: 7 дни. Яйца: Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Превенция и лечение на хронично респираторна болест (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Чешка република	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS ФРАНЦИЯ	Pulmodox O.S.P. 5%	Доксициклин хиклат	0,05 g/1g	Прах за перорален разтвор	Домашни птици	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	Домашни птици на възраст до 2 седмици: 1 g продукт на L вода за пиене на ден Домашни птици на възраст над 2 седмици: 2 g продукт на L вода за пиене на ден Продължителност на лечението: 3 – 5 дни.	Пилета (бройлери): Месо и вътрешни органи: 4 дни; Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение на респираторни инфекции, причинени от патогени, чувствителни към доксициклин и пилета (бройлери).
Чешка република	KELA Laboratoria n.v. Industrial Zone De Kluis" St. Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten БЕЛГИЯ	Respidox 5 %	Доксициклин хиклат	50 mg/1 g	Прах за перорален разтвор	Домашни птици	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 3 дни.	2 g продукт/ l вода за пиене	Домашни птици: Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									доксциклин. Домашни птици: Хронични респираторни заболявания, колибацилоза, възпаление на носната лигавица, синовит, салмонелоза, холера по птиците, хламидиоза
Чешка република	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis ФРАНЦИЯ	RONAXAN P.S. 5%	Доксициклин хиклат	50 mg/1 g	Прах за перорален разтвор	Пилета	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 5 дни.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло / ден (т.е. 1 g продукт/5 kg телесно тегло.)	Пилета (бройлери): Месо и вътрешни органи: 4 дни, Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение на респираторни инфекции, причинени от патогени, чувствителни към доксициклин при пилета (бройлери).

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Чешка република	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	Doxycycline Calier 500 mg/g	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	6 дни Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Чешка република	Ceva Animal Health Slovakia spol. s.r.o. Račianska 77 831 02 Bratislava СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА	DOXYVIT 100	Доксициклин хидрохлорид	100 g/1000 g	Прах за перорален разтвор	Домашни птици (пилета, пуйки, гъски)	Прилагайте перорално чрез водата за пиене за период от 5 дни.	10 mg доксициклин / kg телесно тегло на ден т.е. 0,1 g DOXYVIT 100 / kg телесно тегло	Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение и превенция на респираторни, чревни и системни инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин при кокошки, пуйки и гъски: Хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum, Escherichia coli), аеросакулит (Mycoplasma meleagridis), синовит (Mycoplasma

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									synoviae), холера по птиците (Pasteurella multocida), бордетела при пуйки (Bordetella avium), инфекциозен ринит (Haemophilus paragallinarum), колибацилоза (Escherichia coli), некротичен ентерит (Clostridium perfringens), хламидиоза (Chlamydia psittaci), превенция при стресови условия (ваксинация, промени в мястото на обитаване, транспорт)
Дания	Laborartorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140 ИСПАНИЯ	Karidox	Доксициклин хиклат	10 %	Перорален разтвор	Пилета, свине	Перорално (вода за пиене) за 3 до 5 дни	При пилета: 10—20 mg доксициклин хиклат на кг телесно тегло на ден за 3 до 5 дни (т.е. 0,5—1,0 ml продукт/литър вода/ден)	Пилета за клане: 7 дни яйца: Не се разрешава приложение при птици носачки, ако яйцата са предназначени за човешка консумация. Показания: Превенция и лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмоза, причинени от

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Дания	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Oridox	Доксициклин хиклат	10%	Перорален разтвор	Пилета, свине	Перорално (вода за пиене) за 3 до 5 дни	При пилета: 10—20 mg доксициклин хиклат на кг телесно тегло на ден за 3 до 5 дни (т.е. 0,5—1,0 ml продукт/литър вода/ден)	Пилета за клане: 7 дни яйца: Не се разрешава приложение при птици носачки, ако яйцата са предназначени за човешка консумация. Показания: Показания: Превенция и лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Дания	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HydroDoxx	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за угодяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Естония	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	Hipradoxi-S	Доксициклин хиклат	100mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	пилета (бройлери)	перорално приложение чрез водата за пиене.	50...100 mg доксициклин/литър вода	Месо и вътрешни органи: 5 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване и свързаните с тях инфекции.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Естония	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	Hipradoxi-P	Доксициклин хиклат	100mg/g	прах за перорален разтвор	пилета (бройлери)	перорално приложение чрез водата за пиене.	20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден	Месо и вътрешни органи: 5 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване и свързаните с тях инфекции.
Естония	Maxx Pharma OÜ Kaluri tee 5 Haabneeme 74001 Viimsi Harjumaa ЕСТОНИЯ	Doxuprim 40%	Доксициклин хиклат	400mg/g	прах за перорален разтвор	пилета, пуйки	перорално приложение чрез водата за пиене.	10...20 mg/kg телесно тегло/ден 5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: За лечение на респираторни, интестинални и системни инфекции, причинени от организми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Естония	Zoovetvaru uusaru 5 76505 Saue Harjuma ЕСТОНИЯ	Doxycin	Доксициклин хиклат	200mg/g	прах за перорален разтвор	пилета (бройлери)	за перорално приложение чрез водата за пиене	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 6 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: За лечение на инфекции на респираторната система и храносмилателния тракт, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин, включително микоплазми, бордетелиоза, хламидиоза, пастъорелоза, анаеробни инфекции, салмонелоза, стафилококоза, колибацилоза.
Естония	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld НИДЕРЛАНДИЯ	Dutch Farm Doxycycline 20% WSP	Доксициклин хиклат	200mg/g	прах за перорален разтвор	домашни птици	за перорално приложение чрез водата за пиене.	15 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									Показания: За лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин, особено респираторни инфекции.
Германия	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	DOXYCYCLINE CALIER 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Huhn und Schwein	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Германия	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HydroDoxh 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за уговяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Гърция	Durden Trading Limited 12,Kennedy Av. Nicosia КИПЪР	Stardox	Доксициклин хиклат	500mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пилета, които не снасят яйца. Телета, Свине	Във водата за пиене	20 mg/kg X 4—7 дни	Месо и вътрешни органи: 14 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum, колибацилоза
Гърция	NEW VET A.E Fleming 15 15123 Marousi Attikis ГЪРЦИЯ	Nexyclin	Доксициклин хиклат	400 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пуйки, прасета	Във водата за пиене	20 mg/kg	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma gallisepticum, E.coli Pasteurella multocida, Chlamydia psittaci

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Гърция	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS ФРАНЦИЯ	Pulmodox	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пилета, които не снасят яйца. Телета, Свине	Във водата за пиене	10 mg/kg X 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 9 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp, E.coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и colinum
Гърция	Nutri-Biomed Hellas LTD 1,V.Hugo &Chlois Metamorfosi Attikis 14452 Athens ГЪРЦИЯ	Doxyveto	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пилета, които не снасят яйца. Телета, Свине	Във водата за пиене	25 mg/kg X 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 9 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp, E.coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и colinum

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Гърция	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycyclin 50 Dopharma	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Телета, прасета	Във водата за пиене	25 mg/kg X 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 9 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp, E.coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и colinum
Гърция	Durden Trading Limited 12,Kennedy Av. Nicosia КИПЪР	Doxycycline 150/Durden	Доксициклин хидрохлорид	150 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пилета, които не снасят яйца. Телета, Свине	Във водата за пиене	10 mg/kg X 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma gallisepticum, E.coli, Haemophilus paragallinarum
Гърция	AFOI TETOROU ABE 10 km National road Athens-Lamia 14451, Metamorfosi ГЪРЦИЯ	Doxycycline 150/Afoi Tetorou	Доксициклин хидрохлорид	150 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета(бройлери) Пилета, които не снасят яйца. Телета, Свине	Във водата за пиене	10 mg/kg X 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma gallisepticum, E.coli, Haemophilus

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									paragalinarum
Испания	LAB. DR ESTEVE Avda Mare de Deu de Montserrat 221 08041 Barcelona ИСПАНИЯ	DOX ESTEVE	Доксициклин хиклат	100 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета Волове	Перорално 3—5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 9 дни Показания: Инфекции, причинени от <i>Mycoplasma spp</i> (Микоплазмоза, хронични респираторни заболявания) или <i>Pasteurella multocida</i> (Пастъорелоза). Месо и вътрешни органи: Домашни птици: 5 дни Пуйки: 7 дни Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	S.P. Veterinaria SA Crtá. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) ИСПАНИЯ	DOXI 100 mg/ml POLVO ORAL	Доксициклин хиклат	10 g/100 g	Водоразтворим прах	Домашни птици Пуйки Прасета	Перорално 3—5 дни (Домашни птици и пуйки) 5 дни (Прасета)	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден (домашни птици и пуйки) 10 mg/kg/ден (прасета)	Месо и вътрешни органи: Бройлери: 5 дни Пуйки: 7 дни Прасета: 4 дни
Испания	FATRO URIACH VETERINARIA, S.L. Constitucion, 1 08960 Sant Just Desvern ИСПАНИЯ	DOXIDOL	Доксициклин хиклат	10 g/100 g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	7,5 – 15 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза Хронични респираторни заболявания
Испания	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC ИСПАНИЯ	DOXIVET 20	Доксициклин хиклат	200 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	10—20 mg/Kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронични респираторни заболявания, микоплазмоза

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	MEVET, S. A. POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, PARCELA409-410 25191 Lérida ИСПАНИЯ	DOXICIVALL POLVO	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: Колибацилоза, хронични респираторни заболявания, микоплазмоза
Испания	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	HIPRADOXI -S	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	LAMONS, S.A. POL.IND.MECANOV A, NAVES 27-28 25191 LLEIDA ИСПАНИЯ	DOXICICLINA 10 % LAMONS	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	HIPRADOXI-P	Доксициклин хиклат	100 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: колибацилоза, хронично респираторно заболяване и свързаните с тях инфекции.
Испания	POLICHEM, S.A. Ctra. Reus-Cambrils, Km. 3 43206 Reus ИСПАНИЯ	DOXICHEM	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	SUPER´S DIANA, S.L. Ctra. Barcelona - Ripoll, Km 17 08150 Parets del Valles ИСПАНИЯ	DOXBRON	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	COTECNICA - COOPERATIVA TECNICA AGROPECUARIA Ctra. N II KM 494,5 25250 Bellpuig (Lerida) ИСПАНИЯ	DOXICICLINA 500 USO VETERINARIO COTECNICA	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus ИСПАНИЯ	LAFIDOX POLVO ORAL	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	LABORATORIOS SYVA, S.A. PARROCO PABLO DIEZ, 49-57 24010 TROBAJO DEL CAMINO ИСПАНИЯ	SYVADOX 10 %	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	INVESA INTERNACIONAL, S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT ИСПАНИЯ	DX-10	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus ИСПАНИЯ	DOXICICLINA 500 GANADEXIL	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Пуйки	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC ИСПАНИЯ	DOXIVET 5	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Пуйки	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT ИСПАНИЯ	DOXINYL	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	JAER, S.A. Barcelona, 411 08620 San Vicens del Horts ИСПАНИЯ	MASTERMIX DOXICICLINA	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Пуйки	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	KARIDOX	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	10–20 mg/Kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	SOLDOXIN	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	10—20 mg/Kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	CALIERDOXINA 50 % P O	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	GANAMIX DOXICICLINA 50 % P O	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) ИСПАНИЯ	HIDRODOX 10 %	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Испания	VIRBAC ESPAÑA, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat ИСПАНИЯ	PULMODOX P.O.S.	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Испания	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	DILUDOX	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за утаяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Испания	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	DOXICICLINA CALIER 500 mg/g	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: Превенция и лечение на хронично респираторно

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Испания	LABORATORIOS MAYMO, S.A. Via Augusta, 302 08017 Barcelona ИСПАНИЯ	MAYDOX PS	Доксициклин хидрохлорид	50 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Пуйки	Перорално 3 – 5 дни	50 – 100 mg/l вода за пиене/ден	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: Колибацилоза, хронично респираторно заболяване, микоплазмоза.
Франция	COORHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis ФРАНЦИЯ	RONAXAN P.S. 5 %	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуйки Свине Бройлери Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Бройлери: 4 дни Показания: Бройлери и пуйки : Превенция и лечение на инфекции на респираторната система
Франция	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex ФРАНЦИЯ	DOXY 5 FRANVET	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуйки, Свине Кокошки Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									респираторната система
Франция	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS ФРАНЦИЯ	PULMODOX P.O.S. 5 %	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Свине Телета Домашни птици	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на респираторната система
Франция	Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex ФРАНЦИЯ	DOXYVAL 5 %	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуйки Свине Бройлери Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на респираторната система

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Франция	Laboratoires Biove 3 rue de Lorraine 62510 Arques ФРАНЦИЯ	ACTI DOXY 5	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуяци Свине Бройлери Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на респираторната система
Франция	Ceva Sante Animale ФРАНЦИЯ La Balastiere 33501 Libourne Cedex ФРАНЦИЯ	DOXYVIT	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуйки Свине Бройлери Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на респираторната система
Франция	Noe 10 rue Clement Ader ZA Le Patis 78120 Rambouillet ФРАНЦИЯ	COMPOMIX V DOXYCYCLINE	Доксициклин хиклат	50 mg/g	Водоразтворим прах	Пуяци Свине Бройлери Телета	Превенция 1 – 3 дни Лечение: 3 – 5 дни	10 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: Пуйки: 6 дни Кокошки : 4 дни Показания: Превенция и лечение на инфекции на респираторната система

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Франция	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	SOLDOXIN 100 MG/ML SOLUTION BUvable POUR POULES POULETS ET PORCINES	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Свине Кокошки Бройлери	ПИЛЕТА (бройлери): 10—20 mg доксициклин / kg телесно тегло / ден	3 – 5 дни	Показания: ПИЛЕТА (БРОЙЛЕРИ) Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Франция	Laboratorios Karizoo S.A. Pol. Ind. La Borda c/Mas Pujades 11-12 Caldes de Montbui 08140 ИСПАНИЯ	DOXYSOL 10 %	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	Свине Кокошки Бройлери	ПИЛЕТА (бройлери): 10—20 mg доксициклин / kg телесно тегло / ден	3 – 5 дни	Показания: ПИЛЕТА (БРОЙЛЕРИ). Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Франция	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HYDRODOXX 500 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATI ON DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCS	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за утаяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Франция	LABORATORIOS CALIER, S.A. BARCELONÉS, 26 08520 Les Franqueses del Valles ИСПАНИЯ	DOXYCYCLINE CALIER 500 MG/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L'EAU DE BOISSON POUR POULETS ET PORCINS	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Домашни птици Прасета	Перорално 3 – 5 дни	20 mg/kg/ден	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Унгария	COORHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis ФРАНЦИЯ	Ronaxan P.S. 5 % oldható por	Доксициклин хиклат	5 g/100 g	Прах за перорален разтвор	Пилета	Пилета на възраст под 2 седмици: 1 g прах/1 литър вода за пиене/ден. Пилета на възраст над 2 седмици: 2 g прах/1 литър вода за пиене.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: За лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмени заболявания, и други инфекции

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 50 % WSP	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	500 g продукт, разтворен в 1000 литра вода за пиене.	25 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: За лечение и контрол на респираторни заболявания при пилета.
Унгария	Kon-Pharma GmbH. 30625 Hannover ГЕРМАНИЯ	Doxy 50 % porbelsőleges oldathoz	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета, пуйки	Пилета: 500 mg продукт, разтворен в 1 литра вода за пиене. Пуйки: 400 mg продукт/1 литър вода за пиене.	30 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета и пуйки: 11 дни.
Унгария	V.M.D. Állatgyógyászati Kft. 1093 Budapest УНГАРИЯ	Doxyveto-50	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	Продължително лечение: 0,2 g продукт/1 литър вода за пиене. Пулсово лечение: изчисленото количество продукт трябва да се разтвори във водата за пиене, която се консумира за 8 часа.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 10 дни Показания: За лечение на хронично респираторно заболяване и пастъорелоза; синовит при пуйки.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ	Doxyril 50 % por belsőleges oldathoz	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	5 g продукт/100 kg телесно тегло/ден, разтворени във водата за пиене.	25 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: За лечение на хронично респираторно заболяване, пастъорелоза, колибацилоза, инфекции с Haemophilus и Clostridium
Унгария	Animal-Med Kft. 1029 Budapest УНГАРИЯ	Anidox 10 % por belsőleges oldathoz	Доксициклин хиклат	100 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	1 000 g продукт, разтворен в 1000 литра вода за пиене.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 12 дни Показания: За лечение на микоплазмоза, пастъорелоза, колибацилоза.
Унгария	Animal-Med Kft. 1029 Budapest УНГАРИЯ	Anidox 100 % por belsőleges oldathoz	Доксициклин хиклат	1 000 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	100 g продукт, разтворен в 1000 литра вода за пиене.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 12 дни Показания: За лечение на инфекции, причинени от: Mycoplasma gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum и

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									Pasteurella multocida
Унгария	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Унгария	Doxuprim 40 % vizoldékony pulvis	Доксициклин хиклат	400 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета, пуйки	Продължително лечение: 1 g продукт/3—6 литра вода за пиене. Пулсово лечение: Изчисленото количество продукт трябва да се разтвори във водата за пиене, която се консумира за 4—8 часа.	10—20 mg/доксиклин/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: За лечение на инфекции, причинени от: Mycoplasma gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum и Pasteurella multocida
Унгария	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ИТАЛИЯ	Doxifarm 50 % WSP	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	40 g продукт/100 kg телесно тегло/100 литра вода за пиене.	20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: За лечение на хронично респираторно заболяване, микоплазмоза, синовит, колибацилоза, илеит (некротичен и улцерозен) инфекция с хемофилус.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	VIRBAC S.A. 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 CARROS ФРАНЦИЯ	Pulmodox 50 % WSP	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	500 g продукт, разтворен в 1000 литра вода за пиене.	25 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3-5 дни	Месо и вътрешни органи: 4 дни Показания: За лечение на хронични респираторни заболявания и други респираторни заболявания, причинени от: Mycoplasma spp., Pasteurella spp., E. coli, и Chlamydia psittaci.
Унгария	Phylaxia Pharma Zrt. 8000 Székesfehérvár УНГАРИЯ	Doxyphyl SP	Доксициклин хиклат	300 mg/g	Прах за перорален разтвор	плетта, пуйки	40 g продукт/1200 kg телесно тегло/ден, Изчисленото количество продукт трябва да се разтвори във водата за пиене, която се консумира за 3 часа.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: пилета: 7 дни Пуйки: 10 дни. Показания: За лечение на респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp., E. coli, Haemophilus paragallinarum, Bordetella avium, и илеит, причинен от Clostridium perfringens и Cl. colinum.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 50 % pulvis	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	Разтваря се във водата за пиене.	10 mg/kg телесно тегло и 20 mg/kg телесно тегло/ден, за 4 дни.	Месо и вътрешни органи: Пилета, третирани с 10 mg/kg телесно тегло: 5 дни, пилета, третирани с 20 mg/kg телесно тегло: 12 дни. Показания: За лечение на респираторни и други заболявания, причинени от бактерии, чувствителни към доксициклин.
Унгария	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Oridox 100 mg/ml belsőleges oldat	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	Пилета	100 mg/ml перорален концентрат се разтваря във водата за пиене.	10-20 mg/доксициклин/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: За лечение на респираторни и други заболявания, причинени от бактерии, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	Karidox 100 mg/ml belsőleges oldat	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	Пилета	100 mg/ml перорален концентрат се разтваря във водата за пиене.	10-20 mg/доксиклин/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Показания: За лечение и превенция на хронично респираторно заболяване или други микоплазмени заболявания.
Унгария	CENAVISA, S.A. Camí Pedra Estela S/N 43205 Reus ИСПАНИЯ	Doxycen belsőleges oldat	Доксициклин хиклат	200 mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	Пилета	1 ml /20 kg телесно тегло/ден, разтворен във водата за пиене.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: За лечение на хронично респираторно заболяване, микоплазмоза и колибацилоза.
Унгария	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Унгария	Doxyvit 100 WSP	Доксициклин хидрохлорид	100 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета, пуйки, гъски	Продължително лечение: 1 g продукт/1 литър вода за пиене. Пулсово лечение: Изчисленото количество продукт трябва да се разтвори във водата за пиене, която се консумира за 6—8 часа.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета, пуйки, гъски 7 дни Показания: За лечение на респираторни и чревни заболявания при бройлери.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Унгария	Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. Viale Corassori 62 41100 Modena ИТАЛИЯ	Doxipan 20 WSP	Доксициклин хидрохлорид	200 mg/g	Прах за перорален разтвор	Пилета	5—7,5 г продукт, разтворен в 10 литра вода за пиене.	10—15 mg/доксиклин/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: За лечение на хронично респираторно заболяване, микоплазмоза, синовит, колибацилоза, илеит (некротичен и улцерозен) инфекция с хемофилус.
Унгария	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	Hipradoxi-S oral solutio	Доксициклин хидрохлорид	100 mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	Пилета	100 mg/ml перорален концентрат се разтваря в 1 литър вода за пиене.	10 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден за 5 дни	Месо и вътрешни органи: 5 дни Показания: За лечение и превенция на хронично респираторно заболяване или други микоплазмени заболявания.
Ирландия	S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) ИСПАНИЯ	DOXIVEX 10% Concentrate for oral solution.	Доксициклин хиклат	100mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и прасета	За перорално приложение чрез водата за пиене за период от 3—5 дни.	Пилета (бройлери) : 50—100 mg Доксициклин / литър вода за пиене / ден (еквивалентно на 0,5	Месо и вътрешни органи: 7 дни. Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Лечение

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								– 1,0 ml DOXIVEX 10 % / литър вода за пиене / ден) за 3—5 дни	на колибацилоза, хронично респираторно заболяване (CRB) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Ирландия	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	Aquadoxx 500 mg/g water-soluble powder	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за уговяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRB), причинено от Mycoplasma gallisepticum.
Италия	CEVA VETEM S.P.A. Via Colleoni n.15 20041 Agrate Brianza (Milano) ИТАЛИЯ	DOXICICLINA 20% CEVA VETEM	Доксициклин хиклат	Доксициклин 200 г. на 1 kg. продукт	Водоразтворим прах	бройлери, пуйки	вода за пиене	Бройлери, пуйки: 1 g / 10 kg телесно тегло на 5 дни.	Месо и вътрешни органи: бройлери: 7 дни пуйки: 8 дни Показания: Бройлери: Лечение на хронично респираторно

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									заболяване Пуйки: Лечение на инфекциозен синусит
Италия	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ИТАЛИЯ	DOXICICLINA 50 % CHEMIFARMA	Доксициклин хиклат	Доксициклин 500 g. на 1 kg. продукт	Водоразтворим прах	бройлери, свине	вода за пиене	Бройлери: 20 mg доксициклин / на 1 kg телесно тегло (на 3—5 дни) Свине: 20mg доксициклин / на 1 kg телесно тегло на 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: бройлери: 6 дни Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. свине : 5 дни Показания: Бройлери: Хронично респираторно заболяване, причинено от: Pasteurella spp, Mycoplasma spp, Haemophilus gallinarum, Bordetella avium и Chlamidia psittaci.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Италия	SINTOFARM S.P.A. Via Togliatti n.5 42016 Guastalla (Reggio Emilia) ИТАЛИЯ	DOXIFARM 50%	Доксициклин хиклат	Доксициклин хиклат 500 mg. (еквивалентно на 433,3 mg Doxycyclina) за 1 g. продукт	Водоразтворим прах	бройлери, свине	вода за пиене	Бройлери: 25 mg доксициклин хиклат / на 1 kg телесно тегло (на 3—5 дни) Свине: 20 mg доксициклин хиклат/ на 1 kg телесно тегло на 5 дни	Месо и вътрешни органи: бройлери: 6 дни Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. свине : 4 дни Показания: Бройлери: Лечение и контрол на респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma spp, Haemophilus paragallinarum, Escherichia coli. Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum
Италия	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ИТАЛИЯ	DOXIPAN 54	Доксициклин хиклат	Доксициклин 500 g. на 1 kg. продукт	Водоразтворим прах	бройлери, пуйки, свине	вода за пиене	Бройлери: 10mg доксициклин / 1 kg телесно тегло Пуйки: 20mg доксициклин / 1 kg телесно тегло	Месо и вътрешни органи: бройлери: 3 дни Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. пуйки : 10 дни свине: 4 дни

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								Свине: 10mg доксициклин/ 1 kg телесно тегло на 5 дни	Показания: Бройлери: Хронично респираторно заболяване. Пуйки: Респираторни и ставни синдроми, причинени от Mycoplasmas и/или Staphylococcus
Италия	INTERVET ITALIA S.R.L. Via W. Tobagi n.7 20068 Agrate Brianza (Milano) ИТАЛИЯ	NAXOCET	Доксициклин хиклат	Доксициклин хиклат 500 mg. на 1 g. продукт	Водоразтворим прах	бройлери	вода за пиене	Бройлери: 20mg доксициклин хиклат/ 1 kg телесно тегло на 5 дни	Месо и вътрешни органи: бройлери: 8 дни Не се разрешава употребата при кокошки носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma spp.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Литва	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	DOXYCYCLINE 50 %, geriamieji milteliai	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Перорален прах	Телета, Свине и домашни птици	4–7 дни с водата за пиене	Домашни птици: 40 mg на 1 kg телесно тегло или 200–400 g на 1 000 литра вода за пиене, за 4–7 дни.	Месо и вътрешни органи: Домашни птици – 4 дни. Не се разрешава употребата при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания За лечение на домашни птици: Орнитоза, причинена от Chlamydia psittaci, колибактериоза, причинена от E. coli, ХРБ, причинена от Mycoplasma gallisepticum
Литва	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Унгария	DOXYPRIM 40 % geriamieji milteliai	Доксициклин хиклат	400 mg/g	Перорален прах	Пилета, пуйки и прасета	Трябва да се прилага за период от 5 дни при пилета и пуйки заедно с водата за пиене.	Пилета и пуйки: 10–20 mg доксициклин хиклат на 1 kg телесно тегло на ден, приложени като пулсова доза, когато изискваната дневна доза се	Месо и вътрешни органи: Ядливи тъкани на пилета и пуйки – 4 дни. Показания: Показанията при пилета и пуйки включват: Хронични респираторни заболявания (Mycoplasma gallisepticum, E. coli), аеросакулит (Mycoplasma meleagridis),

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								дава в ограничено количество вода, която се консумира от птиците в рамките на 4–8 часа или се дава непрекъснато като 67–133 mg/ml Доксициклин хиклат на 1 литър вода за пиене.	инфекциозен синовит (<i>Mycoplasma synoviae</i>), колибацилоза (<i>E. coli</i>), холера по птиците (<i>Pasteurella multocida</i>), бордетелоза при пуйките (<i>Bordetella avium</i>), инфекциозен ринит (<i>Haemophilus paragallinarum</i>), некротичен ентерит (<i>Clostridium perfringens</i>), хламидиоза (<i>Chlamydia psittaci</i>).
Литва	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	SOLUDOX 50 %, geriamieji milteliai	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Перорален прах	Прасета и пилета:	Трябва да се прилага перорално с водата за пиене за период от 4 дни.	Пилета: 10* mg доксициклин хиклат на 1 kg телесно тегло на ден за 4 дни; 20* mg доксициклин хиклат на 1 kg телесно тегло на ден за 4 дни. Най-високата	Показания: За лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин, като <i>Pasteurella multocida</i> и <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> при пилета.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								доза се препоръчва в случай на инфекции, причинени от щамове, които са умерено чувствителни (минимална инхибиторна концентрация (MIC) до 2 µg/ml), докато най-ниската доза може да се използва за (високо) чувствително щамове (MIC до 0,5–1,0 µg/ml)	

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Нидерландия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline-hyclaat 50%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Телета, пилета, които не снасят яйца, и пуйки.	Пилета, които не снасят яйца, и пуйки: Перорално с водата за пиене. Телесно тегло на ден за 4—7 дни.	Пилета, които не снасят яйца, и пуйки: 20 mg доксициклин хиклат на kg	Пуйки – месо: 28 дни. Пилета, които не снасят яйца - месо: 14 дни. Показания: Пуйки:- Орнитоза, причинена от Chlamydia psittaci - Колибацилоза, причинена от E. coli - хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum Пилета, които не снасят яйца Колибацилоза, причинена от E. coli
Нидерландия	Dutch Farm Veterinary Pharmaceuticals B.V. Veemweg 1 3771 MT Barneveld НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 20% W.O.	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 200 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета, които не снасят яйца	Перорално чрез водата за пиене. За 3 дни	10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3 дни	Месо: 7 дни. Показания при пилета, които не снасят яйца: - Полиартрит, причинен от Mycoplasma synoviae; - хронично респираторно заболяване, наред с други, причинени от Mycoplasma

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									gallisepticum - Колибацилоза, причинена от Escherichia coli
Нидерландия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline-hyclaat 20%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 200 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Телета, прасета, пилета и пуйки.	Пилета и пуйки: Перорално с водата за пиене за 4—7 дни.	Пилета и пуйки: 20 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло	Пуйки – месо: 28 дни. Пилета – месо: 14 дни, яйца: 10 дни. Показания при пуйки: - Орнитоза, причинена от Chlamydia psittaci - Колибацилоза, причинена от E. coli - хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum Показание при пилета: - Колибацилоза, причинена от E. coli - хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									gallisepticum
Нидерландия	Dutch Farm International B.V. Nieuw Walden 112 1394 PE Nederhorst den Berg НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 20% W.O.	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 200 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета, които не снасят яйца (бройлери).	Перорално с водата за пиене.	10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3 дни.	Месо: 7 дни. Не прилагайте при пилета, които снасят яйца, предназначени за човешка консумация. Показание при пилета, които не снасят яйца: - Полиартрит, причинен от Mycoplasma synoviae; - хронично респираторно заболяване, наред с други, причинени от Mycoplasma gallisepticum - Колибацилоза, причинена от Escherichia coli.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Нидерландия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline-hyclaat 50%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Телета, прасета, пилета, които не снасят яйца.	Пилета, които не снасят яйца: Перорално с водата за пиене за 4—5 дни.	Пилета, които не снасят яйца: 20 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 4—5 дни.	Пилета, които не снасят яйца - месо: 14 дни. Показания при пилета, които не снасят яйца: - Колибацилоза, причинена от E. coli - хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Нидерландия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 50% WSP	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета, които не снасят яйца.	Пилета, които не снасят яйца: Перорално с водата за пиене.	Пилета, които не снасят яйца: 25 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—5 дни.	Пилета, които не снасят яйца - месо: 6 дни. Показания при пилета, които не снасят яйца: - Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp (M. gallisepticum, M. synoviae и M. meleagridis), E. coli и Haemophilus paragallinarum; Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum
Нидерландия	Interchemie Werken De Adelaar BV Hosterweg 26a 5811 Ccastenray НИДЕРЛАНДИЯ	Doxy WS	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 200 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета, които не снасят яйца (бройлери).	Перорално с водата за пиене.	10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3 дни.	Месо: 7 дни. Показания при пилета, които не снасят яйца: - Полиартрит, причинен от Mycoplasma synoviae; - хронично респираторно заболяване, наред с други, причинени от Mycoplasma gallisepticum

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									- Колибацилоза, причинена от Escherichia coli.
Нидерландия	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 50%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Прасета и пилета, които не снасят яйца.	Пилета, които не снасят яйца: Перорално с водата за пиене.	Пилета, които не снасят яйца: - Пастъорело за, причинена от Pasteurella multocida: 10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—4 дни. Инфекции, причинени от Ornithobacterium rhinotracheale (ORT): 20 mg доксицикли	Пилета, които не снасят яйца:- Пастъорело - месо: 5 дни.- ORT – месо: 12 дни. Не се разрешава употребата при пилета, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								н хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—4 дни.	
Нидерландия	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Doxyfar 50%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Прасета и пилета, които не снасят яйца.	Пилета, които не снасят яйца: Перорално с водата за пиене.	Пилета, които не снасят яйца: - Пастъорело за, причинена от <i>Pasteurella multocida</i> : 10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—4 дни. Респираторни инфекции, причинени от <i>Ornithobacterium rhinotrache</i>	Пилета, които не снасят яйца: - Пастъорелоза - месо: 5 дни. - ORT – месо: 12 дни. Не се разрешава употребата при пилета, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								ale (ORT): 20 mg доксикли н хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—4 дни.	
Нидерландия	Kepro B.V. Maagdenburgstra t 38 7421 ZE Deventer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxy 200 W.S.P.	Доксицикли н хиклат	За един грам прах: 200 mg доксикли н хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета, които не снасят яйца (бройлери).	Перорално с водата за пиене.	10 mg доксикли н хиклат на kg телесно тегло на ден за 3 дни.	Месо: 7 дни. Не се разрешава употребата при пилета, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показание: - Полиартрит, причинен от Mycoplasma synoviae; - хронично респираторно заболяване, наред с други, причинени от Mycoplasma gallisepticum - Колибацилоза, причинена от Escherichia coli.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Нидерландия	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 50%	Доксициклин хиклат	За един грам прах: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Прасета и пилета, които не снасят яйца.	Пилета, които не снасят яйца: Перорално с водата за пиене.	Пилета, които не снасят яйца: 10 mg доксициклин хиклат на kg телесно тегло на ден за 3—4 дни.	Пилета, които не снасят яйца - месо: 5 дни. Показание: - Пастъорелоза, причинена от <i>Pasteurella multocida</i> :
Нидерландия	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	Karidox 10% Oral Solution	Доксициклин хиклат	За 1 ml: 100 mg доксициклин (като хиклат).	Перорален разтвор	Пилета и пилета (бройлери):	Пилета (бройлери): Перорално с водата за пиене.	Пилета (бройлери): 10—20 mg доксициклин на kg телесно тегло на ден за 3—5 дни.	Пилета (бройлери) – месо: 7 дни. Показание: Превенция и лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Нидерландия	Huvepharma, Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HydroDoxh 500 mg/g	Доксициклин хиклат	За 1 g: 500 mg доксициклин хиклат.	Прах за перорален разтвор	Пилета и пилета (бройлери):	Пилета (бройлери): Перорално с водата за пиене.	Пилета (бройлери): 20 mg доксициклин на kg телесно тегло на ден за 3—5 дни.	Пилета (бройлери) – месо: 6 дни. Не се разрешава употребата при пилета, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Нидерландия	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Soldoxin	Доксициклин хиклат	За 1 ml: 100 mg доксциклин (като хиклат).	Перорален разтвор	Пилета и пилета (бройлери):	Пилета (бройлери): Перорално с водата за пиене.	Пилета (бройлери): 10—20 mg доксициклин на kg телесно тегло на ден за 3—5 дни.	Пилета (бройлери) – месо: 7 дни. Не се разрешава употребата при пилета, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показание: Превенция и лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Полша	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxymed 50	Доксициклин хиклат	500 mg/g	прах за перорален разтвор	пилета	250—500 ml продукт/1000 литър вода за пиене	25 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 4 дни. Не се прилага при кокошки-носачки.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Полша	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 50%	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Перорален прах	пилета	2 g продукт/ 100 kg телесно тегло/ ден в случай на пастъорелоза или 4 g продукт / 100 kg телесно тегло/ ден в случай на инфекция с <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> .	10 mg доксициклин хиклат/ kg телесно тегло/ ден в случай на инфекция с <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> за 3—4 дни	Месо и вътрешни органи: 5 дни в случай на пастъорелоза. 12 дни в случай на инфекция с <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> . Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Laboratorios Hipra S.A. Avda La Selva 135 17170 Amer (Girona) ИСПАНИЯ	Hipradoxi-S	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	пилета	0,5—1,0 ml продукт/1 литър вода за пиене.	50—100 mg доксициклин хиклат/ 1 литър вода за пиене за 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 5 дни. Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Oropharma n.v. Dijkstraat 30 9140 Temse БЕЛГИЯ	Ornicure	Доксициклин хиклат	300 mg/4 g	Перорален прах	гълъби, папагали	гълъби: 4g продукт/2 литра вода за пиене, папагали: 4 g продукт/ 0,5 литър	15 mg/ kg телесно тегло./ ден за 5 дни в случай на болест по папагалите или клинична орнитоза за	Не се разрешава използването при гълъби, предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								3—4 седмици	
Полша	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ	Doxiryl 50%	Доксициклин хиклат	500 mg/g	прах за перорален разтвор	пилета (бройлери)	25 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден	25 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 4 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) ИСПАНИЯ	Doxivex 10%	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Концентрат за перорален разтвор	пилета (бройлери)	0,5—1,0 ml продукт/1 литър вода за пиене.	50—100 mg доксициклин хиклат/ 1 литър вода за пиене/ден за 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	CHENO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7ª Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Oridox	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	пилета (бройлери)	0,5—1,0 ml продукт/1 литър вода за пиене.	10—20 mg/доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona	Karidox	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	пилета (бройлери)	0,5—1,0 ml продукт/1 литър вода за пиене.	10—20 mg/доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден, за 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
	ИСПАНИЯ								
Полша	Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. Grójecka 6 05-651 Drwalew ПОЛША	Doxymina 20%	Доксициклин хиклат	200 mg/g	Перорален прах	пилета	25—50 g продукт/1 литър вода за пиене	10 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	V.M.D.n.v./ s.a. Hoge Muew 900 2370 Arendonk БЕЛГИЯ	Doxycycline hyclate 50%	Доксициклин хиклат	500 mg	прах за перорален разтвор	пилета	25 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден	25 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 5 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. Esmeralda, 19 - 4º 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT ИСПАНИЯ	Doxinyl	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Перорален разтвор	пилета (бройлери)	0,5—1,0 ml продукт/1 литър вода за пиене/ден.	50—100 mg доксициклин хиклат/ 1 литър вода за пиене за 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Biofaktor Sp. z o.o.(Skierniewice) Czysta 4 96-100 Skierniewice ПОЛША	Doxycyclinum 20%	Доксициклин хиклат	200 mg/ml	прах за перорален разтвор	плета, пуйки	25—50 g продукт/1 литър вода за пиене	10 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	1 Месо и вътрешни органи: 4 дни Не се прилага при кокошки-носачки.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Полша	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Fleminga 2 03-176 Warszawa ПОЛША	Doxycyclinum wet proszek	Доксициклин хиклат	200 mg/g	прах за перорален разтвор	пилета, пуйки	25—50 g прах/1 литър вода за пиене.	10 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Sogeval Laboratoires 200 route De Mayenne 53 022 Laval Cedex ФРАНЦИЯ	DOXYVAL 20%	Доксициклин хиклат	20 g/100 g	Перорален прах	пилета (бройлери)	5 g продукт/ 100 kg телесно тегло/ден или 0,5 g / 1 литър вода за пиене	10 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни.	Месо и вътрешни органи: 4 дни Не се прилага при кокошки-носачки.
Полша	Eurovet Animal Health B.V. Handelsveg 25 PO Box 179 5530 AD Bladel НИДЕРЛАНДИЯ	Soludox 15%	Доксициклин хиклат	150 mg/g	Перорален прах	пилета, пуйки, гълъби, птици в клетка	10—20 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден	10-20 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло/ден 3—5 дни В случай на инфекция <i>Chlamydia psittaci</i> за 30—45 дни.	Месо и вътрешни органи: 7 дни Не се разрешава използването при кокошки-носачки или гълъби, предназначени за човешка консумация.
Португалия	CEVA Saúde Animal –Produtos farmacêuticos e Imunológicos Lda. Ceva Saúde Animal Lda. Rua Doutor António Loureiro Borges 9/9ª 9º A Miraflores 1495-131 Algés	DOXYPRIM 400 mg / g Pó para Solução Oral para Suínos, Frangos e Perus.	Доксициклин хиклат	Доксициклин хиклат 400 mg/g	Прах за перорален разтвор	Свине, Пилета, Пуйки	За перорално приложение във водата за пиене	Бройлери и пуйки : 20 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло за 5 дни.	Пилета (бройлери) месо и вътрешни органи: 5 дни; Месо и вътрешни органи на пуйки: 6 дни; Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
	ПОРТУГАЛИЯ								
Португалия	DIVASA FARMAVIC DE PORTUGAL Produtos e Equipamentos Veterinários Lda. Parque Empresarial de Vialonga Armazém nº 21 Casal do Bagulho Granja de Alprate 2625-607 Vialonga ПОРТУГАЛИЯ	DOXYVET-10	Доксициклин хиклат	Доксициклин хиклат 10g; бромексин хлоридрат 1g	Перорален разтвор	Говеда (Телета), Свине, Бройлери, Пуйки, Овце, Кози (ярета)	За перорално приложение във водата за пиене	Бройлери и пуйки : 50—100 mg/литър вода/ден, за 3-5 дни (Еквивалентно на 0,5—1 ml DOXIVET-10 / литър на ден/ден	Месо и вътрешни органи: 5 дни
Португалия	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	VETADOXI 50	Доксициклин хиклат	Доксициклин хиклат 500 mg/g	Перорален прах	Говеда (Телета), Свине и Птици	За перорално приложение във водата за пиене, млякото или фуража	25mg/Kg телесно тегло при птици; 200g/1000L вода/ден 3-5 дни; 500g/1000L вода за пиене птици	Месо и вътрешни органи: 5 дни; Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Португалия	S.P. Veterinaria SA Crta. Reus Vinyols Km 4.1 Apartado 60 Riudoms 43330 (Tarragona) ИСПАНИЯ	Hidrodox 10% Concentrado para solução oral para aves (frangos de carne) e suínos	Доксициклин хиклат	Доксициклин (като хиклат) 100 mg	Концентрат за перорален разтвор	Пилета(бройлери) и свине	За перорално приложение във водата за пиене	Бройлери: 50 – 100 mg Доксициклин хиклат/L вода за пиене/ден (0,5—1,0 ml ВМП/L вода за пиене /ден) 3—5 дни.	Птици (бройлери) месо и вътрешни органи: 7 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.
Португалия	Univete SA Rua D. Jerónimo Osório, 5 B 1400-119 Lisboa ПОРТУГАЛИЯ	UNIDOXINA 200 mg/ml solução oral para suínos e aves	Доксициклин хиклат	Доксициклин (като хиклат) 200 mg	Перорален разтвор	Пилета(бройлери) и свине	За перорално приложение във водата за пиене	Бройлери и пуйки : 20 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло за 5 дни.	Пилета (бройлери) месо и вътрешни органи: 7 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	DELOS IMPEX' 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest РУМЪНИЯ	Doxidem 20	Доксициклин хиклат	200 mg/ml доксициклин хиклат.	Перорален разтвор	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация)	Перорално	- 75 ml продукт/100 литра вода за пиене/ден за 3—5 последователни дни при млади домашни птици до 4 седмици '- 150 ml продукт/100 литра вода за пиене/ден за 3—5 последователни дни при възрастни домашни птици	Месо и вътрешни органи: 28 дни Показания: Домашни птици За лечение на микоплазмоза, пастъорелоза, колибацилоза, стафилококоза. Хронично респираторно заболяване, инфекции, причинени от Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Salmonella spp., E. coli., Haemophilus paragallinarium, Staphylococcus, хепатит, причинен от Campylobacter и дерматит.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	DELOS IMPEX' 96 SRL 17, Pictor Ștefan Luchian sector 2 Bucharest РУМЪНИЯ	Doxidem 50	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Прасета	Перорално (вода за пиене)	- 20—40 mg от продукта/kg телесно тегло/ден за 5 последователни дни, през устата; '- 200—300 g от продукта/1 000 литра вода за пиене за 5 последователни дни	Месо и вътрешни органи: 28 дни Показания: Хронично респираторно заболяване, инфекции, причинени от Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Salmonella spp., E. coli., Haemophilus paragallinarum, Staphylococcus, хепатит, причинен от Campylobacter и дерматит и други заболявания, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	DOPHARMA B.V. Zalmweg 24, P.O. BOX 205 4940 AE Raamsdonksveer НИДЕРЛАНДИЯ	Doxycycline 50% WSP	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксциклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Телета Прасета	Перорално (вода за пиене)	40 mg /kg телесно тегло или 200—400 g/1000 литра вода за пиене за 4—7 дни	Месо и вътрешни органи: Домашни птици 4 дни Показания: - Орнитоза, причинена от Chlamydia psittaci при пуйки; '- Колибацилоза, причинена от E. coli при пилета и пуйки; '- хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum при пилета и пуйки;
Румъния	FRANVET ZI d'Etriche-Route d'Avire BP 103 49500 Segré Cedex ФРАНЦИЯ	Doxy 5 Franvet	Доксициклин хиклат	50 mg/g доксциклин (като хиклат).	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Телета Прасета	Перорално (вода за пиене или течен фураж)	1 g продукт/1 литър вода за пиене/ден за 3—5 дни при домашни птици на възраст до 2 седмици - 2 g продукт/1 литър вода за пиене /ден за 3—5 дни при	Месо и вътрешни органи: Домашни птици 4 дни Показания: За превенция и лечение на респираторни инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								домашни птици на възраст над 2 седмици	
Румъния	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI SpA Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ИТАЛИЯ	Doxipan 20	Доксициклин хиклат	200 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици прасета	Перорално (вода за пиене)	5—7,5 g продукт за всеки 10 литра вода за пиене	Месо и вътрешни органи: Домашни птици 5 дни Показания: Хронични респираторни заболявания и свързаните с тях инфекции.
Румъния	PHYLAXIA PHARMA LTD 1103 Budapest Gergely u.79 УНГАРИЯ	Doxyphyl SP A.U.V.	Доксициклин хиклат	300 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (пилета, кокошки пуйки)	Перорално (вода за пиене)	10 mg/kg телесно тегло за 3-5 дни или 100 mg продукт/1 литър вода за пиене	Пилета, кокошки: 7 дни Пуйки: 7 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: За превенция и лечение на няколко бактериални инфекции.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	LABORATORIOS SYVA S.A. Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57 24010 Leon ИСПАНИЯ	Syvadox 10%	Доксициклин хиклат	100 mg/1 ml доксициклин (като хиклат).	Перорален разтвор	Пилета (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация)	Перорално (вода за пиене)	50—100 mg Доксициклин / 1 литър вода за пиене / ден (еквивалентно на 0,5—1,0 ml продукт/ 1 литър вода за пиене / ден) за 3—5 дни	Пилета 7 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Колибацилоза, хронични респираторно заболяване, микоплазмоза – причинени от гореспоменати микроби, чувствителни към доксициклин.
Румъния	VMD Berendonk 74 2370 Arendonk БЕЛГИЯ	Doxyveto 50S	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин (като хиклат).	Водоразтворим прах	Домашни птици, Свине, телета, агнета	Перорално (вода за пиене или фураж)	20 mg доксициклин/kg телесно тегло /ден във водата за пиене или 300 g продукт/ 1000 литра вода за пиене или 600 g /1000 kg фураж за 3—5 дни	Домашни птици 8 дни Показания: Хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum), Орнитоза (Chlamidia psittaci), Инфекциозен синовит (Mycoplasma synoviae), Холера по птиците (Pasteurella multocida).

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	CHEMIFARMA S.p.A Via Don Eugenio Servadei 16 47100 Forlì ИТАЛИЯ	Doxiciclina 50%	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин	Водоразтворим прах	Бройлери свине	Перорално (през устата с водата за пиене или течния фураж)	40 g продукт/100 kg телесно тегло (20 mg доксициклин/kg телесно тегло), отговарящи на около 15—30 g продукт/100 литра вода за 3—5 дни.	Бройлери 5 дни Показания: Хронично респираторно заболяване и други респираторни заболявания, особено тези, причинени от <i>Pasteurella</i> spp., <i>Mycoplasma</i> spp., <i>Haemophilus gallinarum</i> , <i>Bordetella avium</i> и <i>Chlamidia psittaci</i> .

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, УНГАРИЯ	Doxiprim 40% Soluble Powder	Доксициклин хиклат	400 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Пилета, пуйки (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Свини	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин хиклат /kg телесно тегло	Пилета и пуйки 4 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: лечение на респираторни, интестинални и системни инфекции, причинени от организми, чувствителни към доксициклин. Хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum, E. coli), аеросакулит (Mycoplasma meleagridis), инфекциозен синовит (Mycoplasma synoviae), холера по птиците (Pasteurella multocida), инфекциозен ринит (Haemophilus paragallinarum), колибацилоза (E. coli), бордетелоза при пуйките (Bordetella avium), некротичен

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									ентерит (<i>Clostridium perfringens</i>), хламидиоза (<i>Chlamydia psittaci</i>). Превенция на вторични бактериални инфекции, породени от стресови условия, ваксинация, смяна на мястото за обитаване, транспорт.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ	Doxyril 50%	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Свини	Перорално (вода за пиене)	25 mg доксициклин хиклат /kg телесно тегло за 3 до 5 последователни дни	Домашни птици 4 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показание: Инфекции на дихателните пътища, причинени от Mycoplasma spp. (M. gallisepticum, M. synoviae и M. melagroidis), E. coli, Haemophilus paragallinarum и Ornithobacterium rhinotracheale. Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum. Сепсис, причинен от Pasteurella multocida.
Румъния	CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL 5 Chindiei , sector 4, Bucharest РУМЪНИЯ	Doxyvital 50% WSP	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (пилета и пуйки) (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Прасета	Перорално (вода за пиене)	15 mg доксициклин /kg телесно тегло за 5 последователни дни или 2 g продукт /10 литра вода за пиене и	Домашни птици (пилета и пуйки) 7 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Колибацилоза, хронично респираторно

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								еквивалентно на 100 mg доксициклин /литър вода за пиене	заболяване и микоплазмоза, Clostridium perfringens, хламидиоза, инфекциозен ринит, причинени от Bordetella avium.
Румъния	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	Karidox 100 mg/ml oral solution for use in drinking water for chickens and pigs	Доксициклин хиклат	100 mg/ml доксициклин (като хиклат).	Перорален разтвор	Домашни птици (пилета) (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) прасета	Перорално (вода за пиене)	10—20 mg доксициклин /kg телесно тегло за 3—5 дни.	Домашни птици (пилета) дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Превенция и лечение на хронични респираторни заболявания и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures РУМЪНИЯ	Vidoxim 10% powder for oral solution for pigs and poultry	Доксициклин хиклат	100 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Свине	Перорално (вода за пиене)	1000 g продукт/1000 литра вода за пиене за 5 дни	Домашни птици 10 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Инфекции, причинени от Mycoplasma gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum и Pasteurella multocida
Румъния	S.C. VIM SPECTRUM SRL 409 Sighisoarei Targu Mures РУМЪНИЯ	Vidoxim 100% powder for oral solution for pigs and poultry	Доксициклин хиклат	1 000 mg/g доксициклин хиклат	Водоразтворим прах	Домашни птици (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Свине	Перорално (вода за пиене)	100 g продукт/1000 литра вода за пиене за 5 дни	Домашни птици 10 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Инфекции, причинени от M. gallisepticum, E. coli, Bordetella avium, Haemophilus paragallinarum и P. multocida

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Oridox (Soldoxin) 100 mg/ml oral solution for use in drinking water for chickens and pigs	Доксициклин хиклат	100 mg/ml доксициклин (като хиклат).	Перорален разтвор	Пилета (бройлери) (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени и за човешка консумация) Прасета	Перорално (вода за пиене)	10-20 mg доксициклин /kg телесно тегло за 3—5 дни.	Домашни птици (пилета) 7 дни (не се разрешава за употреба при животни, чиито яйца са за човешка консумация) Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване и микоплазмоза, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Румъния	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за утаяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Не се разрешава употребата при птици носачки, чиито яйца са предназначени за човешка консумация. Показания: Пилета (бройлери) Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване, причинено от Mycoplasma gallisepticum.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	CEVA PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD. 1107 Budapest Szallas u.5 УНГАРИЯ	Doxivit 100	Доксициклин хидрохлорид	100 mg/g доксициклин хидрохлорид	Водоразтворим прах	Домашни птици (пилета, пуйки и гъски) прасета	Перорално (вода за пиене)	10 mg доксициклин хидрохлорид/kg телесно тегло на ден за 5 дни	Домашни птици) 7 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: Хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum , E. Coli), инфекциозен ринит (Haemophilus paragallinarum), холера по птиците (Pasteurella multocida), колибацилоза (E. Coli), аеросакулит (Mycoplasma maleagris), хламидиоза (Chlamidia psittaci), некротичен ентерит (Clostridium perfringens).
Румъния	PHARMATEKA BT 1046 Budapest Szigyarto u. 10 / 20 Kossuth Str. Pusztaberki, 2658 УНГАРИЯ	DOXY H 10%	Доксициклин хидрохлорид	100 mg/g доксициклин хидрохлорид	Водоразтворим прах	Домашни птици	Перорално (вода за пиене)	1 g продукт/1 литър вода за пиене за 3—5 дни	Домашни птици 10 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация)

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Румъния	s.c. romvac company s.a.Şos. Centurii, nr. 7 Voluntari РУМЪНИЯ	Doxiciclina 10%	Доксициклин хидрохлорид	100 mg/g доксициклин хидрохлорид	Водоразтворим прах	Домашни птици, включително гълъби, прасета, говеда (телета)	Перорално (вода за пиене)	2 g продукт/10 kg телесно тегло/ден за 5—8 дни	Домашни птици (пилета) 5 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация)
Румъния	S.C. Crida pharm s.r.l 2 Intrarea Vagonetului Bl. 101, Ap. 47, sector 6 Bucharest РУМЪНИЯ	Doxicol 60%	Доксициклин хидрохлорид	600 mg/g доксициклин хидрохлорид	Водоразтворим прах	Домашни птици прасета	Перорално (вода за пиене или фураж)	бройлери 0—14 дни: 50g/1000 литра вода; бройлери 15—28 дни: 100g/1000 литра вода; бройлери 29—35 дни: 120g/1000 литра вода;	Домашни птици 5 дни (не се разрешава употреба при животни, чиито яйца са предназначени за човешка консумация) Показания: превенция и лечение на колибацилоза, респираторни заболявания, микоплазмоза

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словения	Novartis Veterina d.o.o. Verovškova 57 1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ	DOXYRIL 50%	Доксициклин хиклат	50% (500 mg/g)	Прах за перорален разтвор	прасета, домашни птици	Прасета и домашни птици: веднъж дневно, три до пет последователни дни във водата за пиене	Прасета: 20 mg доксициклин хиклат на 1 kg телесно тегло; Домашни птици 25 mg доксициклин хиклат на 1 kg телесно тегло	Месо и вътрешни органи: домашни птици: 4 дни; Показания: респираторни инфекции (M gallisepticum, M, synoviae в M, melagris), Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum, Ornithobacterium rhinotracheale; Ентерит (Clostridium perfringens и Clostridium colinum; Cencis (Pasteurella multocida)

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	Trei Bio pharmaceutical division, Industria Italiana Integratori Trei Via Affarosa n.4 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia) ИТАЛИЯ	DOXIPAN 20 plv.sol. ad us.vet.	Доксициклин хиклат	20 g/100 g	Водоразтворим прах	Телета, прасета, домашни птици – бройлери, пуйки	За 5 дни във водата за пиене	Домашни птици – бройлери: 5–7,5 g продукт/10 литра вода за пиене Пуйки: 10-20mg активно вещество/тегело съответстващо на 50-100 g продукт/100 литра вода за пиене Телета, прасета: 10 mg активно вещество/тегело/ден съответстващо на 0,5 g продукт/10 kg телесно тегло	Месо: Бройлери 5 дни, пуйки 10 дни, Показания: Бройлери: хронични респираторни заболявания и свързаните с тях инфекции. Пуйки: Инфекции, причинени от грам-положителни и грам-отрицателни микроби, микоплазми, чувствителни към доксициклин, особено респираторен и ставен синдром, причинени от микоплазма и/или стафилококи

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	DIVASA-FARMAVIC, S.A. CTRA. SANT HIPOLIT, KM. 71 08503 GURB – VIC ИСПАНИЯ	DOXIVET 10% plv.sol. a.u.v.	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Водоразтворим прах	Домашни птици: (пилета и пуйки), говеда и свине	За 4—5 дни във водата за пиене	0,5 ml продукт/литър вода за пиене	Месо: 5 дни Показания: Лечение на хронично респираторно заболяване, микоплазмоза, ензоотична пневмония по прасенцата, бронхопневмония, хламидиози, неспецифични диарии.
Словашка република	Novartis Animal Health d.o.o. Verovskava 57 1000 Ljubljana СЛОВЕНИЯ	DOXYRIL 500 mg/g prášok na perorálny roztok ad us.vet.	Доксициклин хиклат	500 mg/g	Водоразтворим прах	Прасета, бройлери	за 3 до 5 последователни дни във водата за пиене	Прасета: 20 mg доксициклин хиклат /kg телесно тегло Бройлери: 25 mg доксициклин хиклат /kg телесно тегло	Ядливи тъкани: Бройлери 4 дни. Показания Лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин, и най-вече: Бройлери: Инфекции на дихателните пътища, причинени от Mycoplasma spp. (M.gallisepticum, M.synoviae и M.meleagridis), Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum и Ornithobacterium rhinotracheale, ентерит, причинен от

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
									Clostridium perfringens и Clostridium colinum, сепсис, причинен от Pasteurella multocida

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	Lavet Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest Ottó u. 14, Унгария	DOXYVIT 40% plv.sol.	Доксициклин хиклат	40 g/100 g	Водоразтворим прах	Домашни птици: (пилета и пуйки) и свине	3—5 дни във водата за пиене, домашни птици, прасета: във водата за пиене, във фуража	Пилета и пуйки: 10-20 mg активен доксициклин хиклат/kg телесно тегло)/ден, продължително лечение: 1 g продукт/3—6 литра вода за пиене, продължително лечение. 25—50 mg продукт/kg телесно тегло(10-20 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло) във водата за пиене	Месо на пилета и пуйки: 4 дни, Показания: Лечение и профилактика на респираторни, интестинални и системни инфекции, причинени от организми, чувствителни към доксициклин. Пилета, пуйки: хронично респираторно заболяване (Mycoplasma gallisepticum, E.coli), аеросакулит (M.meleagridis), инфекциозен синовит (M.synoviae), холера по птиците (P. multocida), бордетелоза по пуйките (Bordetella avium), инфекциозен ринит (Haemophilus paragallinarum), колибацилоза (E.coli), некротичен ентерит (Clostridium prefringens), хламидиоза (CH. psittaci),

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименовани е на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	Tekro, spol. s.r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Чешка република	Meditek DOX 100 plv.sol. ad us.vet.	Доксициклин хиклат	100 g/1000 g	Водоразтворим прах	Бройлери, прасета	3—5 дни във водата за пиене	Бройлери: 10 mg доксициклин хиклат/kg телесно тегло (отговарящо на 1 kg продукт/10 00 литра вода за пиене)	Месо от бройлери и прасета: 7 дни Показания: Лечение и превенция на респираторни и гастроинтестинални заболявания, причинени от организми, чувствителни към доксициклин: бройлери: хронично респираторно заболяване, микоплазмоза, аеросакулит, синовит, пастъорелоза, инфекциозна холера, колибацилоза, хламидиоза, некротичен ентерит

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	Pharmagal s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Словашка република	DOXYGAL plv.sol. ad us.vet.	Доксициклин хиклат	5 g/100 g	Водоразтворим прах	Прасета, домашни птици, телета, зайци	Домашни птици: превенция 5 дни, лечение 3 дни, във водата за пиене Прасета, телета, зайци: 5 дни във водата за пиене, във фуража	Домашни птици: Превенция: 50 mg активно вещество/1 литър вода за пиене (1 g продукт/1 литър вода), лечение: 100 mg активно вещество/1 литър вода (2 g продукт/1 литър вода)	Месо от птици и зайци: 7 дни Показания: Домашни птици: Хронично респираторно заболяване (микоплазмоза), колибацилоза
Словашка република	COOPHAVET Saint Herblon 44150 Ancenis ФРАНЦИЯ	RONAXAN 5 % plv.sol. ad us.vet.	Доксициклин хиклат	5 g/100 g	Водоразтворим прах	Прасета, домашни птици, телета	Превенция 1—3 дни, лечение: 3—5 дни във водата за пиене, във фуража	10 mg активно вещество/kg телесно тегло/ден (1 g продукт/5 kg телесно тегло/ден) Домашни птици: - на възраст под 2 седмици: 1 g	Месо от домашни птици 4 дни Показания: Домашни птици: Превантивно и същинско лечение на респираторни инфекции

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
								продукт/литър вода за пиене/ден, - на възраст над 2 седмици: 2 g/литър вода/ден	
Словашка република	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	KARIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Водоразтворим прах	Пилета (бройлери), прасета	Бройлери: 3—5 дни, Прасета: 5 дни във водата за пиене	Бройлери: 10—20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден, (0,5—1,0 ml продукт/литър вода за пиене),	Месо и вътрешни органи: Пилета (бройлери) 7 дни, Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценз за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Словашка република	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	ORIDOX 100 mg/ml roztok pre podávanie hydine a ošípaným perorálne v pitnej vode	Доксициклин хиклат	100 mg/ml	Водоразтворим прах	Пилета (бройлери), прасета	Бройлери: 3—5 дни, Свини: 5 дни във водата за пиене	Бройлери: 10—20 mg доксициклин/kg телесно тегло/ден, (0,5—1,0 ml продукт/литър вода за пиене),	Месо и вътрешни органи: Пилета (бройлери) 7 дни, Показания Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Обединено кралство	Laboratorios Karizoo S.A Polígono Industrial La Borda Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui Barcelona ИСПАНИЯ	Karidox 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for Chickens and Pigs	Доксициклин хиклат	100 mg/ml доксициклин (като доксициклин хиклат).	Перорален разтвор	Пилета (бройлери) и прасета	Перорално (вода за пиене)	10—20 mg доксициклин/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета (бройлери) 7 дни Показания: ПИЛЕТА (БРОЙЛЕРИ): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
Обединено кралство	CHEMO IBERICA, S.A. Gran Via Carlos III, 98 7 ^a Edificio Trade 08028 Barcelona ИСПАНИЯ	Soldoxin 100mg/ml Oral Solution for use in drinking water for chickens and pigs	Доксициклин хиклат	100 mg/ml доксициклин (като доксициклин хиклат).	Перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета	Перорално (вода за пиене)	10—20 mg доксициклин /kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета (бройлери): 7 дни Показания: ПИЛЕТА (БРОЙЛЕРИ): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване (CRD) и микоплазмоза, причинена от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.
Обединено кралство	Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen БЕЛГИЯ	HydroDoxx 500 mg/g Water Soluble Powder	Доксициклин хиклат	500 mg/g доксициклин хиклат	Прах за перорален разтвор	Пилета (бройлери) и Прасета (за уговяване)	Перорално (вода за пиене)	20 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: Пилета: 6 дни Показания: Пилета (бройлери): Превенция и лечение на хронично респираторно заболяване, причинено от <i>Mycoplasma gallisepticum</i> .

Държава-членка/ЕИП	Заявител/Притежател на лиценза за употреба	Наименование на продукта	Международно непатентовано име	Количество на активната субстанция в дозова единица, в %, за даден обем или маса	Фармацевтична форма	Вид животни	Честота и начин на приложение	Препоръчителна доза	Карентен срок (карентни срокове) Показания
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО	VMD NV, HOGE MAUW 900-2370 Arendonk БЕЛГИЯ	Doxyveto 50 s plus	Доксициклин хиклат	50% т/т доксициклин хиклат	Прах за перорално приложение	Пилета, които не снасят яйца	Перорално (вода за пиене)	25 mg доксициклин (хиклат)/kg x 3—5 дни	Месо и вътрешни органи: 6 дни Показания: Респираторни инфекции, причинени от Mycoplasma spp., E. coli и Haemophilus paragallinarum. Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ОБЩО РЕЗЮМЕ НА НАУЧНАТА ОЦЕНКА ЗА ВОДОРАЗТВОРИМИ ПРАХОВЕ И ПЕРОРАЛНИ РАЗТВОРИ, СЪДЪРЖАЩИ ДОКСИЦИКЛИН ХИКЛАТ, ПОКАЗАН ЗА УПОТРЕБА ПРИ ДОМАШНИ ПТИЦИ (вж. Приложение I)

1. Въведение

Водоразтворимите прахове и перорални разтвори, съдържащи доксициклин хиклат, показан за употреба при домашни птици и предназначени за употреба чрез питейната вода, се използват за лечение на дихателни и гастроинтестинални инфекции, причинени от различни бактериални патогени, чувствителни към доксициклин.

Доксициклин е тетрациклинов дериват с приложения, подобни на тези на тетрациклина. Всички тетрациклини имат широк спектър на действие, който включва грам-положителни и грам-отрицателни бактерии, хламидии, рикетсии, микоплазми и спирохети. В сравнение с други тетрациклини, доксициклин има тенденция към по-голяма активност срещу някои от тези видове. Това е главно бактериостатичен антибиотик и неговият основен механизъм на действие е върху инхибиране синтеза на белтъци.

Обединеното кралство изразява опасения, че разликите в дозировката, дозовия обхват, продължителността на лечение и карентните срокове, установени на територията на Европейския съюз за всички дози на водоразтворимите прахове и перорални разтвори, съдържащи доксициклин хиклат, показани за употреба при домашни птици и предназначени за употреба чрез питейната вода, могат да представляват потенциален сериозен риск за здравето както на животните, така и на човека, и изисква от Комитета да даде своето становище по въпроса.

Процедурата включва 179 ветеринарномедицински продукта, разрешени или в очакване на лиценз в различни държави-членки на Европейския съюз (вж. Приложение I).

2. Обсъждане на наличните данни

От общите данни, представени от заявителите/притежателите на лиценз за употреба, само деветнадесет от отговорите са с пълни досиета, разработени в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО. Девет от отговорите са с общи досиета, разработени в съответствие с член 13 от Директива 2001/82/ЕО. За четири от отговорите предоставената писмена информация не съдържа данни, отнасящи се до въпросите, повдигнати от CVMP. Един от отговорите е получен след посочения краен срок за подаване, поради което не е приет и CVMP извършва оценката си, без да отчита специфичните данни на продукта.

Наличните данни показват, че съответните ветеринарномедицински продукти са разрешени или са в очакване на лицензи чрез различни процедури за издаване на лиценз за употреба (процедури по взаимно признаване или национални процедури) и по различни правни основания (пълно, общо и информизирано съгласие).

Отбелязано е, че някои части на предоставените данни са идентични, но са представени от различни ПРУ.

Само за гореспоменатите деветнадесет отговора, които съдържат пълни досиета, разработени в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2001/82/ЕО, се счита, че са с адекватно качество за целта на предоставяне на отговор на конкретните повдигнати въпроси.

Представените пакети от данни съдържат библиографски данни, налични в публичното пространство, както и собствени данни.

За да подкрепят ефикасността на въпросните продукти, заявителите/притежателите на лиценз за употреба представят общо 11 оригинални собствени проучвания, включително 3 експериментални проучвания за инфекции и 8 клинични полеви проучвания. Всички проучвания с изключение на едно са извършени при пилета бройлери. Въпросното едно проучване е извършено при пуйки.

В проучванията са използвани различни лекарствени форми на продукта, съдържащи, доксициклин хиклат/хидрохлорид в различни концентрации; почти всички включват окислител в състава (обикновено лимонена киселина).

Документацията на оригиналните собствени проучвания е много разнородна и в повечето случаи не съответства на настоящите стандарти. По-специално, информацията за условията на проучванията (анамнеза на мястото на проучването, условията на живот и хранене, цикъл светлина/тъмнина), както и план за лечение (лечение по избор за 24 часа/пулсово лечение) липсва или е много ограничена.

Въз основа на съвместимо проучване съобразно добрата лабораторна практика (GLP) за определяне на еднократна доза при бройлери, изкуствено заразени с *Mycoplasma gallisepticum*, може да се определи терапевтична доза от 20 mg/kg телесно тегло, прилагана в продължение на 5 последователни дни. Представени са седем клинични полеви проучвания при пилета бройлери с респираторни заболявания и потвърдена инфекция с *M. gallisepticum*. Доксициклин хиклат е прилаган при всички проучвания, с изключение на две проучвания при целева доза от 20 mg/kg телесно тегло дневно в продължение на 5 последователни дни. Едно от тези проучвания служи като потвърждаващо доказателство за ефикасността на тази целева доза, въз основа на обективни параметри, като например значителното намаляване на процента животни с патологични лезии и общите резултати за лезиите, характерни за заболяването, както и значително намаление на процента за възстановяване на *M. gallisepticum* след лечението. Не са записани странични ефекти, свързани с лечението. Другите проучвания предоставят показателна подкрепа за целевата доза, тъй като е използвана субективна първоначална крайна точка - клинично подобрене - и тъй като тези проучвания са слабо документирани. В заключение, терапевтична доза от 20 mg/kg телесно тегло, прилагана в продължение на 5 последователни дни, е била потвърдена за лечение на респираторно заболяване, причинено от *M. gallisepticum* при пилета, въз основа на клинично полево проучване при пилета бройлери с респираторно заболяване и потвърдена инфекция от *M. gallisepticum*.

Що се отнася до инфекция с *Pasteurella multocida*, са представени две експериментални проучвания при пилета бройлери, т.е. една публикация (Semjen и сътр., (1998)¹, и едно собствено проучване. Експерименталните условия са сходни при двете проучвания. И двете проучвания показват, че доксициклин в дневна доза от 10 mg/kg телесно тегло за 4 (5) последователни дни е ефективен при лечение на индуцирана остра холера при птици, както е видно от значителното намаляване на смъртността и патологичните лезии, характерни за болестта, а също и от процента на възстановяване на изпитвания щам, в сравнение с инфектираните контроли, които не са лекувани. Доксициклин също така превъзхожда хлортетрациклин, който се използва като положителна контрола. Въпреки това, публикацията не предоставя достатъчно информация, за да се изчисли реалният дозов прием на проучваните животни. В собственото проучване диарията е един от основните клинични симптоми, наблюдаван при инфектирани, нелекувани животни, което не се счита за характерно при *Pasteurellosis*.

¹ Semjen G., Magyar T, Laczay P.: Therapeutic efficacy of doxycycline against experimental *Pasteurella multocida* infection in broiler chickens. Act. Vet. Hung. 46 (1), pp.85-93, 1998

Наблюдавани са леки клинични симптоми и смъртни случаи при лекувани животни в периода след приключване на наблюдението. Независимо от факта, че не е представено клинично полево проучване в подкрепа на получените при експериментални условия резултати, използването на доксициклин за лечение на респираторни инфекции, свързани с *P. Multocida*, изглежда оправдано, като се има предвид високата чувствителност на този патоген към доксициклин (минимална инхибиторна концентрация (MIC) 90 до 2µg/ml).

Що се отнася до инфекции с *Escherichia coli*, са представени три публикации на експериментални моделни проучвания (George et al., 1977²; Goren et al., 1988³, Velkers et al., 2005⁴) и едно проучване за клиничната ефикасност. Проучването, публикувано от Goren et al. (1988)³, е замислено като проучване с титриране на дозата с доксициклин, прилаган в дози от 25-1000 милионни части в питейната вода в продължение на 5 последователни дни. Може да се покаже ясно изразена връзка доза-отговор. В сравнение с инфектирани нелекувани контроли, доксициклин показва ефективност при намаляване на смъртността и патологичните лезии, характерни за *Colibacillosis* (перикардит, аеросакулит и перихепатит), както и на клиничното представяне на пилетата в дозови нива от 400 милионни части (съответстващо на 96 mg/kg телесно тегло) нататък. Най-благоприятни резултати са получени при най-високата изпитвана доза, т.е. 1000 милионни части, съответстващи на 196 mg/kg телесно тегло, в продължение на 5 дни. При тези дозови нива е постигната средна плазмена концентрация на доксициклин от 3,6 µg/ml (измерена на 2-рия ден от лечението). За разлика от това, в проучването на George et al. 1977)² доксициклин доказва своята ефективност при намаляване на смъртността и типичните патологични лезии в доза от 50 милионни части във водата за пиене в продължение на 3 последователни дни, в сравнение с инфектирани нелекувани контроли и се оказва по-ефективен от хлортетрациклин и линкомицин-спектиномицин, използвани като положителни контроли. Въпреки това, статията на George et al. (1977)² не съдържа достатъчно информация (телесно тегло и потребление на вода) за изчисляване на действителния дневен дозов прием за проучваните животни.

В експериментална постановка за изпитване на хомеопатично лекарство за лечение на *Colibacillosis* при пилета бройлери, доксициклин е бил използван за контрола (Velkers et al., 2005)⁴. Прилаган като дневна доза от 250 mg/l вода за пиене в продължение на 5 последователни дни, доксициклин показва ефикасност при превенция на смъртност, като намалява появата на лезиите, причинени от *E. coli*, и потиска техния растеж. Въпреки това, публикацията не включва необходимата информация, за да се получи действителният дневен дозов прием на проучваните животни.

Сравнението на тези проучвания за инфекции, които разглеждат *Colibacillosis*, е проблематично поради значителните разлики в експерименталните условия, като например използването на различни изпитвани щамове и инфекциозни дози, различното време на започване на лечението, както и различията между използваните пилета (възраст, тегло, и порода). Затова от тези проучвания не може да се направи ясно заключение.

² George BA, Fagerberg DJ, Quarles CL, Fenton JM.: Comparison of therapeutic efficacy of doxycycline, chlortetracycline and lincomycin-spectinomycin on *E. coli* infection of young chickens. Poult Sci. 1977 Mar;56(2):452-8.

³ Goren E, de Jong WA, Doornenbal P, Laurensen T.: Therapeutic efficacy of doxycycline hyclate in experimental *Escherichia coli* infection in broilers. Vet Q. 1988 Jan;10(1):48-52.

⁴ Velkers FC, te Loo AJ, Madin F, van Eck JH.: Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers with experimentally induced colibacillosis. Res Vet Sci. 2005 Feb;78(1):77-83.

Едно отворено клинично полево проучване, съвместимо с добрата клинична практика (GCP), е предоставено за пилета бройлери, страдащи от *Colibacillosis*. Доксициклин е прилаган в дневна целева доза 25 mg/kg телесно тегло за 3 дни. Оценката на ефикасността се основава на смъртността, клиничните наблюдения и микробиологията. Резултатите показват, че доксициклин ефективно подобрява клиничните резултати на пилетата и постепенно намалява смъртността. Отбелязани са някои недостатъци на проучването (например липса на контролна група).

Що се отнася до инфекции с *Ornithobacterium rhinotracheale*, е представено едно контролирано проучване, съвместимо с добрата клинична практика, което потвърждава ефикасността при пилета, експериментално заразени с *O. rhinotracheale*. Проучването е проведено на 2 фази, пилотна фаза, определяща оптималната инфекциозна доза, последвана от потвърдителна фаза. Клиничните симптоми, появяващи се след инфекция, почти липсват, дори и при най-високата инфекциозна доза. Въпреки това, данните от пилотната фаза показват, че пилетата с най-висока инфекциозна доза, лекувани с доксициклин в доза от 20 mg/kg дневно в продължение на 4 дни, показват значително намаляване на лезиите по алвеолите, в сравнение с нелекуваните контроли. В потвърдителната фаза както клиничният, така и патологичният отговор на изкуствената инфекция с *O. Rhinotracheale*, са слаби при нелекуваните контроли. Антимикробната ефикасност, както е видно от нивото на възстановяване на *O. Rhinotracheale*, не е потвърдена. Очевидно не са правени опити да се определи действителната доза при пилета. Това е единственото проучване, предоставено в подкрепа на твърдението за *O. rhinotracheale*. В заключение, въз основа на предоставените данни не могат да се потвърдят терапевтичните дози за лечение на респираторни заболявания, причинени от *O. rhinotracheale*.

Предоставените данни за *Chlamydiosis* са неубедителни и затова липсва достатъчно информация в подкрепа на това показание, както при пилета, така и при други целеви видове за понастоящем одобрени продукти, които попадат в обхвата на настоящата процедура на отнасяне.

Представени са три проучвания по отношение на ефикасността на доксициклин при пуйки и гъски. При пуйки доксициклин е прилаган за лечение на респираторни заболявания и аеросакулит, както и на респираторни заболявания, заедно със ставен синдром (*Mycoplasma*, *Staphylococcus*). Гъските са лекувани с доксициклин поради респираторен дистрес (микоплазмоза). Тъй като и трите проучвания са слабо документирани (напр. съответната информация на процедурите за диагностика, микробиология, клинични наблюдения и т.н. липсва), резултатите не могат да се тълкуват правилно.

Липсват или са ограничени клинични данни в подкрепа на други показания (напр. инфекции, причинени от *M. meleagridis*, *M. synoviae*, *Haemophilus paragallinarum*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium colinum*, *Bordetella avium*, и т.н.) при пилета или други целеви видове, които понастоящем са одобрени за продуктите в обхвата на тази процедура.

В заключение, Комитетът счита, че ефикасността на доксициклин при лечение на хронично респираторно заболяване, причинено от *M. gallisepticum*, е достатъчно добре подкрепена от клинично проучване за определяне на дозата и клинични изпитвания съгласно търговските условия на употреба за използване при пилета в доза от 20 mg/kg за 5 последователни дни. Що се отнася до инфекции с *P. multocida*, резултатите от експериментално моделно проучване показват лечебна доза от 10 mg/kg телесно тегло в продължение на 4 или 5 дни, но не е предоставено потвърждение на клиничните данни, получени при търговски условия. Въпреки това, тъй като е показано, че *P. multocida* е чувствителен към доксициклин с MIC₉₀ до 2 µg/ml и е проведен фармакокинетичен/фармакодинамичен анализ, включването на инфекциите с *P. multocida* при показанието за пилета изглежда оправдано.

По отношение на инфекциите с *E. coli* при домашни птици, представените данни не са достатъчни. Не може да се получи терапевтичен дозов режим от двете предоставени експериментални

проучвания при птици, инфектирани с *E. coli*. Също така, резултатите от предоставеното клинично полево проучване при бройлери, страдащи от *Colibacillosis*, лекувани с доксициклин в доза от 25 mg/kg за 3 дни, не са убедителни. Както се вижда от фармакодинамичните данни, щамовете *E. coli* показват много променлива чувствителност спрямо доксициклин със стойности на MIC₉₀ от 2 – 32 µg/ml. Отчетени са последните нива на резистентност на *E. coli*, изолирани от пилета, за Германия в обхват 19,3-37 % (Wallmann et al, 2007)⁵. Може да се спори дали доксициклин може ефективно да се използва за лечение на инфекции с *E. coli* при бройлери, при условие обаче, че чувствителността към доксициклин е потвърдена преди започване на лечението.

Въпреки пропуските в представените проучвания и липсата на данни за някои показания и дозировки, въз основа на добре установена употреба, както и липсата на каквато и да е нова информация във връзка с фармакологичната бдителност, по отношение на липсата на ефикасност, може да се заключи, че настоящите дозировки и показания за продукти, съдържащи доксициклин, могат да се считат за безопасни и ефективни.

Проучванията за намаляване на остатъчните количества, представени от ПРУ, посочват, че статистическият подход⁶, препоръчан от Комитета, е използван за установяване на карентните срокове, когато е възможно. В някои проучвания кинетиката на намаляване на остатъчните количества на доксициклин не е демонстрирана, тъй като остатъчните количества в тъканите са проверени само в един или два момента след прекратяване на приема на лекарството. В тези случаи се прилага алтернативен подход или проучването се смята за потвърждаващо.

Проучванията за остатъчни количества са проведени главно при пилета. Две от проучванията за остатъчни количества са проведени при пуйки. Дневните дози, прилагани на пилета, варират между 10,36 mg/kg телесно тегло, 14,47 mg/kg телесно тегло и 25 mg/kg телесно тегло. Дневна доза доксициклин от приблизително 20 mg/kg телесно тегло е прилагана в осем проучвания. В две проучвания е съобщена концентрацията на крайния продукт в питейната вода, но действителният прием на лекарство от животните по отношение на mg на kg телесно тегло не е уточнен. Продължителността на лечението е пет последователни дни при всички проучвания.

Тъй като впоследствие е установено, че няма нужда от преразглеждане на дозата, карентните срокове за въпросните продукти не се нуждаят от преразглеждане.

3. Оценка на съотношението полза/риск

Като се имат предвид всички данни, представени от заявителите/притежателите на лиценза за употреба, има достатъчно документиран доказателства в подкрепа на приемлива ефикасност на доксициклин хиклат, когато се използва при бройлери, за лечение на респираторни инфекции, свързани с *Mycoplasma gallisepticum*, чувствителни към доксициклин, при дневна доза от 20 mg/kg телесно тегло в продължение на 5 последователни дни. Въпреки това не съществува документирано доказателство за липса на ефикасност при лечение на респираторни инфекции, свързани с *Mycoplasma gallisepticum*, с други от одобрените схеми на дозировка (10-25 mg/kg телесно тегло)

⁵ Wallmann, J.; Schroer, U.; Kaspar, H.: Quantitative resistance level (MIC) of bacterial pathogens (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* sp., *Staphylococcus aureus*) isolated from chickens and turkeys: National Resistance Monitoring by the BVL 2004/2005 (2007) Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.; 120; 452-463

⁶ Бележка за ръководство на CVMP: Подход към хармонизиране на карентните срокове <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>

Използването на доксициклин хиклат за всички предложени показания при пилета, както и използването на доксициклин хиклат при други видове домашни птици, се считат добре установени. Докато данните, представени от заявителите/притежателите на лиценз за употреба, не успяват да осигурят достатъчно документиран доказателства в подкрепа на установените дози за всички други показания и видове, няма нова информация, посочваща нови рискове, свързани с употребата на доксициклин, при домашни птици във връзка с липса на ефикасност. В подадените периодични актуализирани доклади за безопасност за съответните продукти не е съобщена липса на ефикасност за което и да е от предложените показания, за който и да е от целевите видове.

Що се отнася до резистентността, резултатите от скорошно паневропейско проучване на антимикробната чувствителност към антимикробни вещества сред резистентността на заразни и чревни паразитни бактерии, публикувани през 2009 г.⁷, показват висока честота на резистентност за *E. coli*, изолирани от пилета, спрямо тетрациклини.

Ето защо, CVMP препоръчва продуктовата литературата за всички продукти в тази процедура да включва подходящи твърдения за разумна употреба в съответствие с това, което се препоръчва в Ръководството на CVMP за КХП за антимикробни вещества (ЕМЕА/CVMP/SAGAM/383441/2005)⁸ и информация за правилното прилагане.

⁷ De Jong et al.: A pan-European survey of antimicrobial susceptibility towards human-use antimicrobial drugs among zoonotic and commensal enteric bacteria isolated from healthy food producing animals. J. Antimicrob. Chemotherapy 63, 733-744, 2009

⁸ Преработено ръководство на CVMP за КХП за антимикробни продукти (ЕМЕА/CVMP/SAGAM/383441/2005) - <http://www.ema.europa.eu/pdfs/vet/sagam/38344105enfin.pdf>

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА

Като се има предвид, че:

- CVMP счита, че употребата на доксициклин хиклат е добре установена. Не са документирани доказателства, показващи нови рискове, свързани с употребата на доксициклин при домашни птици, във връзка с липсата на ефикасност. В подадените периодични актуализирани доклади за безопасност не е съобщена нито липса на ефикасност, нито някакъв проблем по отношение на резистентността за всяко одобрено показание във всеки одобрен вид. Ето защо, независимо от факта, че липсват документирани доказателства за някои от показателите и целевите видове, които понастоящем са одобрени, общата оценка на съотношението полза/риск остава непроменена за продуктите в обхвата на тази процедура;
- CVMP счита, че скорошното паневропейско проучване на антимикробната чувствителност към антимикробни вещества сред резистентността на зоонотични и патогенни чревни бактерии, публикувана през 2009 г., показва висока честота на резистентност за *E. coli*, изолирани от пилета, спрямо тетрациклини. Следователно, включването на съответните стандартни твърдения за разумна употреба в съответствие с препоръките на насоките на Комитета за КХП на антимикробни вещества и информацията за правилното прилагане на съответните продукти в настоящата процедура се счита за подходящо;

CVMP препоръчва промяна на лиценза за употреба, както и изменения на съответните раздели на Кратката характеристика на продукта, етикета и листовката за употреба да включват като минимум информацията, посочена в Приложение III, за водоразтворими прахове и перорални разтвори, съдържащи доксициклин хиклат, показан за употреба при домашни птици, предназначен за употреба чрез пиене, както е посочено в Приложение I на становището.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ПРОДУКТА**

4.5 Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Поради променливост (време, географско положение) в чувствителността на бактериите към доксициклин, се препоръчват бактериологични проби и изпитване на податливостта на микроорганизми от болни птици в стопанството.

Документирана е висока степен на резистентност на *E. coli*, изолирани от пилета, срещу тетрациклини. Поради това продуктът трябва да се използва за лечение на инфекции, причинени от *E. coli*, само след като е проведено изпитване за чувствителност.

Тъй като може да не се постигне ликвидиране на целевите патогени, лекарствата трябва да бъдат съчетани с добри управленски практики, като например добра хигиена, подходяща вентилация, без препълване с добитък.

4.9 Доза и начин на приложение

Да се прилага във водата за пиене.

<одобрена доза> доксициклин хиклат mg/kg телесно тегло/ден, което съответства на <име на продукта> mg на kg телесно тегло, за ... <продължителност на одобреното лечение> последователни дни.

Въз основа на препоръчителната доза, както и броя и теглото на птиците, които ще бъдат третирани, точното дневно количество <име на продукта> трябва да се изчислява по следната формула:

$$\frac{\text{.....mg [име на продукта] / kg телесно тегло / ден} \times \text{Средно телесно тегло (kg) на птиците, които ще бъдат лекувани}}{\text{Средна дневна консумация на вода (l) за птица}} = \text{.... mg [име на продукта] за l вода за пиене}$$

За да се осигури правилно дозиране, телесното тегло трябва да се определи възможно най-точно.

Поемането на водата, съдържаща лекарство, зависи от клиничното състояние на птиците. С цел да се получи правилната доза, концентрацията в питейната вода може да се коригира.

Препоръчително е използването на подходящо калибрирано оборудване за претегляне при частични опаковки. Дневното количество следва да се добавя към водата за пиене, така че лекарството да бъде прието за 24 часа. Водата за пиене, съдържаща лекарство, трябва да бъде прякно приготвяна на всеки 24 часа. Препоръчително е да се подготви предварително концентриран разтвор - около 100 грама продукт на литър питейна вода - и това количество допълнително да се разрежи до терапевтични концентрации, ако е необходимо. Алтернативно, може да се използва концентриран разтвор в приспособление за смесване на водата и лекарството.

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ЕТИКЕТА**

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

**ИЗМЕНЕНИЯ КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В
СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ НА ЛИСТОВКАТА ЗА УПОТРЕБА**

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Трябва да се следва следният съвет за дозировка:

<одобрена доза> доксициклин хиклат mg/kg телесно тегло/ден, което съответства на <име на продукта> mg на kg телесно тегло, за ... <продължителност на одобреното лечение> последователни дни

Въз основа на препоръчителната доза, както и броя и теглото на птиците, които ще бъдат третирани, точното дневно количество <име на продукта> трябва да се изчислява по следната формула:

$$\frac{\text{.....mg [име на продукта] / kg телесно тегло / ден} \times \text{Средно телесно тегло (kg) на птиците, които ще бъдат лекувани}}{\text{Средна дневна консумация на вода (l) за птица}} = \text{.... mg [име на продукта] за l вода за пиене}$$

За да се осигури правилно дозиране, телесното тегло трябва да се определи възможно най-точно.

Поемането на водата, съдържаща лекарство, зависи от клиничното състояние на птиците. С цел да се получи правилната доза, концентрацията в питейната вода може да се коригира.

Препоръчително е използването на подходящо калибрирано оборудване за претегляне при частични опаковки. Дневното количество следва да се добавя към водата за пиене, така че лекарството да бъде прието за 24 часа. Водата за пиене, съдържаща лекарство, трябва да бъде прясно приготвяна на всеки 24 часа. Препоръчително е да се подготви предварително-концентриран разтвор - около 100 грама продукт на литър питейна вода - и това количество допълнително да се разрежи до терапевтични концентрации, ако е необходимо. Алтернативно, може да се използва концентриран разтвор в приспособление за смесване на водата и лекарството.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Поради променливост (време, географско положение) в чувствителността на бактериите към доксициклин, се препоръчват бактериологични проби и изпитване на податливостта на микроорганизми от болни птици в стопанството.

Документирана е висока степен на резистентност на *E. coli*, изолирани от пилета, срещу тетрациклини. Поради това продуктът трябва да се използва за лечение на инфекции, причинени от *E. coli*, само след като е проведено изпитване за чувствителност.

Тъй като може да не се постигне ликвидиране на целевите патогени, лекарствата трябва да бъдат съчетани с добри управленски практики, като например добра хигиена, подходяща вентилация, липса на препълване с добитък.