

<u>Registrační (EU)</u> <u>Číslo</u>	<u>(Smyslený)</u> <u>název</u>	<u>Síla</u>	<u>Léková forma</u>	<u>Cesta podání</u>	<u>Vnitřní</u> <u>Obal</u>	<u>Obsah</u>	<u>Velikosti balení</u>
EU/1/25/1913/001	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	1 předplněná injekční stříkačka bez jehly
EU/1/25/1913/002	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	1 předplněná injekční stříkačka + 1 jehla
EU/1/25/1913/003	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	1 předplněná injekční stříkačka + 2 jehly
EU/1/25/1913/004	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	10 předplněných injekčních stříkaček bez jehly
EU/1/25/1913/005	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	10 předplněných injekčních stříkaček + 10 jehel
EU/1/25/1913/006	CAPVAXIVE	- ¹	Injekční roztok	Intramuskulární podání	předplněná injekční stříkačka (sklo)	0,5 ml	10 předplněných injekčních stříkaček + 20 jehel

-1

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 3 ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 6A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 7F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 8 ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 9N ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 10A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 11A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 12F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 15A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> z deOAc15B (de-O-acetylovaný sérotyp 15B) ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 16F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 17F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 19A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 20A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 22F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 23A ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 23B ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 24F ¹	4 µg

Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 31 ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 33F ¹	4 µg
Polysacharid bakterie (pneumokoka) <i>Streptococcus pneumoniae</i> sérotypu 35B ¹	4 µg

¹Konjugován s proteinovým nosičem CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ je netoxický mutant difterického toxinu (pocházejícího z bakterie *Corynebacterium diphtheriae* C7) rekombinantně exprimovaný v bakterii *Pseudomonas fluorescens*.

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně 65 µg proteinového nosiče CRM₁₉₇.