

Yaxwer (*denosumab*)

Přehled pro přípravek Yaxwer a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Yaxwer a k čemu se používá?

Yaxwer je léčivý přípravek, který se používá k prevenci kostních komplikací u dospělých s pokročilým nádorovým onemocněním, které se rozšířilo do kostí. Mezi tyto komplikace patří fraktury (zlomeniny kostí), míšní komprese (tlak na míchu způsobený poškozením okolní kosti) nebo kostní potíže vyžadující radioterapii (léčbu ozářením) či chirurgický zákrok.

Přípravek Yaxwer se používá také k léčbě typu nádorového onemocnění kostí zvaného obrovskobuněčný kostní nádor u dospělých a dospívajících, jejichž kosti jsou již plně vyvinuty. Používá se u pacientů, kteří nemohou být léčeni chirurgicky nebo u nichž by chirurgický zákrok pravděpodobně způsobil komplikace.

Přípravek Yaxwer obsahuje léčivou látku denosumab a je to biologický léčivý přípravek. Jedná se o „biologicky podobný léčivý přípravek“, což znamená, že přípravek Yaxwer je velmi podobný jinému biologickému léčivému přípravku („referenčnímu léčivému přípravku“), který je v EU již registrován. Referenčním léčivým přípravkem přípravku Yaxwer je přípravek Xgeva. Více informací o biologicky podobných léčivých přípravcích naleznete [zde](#).

Jak se přípravek Yaxwer používá?

Výdej přípravku Yaxwer je vázán na lékařský předpis. Je k dispozici ve formě injekčního roztoku k podání pod kůži do stehna, břicha nebo horní části paže.

Aby se zabránilo kostním komplikacím u nádorového onemocnění, které se rozšířilo do kostí, podává se tento přípravek jednou za 4 týdny ve formě jednorázové injekce pod kůži. U pacientů s obrovskobuněčným kostním nádorem se přípravek podává injekčně pod kůži jednou týdně po dobu 3 týdnů a poté jednou za 4 týdny.

Během léčby přípravkem Yaxwer by pacienti měli užívat doplňky vápníku a vitamínu D.

Více informací o používání přípravku Yaxwer naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Yaxwer působí?

Léčivá látka v přípravku Yaxwer, denosumab, je monoklonální protilátka, která byla vyvinuta tak, aby rozpoznala bílkovinu zvanou RANKL a navázala se na ni. Tato bílkovina aktivuje osteoklasty, což jsou buňky v těle, které se podílejí na rozpadu kostní tkáně. Vazbou na RANKL a jeho zablokováním snižuje denosumab tvorbu osteoklastů a jejich aktivitu. Snižuje se tak úbytek kostní tkáně a klesá pravděpodobnost výskytu zlomenin a jiných závažných kostních komplikací. RANKL se rovněž podílí na aktivaci buněk podobných osteoklastům v obrovskobuněčném kostním nádoru. Léčba denosumabem tedy těmito buňkám brání v růstu a odbourávání kostí, což umožňuje normální kosti nahradit nádor.

Jaké přínosy přípravku Yaxwer byly prokázány v průběhu studií?

Laboratorní studie porovnávající přípravek Yaxwer s přípravkem Xgeva prokázaly, že léčivá látka v přípravku Yaxwer je z hlediska struktury, čistoty a biologické aktivity velmi podobná léčivé látce v přípravku Xgeva. Studie rovněž prokázaly, že při podávání přípravku Yaxwer se v těle vytváří podobné hladiny léčivé látky jako při podávání přípravku Xgeva.

Kromě toho studie porovnávala účinnost denosumabu v přípravku Yaxwer s účinností jiného léčivého přípravku obsahujícího denosumab u 473 žen po menopauze s osteoporózou (onemocněním, které způsobuje křehkost kostí). Po roce léčby se kostní minerální hustota v páteři (což je ukazatel pevnosti kostí) zvýšila o 4,9 % u žen, kterým byl podáván přípravek Yaxwer, a o 4,6 % u žen, kterým byl podáván jiný léčivý přípravek obsahující denosumab.

Vzhledem k tomu, že denosumab působí u osteoporózy podobným způsobem jako u onemocnění, k jejichž léčbě je přípravek Yaxwer určen, není nutná zvláštní studie účinnosti tohoto přípravku u těchto onemocnění.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Yaxwer?

Byla vyhodnocena bezpečnost přípravku Yaxwer a na základě všech provedených studií jsou nežádoucí účinky tohoto léčivého přípravku považovány za srovnatelné s nežádoucími účinky referenčního léčivého přípravku Xgeva.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Yaxwer je uveden v příbalové informaci.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Yaxwer (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10) jsou hypokalcemie (nízké hladiny vápníku v krvi) a muskuloskeletální bolest (bolest svalů a kostí). Dalšími častými nežádoucími účinky (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou osteonekróza čelisti (poškození kostí v čelisti, které může vést k bolesti, vředům v ústech a uvolňování zubů).

Hypokalcemie se vyskytuje většinou během prvních dvou týdnů po zahájení léčby a může být závažná, avšak lze ji zvládnout pomocí podávání doplňků vápníku a vitamínu D.

Přípravek Yaxwer se nesmí používat u pacientů, kteří mají nezhojené rány po stomatologickém nebo chirurgickém zákroku v ústech, ani u osob se závažnou neléčenou hypokalcemií.

Na základě čeho byl přípravek Yaxwer registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že v souladu s požadavky EU pro biologicky podobné léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Yaxwer má velmi podobnou strukturu, čistotu a biologickou aktivitu jako přípravek Xgeva a v těle je distribuován stejným způsobem. Studie navíc prokázala, že přípravek Yaxwer je u žen s osteoporózou stejně účinný jako jiný léčivý přípravek obsahující denosumab. Denosumab působí podobným způsobem v rámci léčby osteoporózy i v rámci zamýšlených použití přípravku Yaxwer.

Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné k vyvození závěru, že přípravek Yaxwer bude mít ve schválených použitích stejné účinky jako přípravek Xgeva. Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Xgeva přínosy přípravku Yaxwer převyšují zjištěná rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání přípravku Yaxwer?

Společnost, která přípravek Yaxwer dodává na trh, poskytne kartu, pomocí které bude pacienty informovat o riziku osteonekrózy čelisti a instruovat je, že pokud se u nich objeví její příznaky, měli by se obrátit na svého lékaře.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné a účinné používání přípravku Yaxwer, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Yaxwer průběžně sledovány. Podezření na nežádoucí účinky nahlášená v souvislosti s přípravkem Yaxwer jsou pečlivě hodnocena a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Yaxwer

Další informace o přípravku Yaxwer jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese