

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddel-form	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til:	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Paknings-størrelse	Tilbagehol-delsestid
EU/2/96/001/003	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af hydrolytisk glas, type I, i karton	20 ml	1 hætteglas	Nul døgn
EU/2/96/001/004	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af hydrolytisk glas, type I, i karton	50 ml	1 hætteglas	Nul døgn
EU/2/96/001/005	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af hydrolytisk glas, type I, i karton	100 ml	1 hætteglas	Nul døgn

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddel-form	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til:	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Paknings-størrelse	Tilbagehol-delsestid
EU/2/96/001/006	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af PET i karton	20 ml	1 hætteglas	Nul døgn
EU/2/96/001/007	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af PET i karton	50 ml	1 hætteglas	Nul døgn
EU/2/96/001/008	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Pr. dosis af 2 ml: F4ab (K88ab) fimbrie adhæsin: $\geq 9,0 \log_2$ Ab titer ¹ ; F4ac (K88ac) fimbrie adhæsin: $\geq 5,4 \log_2$ Ab titre ¹ ; F5 (K99) fimbrie adhæsin: $\geq 6,8 \log_2$ Ab titre ¹ ; F6 (987P) fimbrie adhæsin: $\geq 7,1 \log_2$ Ab titer ¹ ; LT toksoid $\geq 6,8 \log_2$ Ab titer ¹	Injektionsvæske, suspension	Svin (søer og gylte)	Intramuskulær anvendelse	Hætteglas af PET i karton	100 ml	1 hætteglas	Nul døgn

¹Gennemsnitlig antistof (Ab) opnået efter vaccination af mus med en 1/20 so-dosis