

| <b><u>EU nummer</u></b> | <b><u>Navn</u></b> | <b><u>Styrke</u></b> | <b><u>Lægemiddelform</u></b> | <b><u>Indgivelsesvei</u></b> | <b><u>Emballage</u></b>            | <b><u>Indhold<br/>(Koncentration)</u></b> | <b><u>Pakningsstørrelse</u></b>                                                        |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EU/1/08/463/001         | Relistor           | 12 mg/0,6 ml         | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | hætteglas (glas)                   | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 1 hætteglas                                                                            |
| EU/1/08/463/002         | Relistor           | 12 mg/0,6 ml         | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | hætteglas (glas)                   | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 2 hætteglas + 2 sterile injektionssprøjter + 4 alkoholservietter                       |
| EU/1/08/463/003         | Relistor           | 12 mg/0,6 ml         | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | hætteglas (glas)                   | 0,6ml (20 mg/ml)                          | 7 hætteglas + 7 sterile injektionssprøjter + 14 alkoholservietter                      |
| EU/1/08/463/004         | Relistor           | 8 mg                 | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,4 ml (20 mg/ml)                         | 4 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/005         | Relistor           | 8 mg                 | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,4 ml (20 mg/ml)                         | 7 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/006         | Relistor           | 8 mg                 | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,4 ml (20 mg/ml)                         | 8 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/007         | Relistor           | 8 mg                 | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,4 ml (20 mg/ml)                         | 10 fyldte injektionssprøjter                                                           |
| EU/1/08/463/008         | Relistor           | 12 mg                | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 4 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/009         | Relistor           | 12 mg                | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 7 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/010         | Relistor           | 12 mg                | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 8 fyldte injektionssprøjter                                                            |
| EU/1/08/463/011         | Relistor           | 12 mg                | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | fyldt injektionssp<br>røjte (glas) | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 10 fyldte injektionssprøjter                                                           |
| EU/1/08/463/012         | Relistor           | 12 mg/0,6 ml         | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | Hætteglas (glas)                   | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 2 hætteglas + 2 sterile injektionssprøjter med sikkerhedskanyle + 4 alkoholservietter  |
| EU/1/08/463/013         | Relistor           | 12 mg/0,6 ml         | Injektionsvæske, opløsning   | Subkutan anvendelse          | Hætteglas (glas)                   | 0,6 ml (20 mg/ml)                         | 7 hætteglas + 7 sterile injektionssprøjter med sikkerhedskanyle + 14 alkoholservietter |