



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/162609/2025
EMA/H/C/006437

Yaxwer (*denosumab*)

En oversigt over Yaxwer, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Yaxwer, og hvad anvendes det til?

Yaxwer er et lægemiddel til forebyggelse af knoglekomplikationer hos voksne med fremskreden kræft, der har bredt sig til knoglerne. Disse komplikationer omfatter knoglebrud, sammenfald i rygsøjlen (som følge af beskadigelse af den omgivende knogle) eller knogleproblemer, der kræver strålebehandling eller operation.

Yaxwer anvendes desuden til behandling af kæmpecelletumor, der er en form for knoglekræft hos voksne og unge med fuldt udviklede knogler. Det anvendes hos patienter, der ikke kan behandles med operation, eller hos hvem en operation sandsynligvis vil medføre komplikationer.

Yaxwer indeholder det aktive stof denosumab og er et biologisk lægemiddel. Det er et "biosimilært lægemiddel". Det betyder, at Yaxwer i høj grad svarer til et andet biologisk lægemiddel ("referencelægemidlet"), der allerede er godkendt i EU. Referencelægemidlet for Yaxwer er Xgeva. Der findes mere information om biosimilære lægemidler [her](#).

Hvordan anvendes Yaxwer?

Lægemidlet Yaxwer fås kun på recept. Det fås som en opløsning til injektion under huden i låret, maven eller overarmen.

For at forebygge knoglekomplikationer ved kræft, der har spredt sig til knoglerne, gives lægemidlet én gang hver 4. uge som en enkelt injektion under huden. Hos patienter med kæmpecelletumor i knogler indsprøjtes det under huden én gang ugentligt i 3 uger, og derefter én gang hver 4. uge.

Patienter bør tage calcium- og D-vitamintilskud, mens de er i behandling med Yaxwer.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Yaxwer, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Yaxwer?

Det aktive stof i Yaxwer, denosumab, er et monoklonalt antistof, der er beregnet til at genkende og binde sig til et protein kaldet RANKL. Dette protein aktiverer osteoklaster – celler i kroppen, der spiller en rolle ved nedbrydningen af knoglevæv. Ved at binde sig til og blokere RANKL reducerer denosumab

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



dannelsen af osteoklaster og deres aktivitet. Dette mindsker knogletabet og sandsynligheden for knoglebrud og andre alvorlige knoglekomplikationer. RANKL spiller også en rolle ved aktiveringen af osteoklast-lignende celler ved kæmpecelletumor i knogler. Behandling med denosumab forhindrer dem derfor i at vokse og nedbryde knoglerne, så det normale knoglevæv kan erstatte tumoren.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Yaxwer?

Laboratoriestudier, der sammenlignede Yaxwer med Xgeva, har vist, at det aktive stof i Yaxwer i høj grad svarer til Xgeva med hensyn til struktur, renhed og biologisk aktivitet. Studier har desuden vist, at Yaxwer frembringer den samme mængde af det aktive stof i kroppen som Xgeva.

Desuden sammenlignede et studie virkningen af denosumab i Yaxwer med virkningen af denosumab i et andet lægemiddel hos 473 kvinder med osteoporose (en sygdom, der gør knogler skrøbelige), som har været gennem overgangsalderen. Efter et års behandling steg knoglemineraltætheden i rygsøjlen (et mål for, hvor stærke knoglerne er) med 4,9 % hos kvinder, der fik Yaxwer, og 4,6 % hos dem, der fik det andet denosumab-lægemiddel.

Da denosumab virker på samme måde ved osteoporose og ved de sygdomme, Yaxwer er beregnet til, er der ikke behov for et specifikt studie af virkningen af Vevzio ved disse sygdomme.

Hvilke risici er der forbundet med Yaxwer?

Sikkerheden ved Yaxwer er blevet vurderet, og på grundlag af alle de gennemførte studier anses bivirkningerne ved lægemidlet for at være sammenlignelige med bivirkningerne ved referencelægemidlet Xgeva.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Yaxwer fremgår af indlægssedlen.

De mest almindelige bivirkninger ved Yaxwer (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) omfatter hypokalcæmi (lavt calciumindhold i blodet) og smerter i muskler og knogler. Andre almindelige bivirkninger (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) omfatter osteonekrose i kæben (beskadigelse af kæbeknoglerne, som kan medføre smerter, sår i munden og løse tænder).

Hypokalcæmi forekommer oftest inden for de første 2 uger af behandlingen og kan være alvorlig, men kan håndteres med calcium- og D-vitamintilskud.

Yaxwer må ikke anvendes hos patienter med sår fra tand- eller mundkirurgi, der endnu ikke er helet, eller hos personer med svær, ubehandlet hypokalcæmi.

Hvorfor er Yaxwer godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav til biosimilære lægemidler er påvist, at Yaxwer og Xgevas struktur, renhed og biologiske aktivitet svarer til hinanden, og at de fordeles i kroppen på samme måde. Derudover har et studie vist, at Yaxwer er lige så effektivt som et andet denosumabholdigt lægemiddel hos kvinder med osteoporose. Denosumab virker på samme måde ved behandling af knogleskørhed og ved de tilsluttede anvendelser af Yaxwer.

Disse oplysninger blev anset for tilstrækkelige til at konkludere, at Yaxwer vil have de samme virkninger som Xgeva ved de godkendte anvendelser. Det var derfor agenturets opfattelse, at fordelene ved Yaxwer opvejer de identificerede risici som for Xgeva, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre, at Yaxwer anvendes sikkert og effektivt?

Virksomheden, som markedsfører Yaxwer, vil udlevere et patientkort med information om risikoen for osteonekrose i kæben og en instruks til patienter om at kontakte deres læge, hvis de får symptomer.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre, at Yaxwer anvendes sikkert og effektivt.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende anvendelsen af Yaxwer løbende overvåget. De formodede bivirkninger ved Yaxwer vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at beskytte patienterne.

Øvrig information om Yaxwer

Yderligere information om Yaxwer findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/yaxwer.