

Anhang A

EU-Nummer	Phantasie-bezeichnung	Stärke	Darreichungs-form	Zieltier-arten	Art der Anwendung	Ver-packung	Inhalt	Packungs-größe	Wartezeit
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Injektionslösung	Katzen, Hunde, Rinder und Schweine	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	10 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Injektionslösung	Katzen, Hunde, Rinder und Schweine	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	20 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Injektionslösung	Katzen, Hunde, Rinder und Schweine	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	50 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine, Pferde) Milch: 5 Tage (Rinder)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine, Pferde) Milch: 5 Tage (Rinder)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Injektionslösung	Katzen, Hunde, Rinder und Schweine	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Mehrfachpackung	20 ml	5 Durchstechflaschen	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine)

EU-Nummer	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- arten	Art der Anwendung	Ver- packung	Inhalt	Packungs- größe	Wartezeit
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Injektionslösung	Katzen, Hunde, Rinder und Schweine	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Mehrfach packung	20 ml	10 Durch- stechflaschen	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine)
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung	Mehrfach packung	100 ml	12 Durch- stechflaschen	Essbare Gewebe: 15 Tage (Rinder), 5 Tage (Schweine, Pferde) Milch: 5 Tage (Rinder)