

ANHANG I

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8.

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Jascayd 9 mg Filmtabletten
Jascayd 18 mg Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Jascayd 9 mg Filmtabletten

Jede Filmtablette enthält 9 mg Nerandomilast.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

Jede Filmtablette enthält 81,1 mg Lactose (als Monohydrat).

Jascayd 18 mg Filmtabletten

Jede Filmtablette enthält 18 mg Nerandomilast.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

Jede Filmtablette enthält 162,2 mg Lactose (als Monohydrat).

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette (Tablette)

Jascayd 9 mg Filmtabletten

Hellgelbe, ovale, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „F9“ auf der einen und dem Logo von Boehringer Ingelheim auf der anderen Seite (Tablettenlänge: 9,5 mm, Tablettenbreite: 4,6 mm)

Jascayd 18 mg Filmtabletten

Hellrote, ovale, bikonvexe Filmtablette mit der Prägung „F18“ auf der einen und dem Logo von Boehringer Ingelheim auf der anderen Seite (Tablettenlänge: 12 mm, Tablettenbreite: 5,9 mm)

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Jascayd wird angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis*, IPF).

Jascayd wird angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit progredienter pulmonaler Fibrose (PPF).

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Behandlung sollte von Ärzten eingeleitet werden, die in der Behandlung von Krankheiten, für die Jascayd zugelassen ist, erfahren sind.

Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt 18 mg zweimal täglich in einem ungefähren Abstand von 12 Stunden.

Abhängig von der individuellen Verträglichkeit des Patienten hinsichtlich der Nebenwirkungen Diarrhö oder Gewichtsverlust (siehe Abschnitt 4.4 und Abschnitt 4.8), und abhängig vom erwarteten Nutzen der Behandlung mit Nerandomilast (siehe Abschnitt 5.1), kann die Dosis auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (außer bei Patienten, die gleichzeitig Pirfenidon oder starke oder mäßige Induktoren von Cytochrom P450 3A (CYP3A) anwenden, siehe Abschnitt 4.5). Sobald die Nebenwirkung abgeklungen ist oder ausreichend unter Kontrolle gebracht wurde, kann die Behandlung mit der empfohlenen Dosis von zweimal täglich 18 mg fortgesetzt werden.

Gleichzeitige Anwendung mit starken CYP3A-Inhibitoren

Bei gleichzeitiger Anwendung mit starken CYP3A-Inhibitoren muss die Dosis auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (siehe Abschnitt 4.5).

Gleichzeitige Anwendung mit starken oder mäßigen CYP3A-Induktoren

Bei gleichzeitiger Anwendung mit starken oder mäßigen CYP3A-Induktoren beträgt die empfohlene Dosis 18 mg zweimal täglich und darf nicht auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (siehe Abschnitt 4.5).

Gleichzeitige Anwendung mit Pirfenidon

Die gleichzeitige Anwendung mit Pirfenidon reduzierte die Exposition gegenüber Nerandomilast um ca. 50 % (siehe Abschnitt 4.5). Bei Patienten, die Pirfenidon anwenden, beträgt die empfohlene Dosis 18 mg zweimal täglich; sie darf nicht auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden.

Versäumte Dosis

Wird eine Dosis versäumt, ist die nächste Dosis zum nächsten planmäßigen Zeitpunkt einzunehmen. Der Patient darf keine zusätzliche Dosis einnehmen. Die empfohlene maximale Dosis von 18 mg zweimal täglich darf nicht überschritten werden.

Besondere Patientengruppen

Ältere

Bei älteren Patienten ist keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2).

Nierenfunktionsstörung

Bei Patienten mit leichter, mäßiger oder schwerer Niereninsuffizienz ($\text{eGFR} \geq 15$ und < 90 ml/min, basierend auf der CKD-EPI-Formel) ist keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2).

Die Behandlung von Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz ($\text{eGFR} < 15$ ml/min) wird nicht empfohlen. Die Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit von Nerandomilast wurden bei diesen Patienten nicht untersucht.

Leberfunktionsstörung

Bei Patienten mit leichter (Child-Pugh-Klasse A) oder mäßiger (Child-Pugh-Klasse B) Leberfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2).

Die Behandlung von Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse C) wird nicht empfohlen. Die Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit von Nerandomilast bei diesen Patienten wurden nicht untersucht.

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen ist bisher noch nicht erwiesen.

Es liegen keine Daten vor.

Art der Anwendung

Jascayd ist zum Einnehmen. Die Tabletten sind unzerteilt mit Wasser zu schlucken.

Jascayd kann zu oder unabhängig von einer Mahlzeit eingenommen werden (siehe Abschnitt 5.2).

Alternative Art der Anwendung

Für Patienten, die Schwierigkeiten beim Schlucken der ganzen Tablette haben, kann die Tablette in einem Glas mit etwa 100 ml stillem Trinkwasser bei Raumtemperatur aufgelöst werden. Es dürfen keine anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Die Tablette soll unzerkleinert in Wasser gegeben und etwa 15-20 Minuten lang regelmäßig umgerührt werden, bis sie sich in sehr kleine Stücke aufgelöst hat (die Tablette löst sich nicht vollständig auf). Die entstandene Suspension soll innerhalb von 2 Stunden nach dem Anrühren getrunken werden. Wird die Suspension nicht sofort getrunken, muss sie vor dem Trinken erneut umgerührt werden. Das Glas sollte mit etwa 100 ml Wasser gespült werden; diese Flüssigkeit muss ebenfalls getrunken werden, um die vollständige Einnahme der Dosis sicherzustellen.

4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Diarrhö, Übelkeit und verminderter Appetit

In klinischen Studien wurden Diarrhö, Übelkeit und verminderter Appetit häufig als Nebenwirkungen berichtet (siehe Abschnitt 4.8), insbesondere bei Patienten, die Nerandomilast in Kombination mit Nintedanib oder Pirfenidon erhielten. Bei den meisten Patienten waren diese Nebenwirkungen von leichter bis mäßiger Ausprägung. Die Patienten sollten überwacht und Nebenwirkungen gegebenenfalls mit geeigneten symptomatischen Maßnahmen wie Flüssigkeitszufuhr sowie Antidiarrhoika oder Antiemetika behandelt werden. Eine Reduzierung der Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder Pirfenidon sollte gemäß den Empfehlungen in den jeweiligen Fachinformationen erfolgen. Vorsicht ist geboten bei Patienten, die geschwächt sind, bereits gastrointestinale Symptome aufweisen oder zuvor unter Nintedanib oder Pirfenidon signifikante gastrointestinale Nebenwirkungen erlitten haben. Wenn Patienten mit schwerer oder anhaltender Diarrhö, Übelkeit oder vermindertem Appetit nicht auf eine symptomatische Behandlung, eine Dosisreduktion (siehe Abschnitt 4.2) oder eine Unterbrechung der Behandlung ansprechen, sollte die Behandlung mit Nerandomilast abgebrochen werden.

Gewichtsverlust

Die Behandlung mit Nerandomilast wurde mit einem dosisabhängigen Gewichtsverlust in Verbindung gebracht, insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung von Nintedanib. Das Körpergewicht sollte während der Therapie regelmäßig kontrolliert werden. Wenn ein unerklärlicher Gewichtsverlust fortschreitet oder klinisch bedenklich wird, sollte die Behandlung neu bewertet und eine Dosisreduktion oder ein Abbruch der Behandlung in Betracht gezogen werden. Nerandomilast sollte bei Patienten, die untergewichtig sind oder an Erkrankungen leiden, bei denen ein weiterer Gewichtsverlust medizinisch unerwünscht sein könnte, mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 4.8).

Psychiatrische Erkrankungen

Psychiatrische Erkrankungen können bei Patienten mit IPF und PPF häufig als Komorbidität auftreten. In klinischen Studien mit Nerandomilast wurden über alle Behandlungsgruppen hinweg psychiatrische Ereignisse, darunter auch sehr seltene Fälle von Suizidgedanken und suizidalem Verhalten, berichtet. Es wird eine routinemäßige Überwachung auf psychiatrische Erkrankungen empfohlen.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung

Lactose

Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtablette, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Basierend auf *In-vitro*-Bewertungen wird Nerandomilast hauptsächlich durch CYP3A metabolisiert, und es ist ein Substrat von P-Glykoprotein (P-gp).

Wirkungen anderer Arzneimittel auf Nerandomilast

Starke CYP3A-Inhibitoren

Klinische Auswirkungen:	Unter der Gabe einer Einzeldosis von 6 mg Nerandomilast zusammen mit mehreren Dosen Itraconazol (einem starken dualen Inhibitor von CYP3A und P-gp) an Probanden erhöhte sich die Exposition gegenüber Nerandomilast um das 2,2-Fache hinsichtlich der AUC und um das 1,3-Fache hinsichtlich der C_{max} .
Intervention:	Bei gleichzeitiger Anwendung mit starken CYP3A-Inhibitoren muss die Dosis auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (siehe Abschnitt 4.2).
Beispiele:	Clarithromycin, Itraconazol, Ritonavir

Starke oder mäßige CYP3A-Induktoren

Klinische Auswirkungen:	Bei der gleichzeitigen Verabreichung einer Einzeldosis von 18 mg Nerandomilast zusammen mit Mehrfachdosen von Carbamazepin (einem starken CYP3A-Induktor) an gesunde Probanden verringerte sich die Exposition von Nerandomilast um 51 % hinsichtlich der AUC und um 31 % hinsichtlich der C_{max} . Bei gleichzeitiger Verabreichung einer Einzeldosis von 18 mg Nerandomilast mit Mehrfachdosen von Bosentan (einem mäßigen CYP3A-Induktor) an gesunde Probanden verringerte sich die Exposition von Nerandomilast um 41 % hinsichtlich der AUC und um 15 % hinsichtlich der C_{max} .
Intervention:	Bei gleichzeitiger Anwendung mit starken oder mäßigen CYP3A-Induktoren beträgt die empfohlene Dosis 18 mg zweimal täglich und darf nicht auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (siehe Abschnitt 4.2).
Beispiele:	Carbamazepin, Johanniskraut, Rifampicin, Phenytoin, Bosentan, Metamizol

Pirfenidon

Klinische Auswirkungen:	Die gleichzeitige Anwendung mit Pirfenidon reduzierte die Exposition gegenüber Nerandomilast um ca. 50 %, basierend auf der $C_{trough, ss}$; beobachtet wurde dies in der Phase III-Studie bei Patienten mit IPF. Basierend auf <i>In-vitro</i> -Daten kann Pirfenidon die CYP3A-Aktivität induzieren und zu einer verminderten Nerandomilast-Exposition führen. Bei der gleichzeitigen Anwendung von Nerandomilast mit Pirfenidon bei Patienten mit IPF in dieser Phase III-Studie wurde unter der 9 mg-Dosis keine Wirksamkeit beobachtet, unter der 18 mg-Dosis wurde hingegen eine Reduktion der Abnahme der forcierten Vitalkapazität (FVC) beobachtet (siehe Abschnitt 5.1).
Intervention:	Bei Patienten, die Pirfenidon anwenden, beträgt die empfohlene Dosis 18 mg zweimal täglich; sie darf nicht auf 9 mg zweimal täglich reduziert werden (siehe Abschnitt 4.2).

Nintedanib

Die gleichzeitige Anwendung mit Nintedanib veränderte die Exposition gegenüber Nerandomilast nicht – basierend auf den Talspiegelkonzentrationen im *Steady State*.

Wirkungen von Nerandomilast auf andere Arzneimittel

Bei gleichzeitiger Anwendung mit Nerandomilast wurden keine klinisch relevanten Unterschiede in der Pharmakokinetik der folgenden Wirkstoffe beobachtet: Pirfenidon, Nintedanib und orales Midazolam (CYP3A4-Substrat). Basierend auf den Ergebnissen zur gleichzeitigen Anwendung mit Midazolam ist nicht zu erwarten, dass Nerandomilast die systemische Exposition anderer Arzneimittel, die hauptsächlich über CYP3A metabolisiert werden (z. B. orale Kontrazeptiva), verringert oder erhöht.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Empfängnisverhütung

Laut Erkenntnissen aus tierexperimentellen Studien kann Nerandomilast Fehlgeburten verursachen (siehe nachstehenden Abschnitt „Schwangerschaft“ sowie Abschnitt 5.3).

Frauen im gebärfähigen Alter sollten darauf hingewiesen werden, während der Behandlung eine Schwangerschaft zu vermeiden und zuverlässige Verhütungsmethoden anzuwenden.

Schwangerschaft

Bisher liegen keine Erfahrungen mit der Anwendung von Nerandomilast bei Schwangeren vor. Laut Erkenntnissen aus tierexperimentellen Studien kann Nerandomilast Fehlgeburten verursachen (siehe Abschnitt 5.3).

Frauen im gebärfähigen Alter sollten darauf hingewiesen werden, während der Einnahme von Jascayd eine Schwangerschaft zu vermeiden. Die Anwendung von Jascayd während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wird nicht empfohlen.

Patientinnen sollten darauf hingewiesen werden, ihren Arzt zu informieren, wenn sie während der Therapie mit Jascayd schwanger werden oder eine Schwangerschaft vermuten. Schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter müssen über das mögliche Risiko einer Fehlgeburt aufgeklärt werden.

Stillzeit

Es liegen keine Daten zum Übergang von Nerandomilast in die Muttermilch oder zu dessen Auswirkungen auf das gestillte Kind oder die Milchproduktion vor. Studien an Ratten haben Hinweise auf eine Ausscheidung von Nerandomilast in die Milch gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Ein Risiko für das gestillte Kind kann nicht ausgeschlossen werden. Das Stillen soll während der Behandlung mit Jascayd unterbrochen werden.

Fertilität

Zur Wirkung von Nerandomilast auf die menschliche Fertilität liegen keine Daten vor. Bei männlichen und weiblichen Ratten wurden unter der 4-fachen Humanexposition keine negativen Auswirkungen auf die Fertilität beobachtet (siehe Abschnitt 5.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Jascayd hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Diarrhö und Gewichtsverlust.

Tabellarische Auflistung von Nebenwirkungen

Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit von Nebenwirkungen basierend auf 52-Wochen-Daten aus zwei randomisierten, placebokontrollierten, doppelblinden klinischen Phase III-Studien (FIBRONEER-IPF bei IPF und FIBRONEER-ILD bei PPF) mit zweimal täglicher Gabe von 9 mg oder 18 mg Nerandomilast. Die Nebenwirkungen sind nach MedDRA-Systemorganklasse aufgeführt.

Die Häufigkeiten sind definiert als sehr häufig ($\geq 1/10$), häufig ($\geq 1/100$, $< 1/10$), gelegentlich ($\geq 1/1\,000$, $< 1/100$), selten ($\geq 1/10\,000$, $< 1/1\,000$), sehr selten ($< 1/10\,000$), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Tabelle 1. Nebenwirkungen

Systemorganklasse	Nebenwirkungen	Häufigkeitskategorie	
		IPF ^b	PPF
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	Verminderter Appetit	Häufig	Häufig
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts	Diarrhö ^a	Sehr häufig	Sehr häufig
	Übelkeit	Häufig	Häufig
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen	Rückenschmerzen	Häufig	Häufig
Untersuchungen	Gewichtsverlust ^a	Häufig	Häufig

^a siehe Abschnitt *Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen*

^b Die Häufigkeiten wurden unter Ausschluss der Patienten in der 9 mg-Gruppe berechnet, die gleichzeitig Pirfenidon erhielten, da diese Kombination aufgrund einer klinisch relevanten Arzneimittelwechselwirkung nicht empfohlen wird (siehe Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.5).

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen

Diarrhö

Bei den meisten mit Nerandomilast behandelten Patienten war die Diarrhö von leichtem bis mäßigem Schweregrad und trat im Allgemeinen innerhalb der ersten 3 Monate der Behandlung auf.

Die meisten Fälle wurden durch eine symptomatische Therapie mit Antidiarrhoika und gegebenenfalls durch eine Reduzierung der Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder Pirfenidon behandelt.

Über schwere Diarrhö wurde häufiger bei Patienten berichtet, die Nerandomilast in Kombination mit Nintedanib erhielten.

Die Häufigkeit von Diarrhö hing vom Vorliegen und der Art der Hintergrundtherapie ab (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2. Häufigkeit von Diarrhö nach Untergruppen der Hintergrundtherapie über einen Zeitraum von 52 Wochen in der Studie FIBRONEER-IPF (Patienten mit IPF) und in der Studie FIBRONEER-ILD (Patienten mit PPF)

	IPF (FIBRONEER-IPF)			PPF (FIBRONEER-ILD)		
	Placebo	Nerandomilast 9 mg BID	Nerandomilast 18 mg BID	Placebo	Nerandomilast 9 mg BID	Nerandomilast 18 mg BID
Keine Hintergrundtherapie	8 %	17 %	26 %	16 %	15 %	27 %
Nintedanib-Hintergrundtherapie	27 %	49 %	62 %	36 %	48 %	49 %
Pirfenidon-Hintergrundtherapie	8 %	n.a. ^a	23 %	n.a. ^b	n.a. ^b	n.a. ^b

^a Nicht zutreffend, da Nerandomilast 9 mg zweimal täglich für Patienten, die Pirfenidon erhalten, nicht empfohlen wird.

^b Nicht zutreffend, da Pirfenidon in FIBRONEER-ILD nicht als Hintergrundtherapie zugelassen war.
BID = zweimal täglich

IPF

Bei den Patienten, die im Rahmen der Studie FIBRONEER-IPF ohne IPF-Hintergrundtherapie behandelt wurden, trat keine schwere Diarrhö auf; mit Nintedanib-Hintergrundtherapie wurde sie bei 5 % der Patienten unter 18 mg, bei 2 % unter 9 mg und bei < 1 % unter Placebo berichtet.

Diarrhö war die häufigste Nebenwirkung, die mit einem Abbruch der Behandlung in Verbindung stand, und sie trat am häufigsten bei gleichzeitiger Hintergrundtherapie mit Nintedanib auf. Ohne Nintedanib-Hintergrundtherapie traten Behandlungsabbrüche bei 1 % der Patienten unter 18 mg auf

und wurden unter 9 mg oder Placebo nicht berichtet; bei Hintergrundtherapie mit Nintedanib traten sie bei 13 % unter 18 mg, bei 2 % unter 9 mg und bei 1 % unter Placebo auf; bei Hintergrundtherapie mit Pirfenidon wurden unter 18 mg oder Placebo keine Behandlungsabbrüche berichtet.

PPF

Bei den Patienten, die im Rahmen der Studie FIBRONEER-ILD behandelt wurden, wurde ohne Hintergrundtherapie mit Nintedanib keine schwere Diarrhö berichtet; mit Nintedanib-Hintergrundtherapie wurde sie bei 2 % der Patienten unter 18 mg, bei 1 % unter 9 mg und bei < 1 % unter Placebo berichtet.

Diarrhö war die häufigste Nebenwirkung, die mit einem Abbruch der Behandlung in Verbindung stand, und sie trat am häufigsten bei gleichzeitiger Hintergrundtherapie mit Nintedanib auf. Ohne Nintedanib-Hintergrundtherapie traten Behandlungsabbrüche bei 1 % der Patienten unter 18 mg auf und wurden unter 9 mg oder Placebo nicht berichtet; bei Hintergrundtherapie mit Nintedanib traten sie bei 4 % unter 18 mg, bei 3 % unter 9 mg und bei 1 % unter Placebo auf.

Gewichtsverlust

In klinischen Studien setzte der Gewichtsverlust nach der zweiten Behandlungswoche ein und stabilisierte sich nach 12 Wochen Behandlung.

IPF

In der Studie FIBRONEER-IPF betrug die mittlere absolute Veränderung des Körpergewichts vom Ausgangswert bis Woche 52 -2,6 kg bei Patienten, die mit Nerandomilast 18 mg behandelt wurden, -2,4 kg bei Patienten, die mit Nerandomilast 9 mg behandelt wurden und -1,8 kg bei Patienten, die Placebo erhielten.

Die Häufigkeit von Gewichtsverlust hing vom Vorliegen und der Art der IPF-Hintergrundtherapie ab: ohne IPF-Hintergrundtherapie betrug sie 7 % unter 18 mg, 1 % unter 9 mg und 6 % unter Placebo; mit Nintedanib-Hintergrundtherapie betrug sie 16 % unter 18 mg, 13 % unter 9 mg und 11 % unter Placebo; mit Pirfenidon-Hintergrundtherapie betrug sie 5 % sowohl unter 18 mg als auch unter Placebo.

PPF

In der Studie FIBRONEER-ILD betrug die mittlere absolute Veränderung des Körpergewichts vom Ausgangswert bis Woche 52 -3,2 kg bei Patienten, die mit Nerandomilast 18 mg behandelt wurden, -2,0 kg bei Patienten, die mit Nerandomilast 9 mg behandelt wurden, und -2,0 kg bei Patienten, die Placebo erhielten.

Die Häufigkeit von Gewichtsverlust hing vom Vorliegen der Nintedanib-Hintergrundtherapie ab: ohne Nintedanib-Hintergrundtherapie betrug sie 10 % unter 18 mg, 5 % unter 9 mg und 4 % unter Placebo; mit Nintedanib-Hintergrundtherapie betrug sie 11 % unter 18 mg, 9 % unter 9 mg und 8 % unter Placebo.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das in [Anhang V](#) aufgeführte nationale Meldesystem anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Symptome

In klinischen Studien wurden Einzeldosen von bis zu 48 mg Nerandomilast an Probanden untersucht, ohne dass dosislimitierende Toxizität auftrat. Fälle versehentlicher Überdosierung wurden bei Patienten berichtet, die Dosen von bis zu 72 mg/Tag über einen Zeitraum von bis zu 17 Tagen erhielten.

Die beobachteten Nebenwirkungen entsprachen dem bekannten Sicherheitsprofil von Nerandomilast.

Therapie

Im Falle einer Überdosierung wird empfohlen, den Patienten auf Anzeichen oder Symptome von Nebenwirkungen zu überwachen und eine angemessene symptomatische Behandlung einzuleiten.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Selektive Immunsuppressiva, ATC-Code: L04AA61

Wirkmechanismus

Nerandomilast ist ein selektiver Inhibitor der Phosphodiesterase 4 (PDE4) mit einer Präferenz für die Hemmung des Isoenzyms PDE4B gegenüber PDE4A, C und D. *In-vitro*-Daten zeigen eine 9-fache Selektivität gegenüber PDE4D, eine 24-fache Selektivität gegenüber PDE4A und eine 870-fache Selektivität gegenüber PDE4C. Bei den empfohlenen Dosen ist mit einer Hemmung von PDE4B und einer geringeren Hemmung von PDE4D zu rechnen. PDE4 hydrolysiert und inaktiviert zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP). Nerandomilast wirkt sowohl antifibrotisch als auch immunmodulatorisch, da die bevorzugte Inhibition von PDE4B den intrazellulären cAMP-Spiegel erhöht und die Expression profibrotischer Wachstumsfaktoren und entzündungsfördernder Zytokine reduziert, die bei fibrotischen Lungenerkrankungen überexprimiert sind.

Pharmakodynamische Wirkungen

Kardiale Elektrophysiologie

Bei Einzeldosen von Nerandomilast von bis zu 48 mg (das 2,2-Fache der geschätzten $C_{\max, ss}$ unter der maximal empfohlenen Humandosis) wurde keine klinisch signifikante QTc-Intervallverlängerung beobachtet.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Idiopathische Lungenfibrose (IPF)

In einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie (FIBRONEER-IPF) wurden die klinische Wirksamkeit und Sicherheit von Nerandomilast bei erwachsenen Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) mit und ohne Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder Pirfenidon untersucht. Bei den Patienten mussten eine forcierte Vitalkapazität (*Forced Vital Capacity*, FVC) von mindestens 45 % des Sollwerts und eine Diffusionskapazität der Lunge für Kohlenmonoxid (*Diffusing Capacity of the Lungs for Carbon Monoxide*, DLCO) von mindestens 25 % des für Hämoglobin (Hb) korrigierten Sollwerts vorliegen. 1 177 Patienten wurden im Verhältnis 1:1:1 randomisiert und erhielten über mindestens 52 Wochen entweder zweimal täglich Nerandomilast 9 mg, zweimal täglich Nerandomilast 18 mg oder zweimal täglich Placebo. Die Randomisierung erfolgte stratifiziert nach dem Vorliegen bzw. Fehlen einer Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder Pirfenidon zu

Studienbeginn. Der primäre Endpunkt der Studie war die absolute Veränderung der FVC in ml nach 52 Wochen im Vergleich zu Placebo. Der wichtigste sekundäre Endpunkt war die Zeit bis zum ersten Auftreten einer der Komponenten des kombinierten Endpunkts: erste akute IPF-Exazerbation, erste Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod während der Studiendauer. Die Patienten wurden zum Zeitpunkt der Hauptanalyse im Median 14,6 Monate und zum Zeitpunkt der Analyse zum Studienende im Median 17,0 Monate nachbeobachtet.

Die Studienpopulation bestand zu 83 % aus Männern und zu 17 % aus Frauen mit einem durchschnittlichen Alter von 70 Jahren (Spanne: 42 bis 90 Jahre). 31 % der Patienten waren mindestens 75 Jahre alt. 68 % der Studienpopulation waren kaukasischer, 32 % asiatischer und 0,5 % afrikanischer/afroamerikanischer Herkunft. Bei 3 % der Patienten wurde zu Studienbeginn eine pulmonale Hypertonie festgestellt. 78 % der Patienten befanden sich in stabiler Behandlung mit Nintedanib (46 %) oder Pirfenidon (32 %), während 22 % keine dieser Therapien erhielten (15 % der Patienten waren therapienaiv und 8 % hatten die Behandlung mit Nintedanib oder Pirfenidon zuvor abgebrochen). Die mittlere FVC betrug zu Studienbeginn 2 843 ml und entsprach 78 % des Sollwerts. Patienten, die eine Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder Pirfenidon erhielten, wiesen zu Studienbeginn ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium auf als Patienten ohne Hintergrundtherapie, was sich in einem niedrigeren mittleren FVC-Prozentsatz des Sollwerts (77 % gegenüber 82 %), einem niedrigeren mittleren DLCO-Prozentsatz des Sollwerts (50 % gegenüber 55 %), einer längeren mittleren Zeit seit der Erstdiagnose (3,7 Jahre gegenüber 2,8 Jahre) und einer häufigeren Nutzung von Sauerstofftherapien (23 % gegenüber 16 %) äußerte.


Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert

Insgesamt zeigte sich im primären Endpunkt, der absoluten Veränderung der FVC (in ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen, bei Patienten unter Nerandomilast im Vergleich zu Patienten unter Placebo eine statistisch signifikante Verbesserung. Der adjustierte mittlere Rückgang betrug bei Patienten, die zweimal täglich 18 mg bzw. 9 mg Nerandomilast erhielten, -115 ml bzw. -139 ml, während in der Placebogruppe ein adjustierter mittlerer Rückgang von -183 ml beobachtet wurde. Der jeweilige Behandlungsunterschied im Vergleich zur Placebogruppe betrug 69 ml (95 % KI: 30-107; $p = 0,0005$) bzw. 45 ml (95 % KI: 6-83; $p = 0,0222$).

Bei Patienten, die Pirfenidon als Hintergrundtherapie gegen IPF erhielten, wurde eine Arzneimittelwechselwirkung beobachtet (siehe Abschnitt 4.5). Bei diesen Patienten zeigte die zweimal tägliche Anwendung von 9 mg Nerandomilast keine Wirkung.

Die Ergebnisse für den primären Endpunkt in der Gesamtpopulation und nach IPF-Hintergrundtherapie für die Nerandomilast-Dosen von 18 mg und 9 mg im Vergleich zu entsprechendem Placebo sind in Abbildung 1 bzw. Abbildung 2 dargestellt.


Abbildung 1. Absolute Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen in der Studie FIBRONEER-IPF bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo



Bei Patienten, die vor Woche 52 verstarben, wurde die Veränderung im 10. Perzentil gegenüber dem Ausgangswert angenommen.

BID = zweimal täglich

Abbildung 2. Absolute Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen in der Studie FIBRONEER-IPF bei Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo




Bei Patienten, die vor Woche 52 verstarben, wurde die Veränderung im 10. Perzentil gegenüber dem Ausgangswert angenommen.

BID = zweimal täglich

Abbildung 3 zeigt die Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert im Zeitverlauf bei Patienten, die zweimal täglich Nerandomilast 18 mg erhielten, im Vergleich zu einem entsprechenden Placebo. Die Kurven für die mittlere adjustierte Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert trennten sich ab Woche 2 und divergierten bis Woche 52 und darüber hinaus weiter. Dieser Effekt wurde in allen Subgruppen mit unterschiedlichen IPF-Hintergrundtherapien konsistent beobachtet.

Abbildung 3. Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert im Zeitverlauf bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo in der Studie FIBRONEER-IPF



Anzahl der Patienten

Placebo	393	378	383	374	367	356	339	333	324	308	213
Nerandomilast 18 mg BID	392	382	384	374	376	359	352	332	342	313	218


BID = zweimal täglich

Zeit bis zur ersten akuten IPF-Exazerbation, ersten Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod

Der wichtigste sekundäre kombinierte Endpunkt war die Zeit bis zum ersten Auftreten einer akuten IPF-Exazerbation, einer Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder des Todes während der Studiendauer. Eine akute IPF-Exazerbation war definiert als akute Verschlechterung oder Entwicklung von Dyspnoe, die typischerweise weniger als 1 Monat andauerte, neu aufgetretene beidseitige Milchglstrübung und/oder Konsolidierungen vor einem mit IPF vereinbaren Hintergrundmuster in der Computertomographie sowie eine Verschlechterung, die nicht vollständig durch Herzinsuffizienz oder Flüssigkeitsüberladung erklärt werden konnte. Weder akute IPF-Exazerbationen noch Hospitalisierungen aufgrund einer respiratorischen Ursache wurden adjudiziert. Insgesamt ergab sich kein statistisch signifikanter Behandlungsunterschied bei den Gruppen mit Nerandomilast 18 mg bzw. 9 mg im Vergleich zu Placebo hinsichtlich des wichtigsten sekundären kombinierten Endpunkts. Zum Zeitpunkt der Hauptanalyse traten Ereignisse des wichtigsten sekundären Endpunkts bei 85 Patienten (22 %) in der 18 mg-Gruppe, bei 79 Patienten (20 %) in der 9 mg-Gruppe und bei 80 Patienten (20 %) in der Placebogruppe auf. Im Vergleich zu Placebo betrug die *Hazard Ratio* (HR) für die Zeit bis zum ersten Ereignis 1,17 (95 % KI: 0,86-1,59; $p = 0,3102$) für die 18 mg-Dosis und 1,03 (95 % KI: 0,75-1,41; $p = 0,8568$) für die 9 mg-Dosis.


Abbildung 4 und Abbildung 5 zeigen die Ergebnisse von Nerandomilast 18 mg und 9 mg im Vergleich zu Placebo für den wichtigsten sekundären Endpunkt und dessen Komponenten über die Dauer der FIBRONEER-IPF-Studie zum Zeitpunkt der Analyse zum Studienende.

Abbildung 4. Akute IPF-Exazerbation, Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-IPF



BID = zweimal täglich

Abbildung 5. Akute IPF-Exazerbation, Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod bei Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-IPF




Es werden Ergebnisse für die Gesamtpopulation gezeigt, die zweimal täglich 9 mg Nerandomilast im Vergleich zu einem entsprechenden Placebo erhielt.

BID = zweimal täglich

In der Analyse zum Studienende gab es 26 Todesfälle (7 %) in der 18 mg-Gruppe, 36 Todesfälle (9 %) in der 9 mg-Gruppe und 42 Todesfälle (11 %) in der Placebogruppe. Im Vergleich zu Placebo betrug die *Hazard Ratio* für die Zeit bis zum Tod 0,66 (95 % KI: 0,41-1,08) für die 18 mg-Dosis und 0,95 (95 % KI: 0,61-1,49) für die 9 mg-Dosis.


Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen die Analyse der Zeit bis zum Tod über die gesamte Studiendauer (Analyse zum Studienende) in den Nerandomilast-Dosisgruppen von 18 mg bzw. 9 mg im Vergleich zum entsprechenden Placebo für die nach Hintergrundtherapie unterteilten Subgruppen.

Abbildung 6. Zeit bis zum Tod unter Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-IPF



BID = zweimal täglich

Abbildung 7. Zeit bis zum Tod unter Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-IPF



Es werden Ergebnisse für die Gesamtpopulation gezeigt, die zweimal täglich 9 mg Nerandomilast im Vergleich zu einem entsprechenden Placebo erhielt.

BID = zweimal täglich

Progredivente pulmonale Fibrose (PPF)

In einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie (FIBRONEER-ILD) wurden die klinische Wirksamkeit und Sicherheit von Nerandomilast bei erwachsenen Patienten mit PPF untersucht. Patienten mit PPF wurden ausgewählt, wenn sich bei ihnen eine relevante Fibrose (mehr als 10 % fibrotische Merkmale) in der hochauflösenden Computertomographie (*High Resolution Computed Tomography*, HRCT) darstellte und sie klinische Anzeichen einer Progression zeigten (definiert als Abnahme der forcierten Vitalkapazität [*Forced Vital Capacity*, FVC] von mindestens 10 %, FVC-Abnahme von mindestens 5 % und weniger als 10 % mit Verschlechterung der Atemwegsbeschwerden oder der Bildgebung oder Verschlechterung der Atemwegsbeschwerden und der Bildgebung, alles innerhalb der 24 Monate vor dem Screening). Bei den Patienten mussten eine forcierte Vitalkapazität (*Forced Vital Capacity*, FVC) von mindestens 45 % des Sollwerts und eine Diffusionskapazität der Lunge für Kohlenmonoxid (*Diffusing Capacity of the Lungs for Carbon Monoxide*, DLCO) von mindestens 25 % des für Hämoglobin (Hb) korrigierten Sollwerts vorliegen. Geeignete Patienten erhielten eine stabile Hintergrundtherapie mit Nintedanib oder nicht.

1 178 Patienten wurden im Verhältnis 1:1:1 randomisiert und erhielten mindestens über einen Zeitraum von 52 Wochen zweimal täglich Nerandomilast 9 mg, zweimal täglich Nerandomilast 18 mg oder zweimal täglich Placebo. Die Randomisierung erfolgte stratifiziert nach Vorliegen oder Fehlen einer Hintergrundtherapie mit Nintedanib und nach dem Muster der hochauflösenden Computertomographie (HRCT) (*usual interstitial pneumonia* [UIP] oder UIP-ähnliches fibrotisches Muster gegenüber anderen fibrotischen Mustern) unter Verwendung einer zentralen Überprüfung.

Der primäre Endpunkt der Studie war die absolute Veränderung der FVC in ml nach 52 Wochen gegenüber dem Ausgangswert im Vergleich zu Placebo. Der wichtigste sekundäre Endpunkt war die Zeit bis zum ersten Auftreten einer der Komponenten des kombinierten Endpunkts: die erste akute

Exazerbation der interstitiellen Lungenerkrankung (*Interstitial Lung Disease*, ILD), die erste Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder der Tod während der Studiendauer. Die Patienten wurden zum Zeitpunkt der Hauptanalyse im Median 15,4 Monate und zum Zeitpunkt der Analyse zum Studienende im Median 17,2 Monate nachbeobachtet.

Die Studienpopulation bestand zu 56 % aus Männern und zu 44 % aus Frauen mit einem durchschnittlichen Alter von 66 Jahren (Spanne: 26 bis 88 Jahre). 20 % der Patienten waren mindestens 75 Jahre alt. 58 % der Studienpopulation waren kaukasischer, 39 % asiatischer und 1 % afrikanischer/afroamerikanischer Herkunft. Bei 5 % der Patienten wurde zu Studienbeginn eine pulmonale Hypertonie festgestellt.

44 % der Patienten befanden sich in stabiler Behandlung mit Nintedanib und 56 % waren nicht unter Nintedanib-Behandlung (44 % der Patienten waren therapienaiv und 12 % hatten die Behandlung mit Nintedanib zuvor abgebrochen). Bei der HRCT-Untersuchung zu Studienbeginn wiesen 71 % der Patienten ein UIP- oder UIP-ähnliches fibrotisches Muster auf, während bei 29 % der Patienten andere fibrotische Muster festgestellt wurden. Die zugrunde liegenden klinischen ILD-Diagnosen waren autoimmune ILD (28 %), Hypersensitivitätspneumonitis (20 %), nicht klassifizierbare idiopathische interstitielle Pneumonie (20 %), idiopathische unspezifische interstitielle Pneumonie (19 %) und andere ILD (14 %). Die mittlere FVC betrug zu Studienbeginn 2 353 ml und entsprach 70 % des Sollwerts. Patienten, die eine Hintergrundtherapie mit Nintedanib erhielten, wiesen zu Studienbeginn ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium auf als Patienten ohne Hintergrundtherapie, was sich in einem geringfügig niedrigeren mittleren FVC-Prozentsatz des Sollwerts (69 % gegenüber 71 %), einem niedrigeren mittleren DLCO-Prozentsatz des Sollwerts (45 % gegenüber 52 %), einer geringfügig längeren mittleren Zeit seit der ILD-Erstdiagnose (4,4 Jahre gegenüber 4,0 Jahre) und einer häufigeren Nutzung von Sauerstofftherapien (38 % gegenüber 19 %) äußerte.


Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert

Insgesamt zeigte sich im primären Endpunkt, der absoluten Veränderung der FVC (in ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen, bei Patienten unter Nerandomilast im Vergleich zu Patienten unter Placebo eine statistisch signifikante Verbesserung.

Der adjustierte mittlere Rückgang betrug bei Patienten, die zweimal täglich 18 mg bzw. 9 mg Nerandomilast erhielten, -99 ml bzw. -85 ml, während in der Placebogruppe ein adjustierter mittlerer Rückgang von -166 ml beobachtet wurde. Der jeweilige Behandlungsunterschied im Vergleich zur Placebogruppe betrug 67 ml (95 % KI: 32-102; $p = 0,0002$) bzw. 81 ml (95 % KI: 46-116; $p < 0,0001$).


Die Primäranalyse war in allen vordefinierten Subgruppen hinsichtlich des Vorhandenseins oder Fehlens einer Nintedanib-Hintergrundtherapie, des HRCT-Musters und der zugrunde liegenden klinischen ILD-Diagnosen konsistent. Siehe Abbildung 8 und Abbildung 9.

Abbildung 8. Absolute Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen in der Studie FIBRONEER-ILD bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo



Bei Patienten, die vor Woche 52 verstarben, wurde die Veränderung im 10. Perzentil gegenüber dem Ausgangswert angenommen.
 BID = zweimal täglich


Abbildung 9. Absolute Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert nach 52 Wochen in der Studie FIBRONEER-ILD bei Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo



Bei Patienten, die vor Woche 52 verstarben, wurde die Veränderung im 10. Perzentil gegenüber dem Ausgangswert angenommen.
 BID = zweimal täglich

Abbildung 10 zeigt die Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert im Zeitverlauf bei Patienten, die zweimal täglich Nerandomilast 18 mg erhielten, im Vergleich zu einem entsprechenden Placebo. Die Kurven für die mittlere adjustierte Veränderung der FVC gegenüber dem Ausgangswert trennten sich ab Woche 2 und divergierten bis Woche 52 und darüber hinaus weiter. Dieser Effekt war unabhängig von der Nintedanib-Hintergrundtherapie konsistent.

Abbildung 10. Veränderung der FVC (ml) gegenüber dem Ausgangswert bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo im Zeitverlauf in der Studie FIBRONEER-ILD



Anzahl der Patienten

Placebo	392	378	374	369	358	355	337	326	327	293	202
Nerandomilast 18 mg BID	391	379	380	364	349	338	330	321	324	292	205

BID = zweimal täglich


Zeit bis zur ersten akuten ILD-Exazerbation, ersten Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod

Der wichtigste sekundäre kombinierte Endpunkt war die Zeit bis zum ersten Auftreten einer akuten ILD-Exazerbation, einer Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder bis zum Tod während der Studiendauer. Eine akute ILD-Exazerbation war definiert als akute Verschlechterung oder Entwicklung von Dyspnoe, die typischerweise weniger als 1 Monat andauerte, neu aufgetretene beidseitige Milchglstrübung und/oder Konsolidierungen vor einem mit fibrosierender ILD vereinbaren Hintergrundmuster in der Computertomographie sowie eine Verschlechterung, die nicht vollständig durch Herzinsuffizienz oder Flüssigkeitsüberladung erklärt werden konnte. Weder akute ILD-Exazerbationen noch Hospitalisierungen aufgrund einer respiratorischen Ursache wurden adjudiziert.

Das Risiko für den wichtigsten sekundären Endpunkt war für beide Nerandomilast-Dosisgruppen im Vergleich zu Placebo numerisch geringer. Zum Zeitpunkt der Hauptanalyse traten Ereignisse des wichtigsten sekundären Endpunkts bei 95 Patienten (24 %) in der 18 mg-Gruppe, bei 110 Patienten (28 %) in der 9 mg-Gruppe und bei 122 Patienten (31 %) in der Placebogruppe auf. Im Vergleich zu Placebo betrug die *Hazard Ratio* für die Zeit bis zum ersten Ereignis 0,77 (95 % KI: 0,59-1,01; $p = 0,0602$) für die 18 mg-Dosis und 0,88 (95 % KI: 0,68-1,14; $p = 0,3398$) für die 9 mg-Dosis.


Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen die Ergebnisse von Nerandomilast 18 mg bzw. 9 mg im Vergleich zu Placebo für den wichtigsten sekundären Endpunkt und dessen Komponenten über die Dauer der FIBRONEER-ILD-Studie zum Zeitpunkt der Analyse zum Studienende.

Abbildung 11. Akute ILD-Exazerbation, Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod bei Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-ILD



BID = zweimal täglich

Abbildung 12. Akute ILD-Exazerbation, Hospitalisierung aufgrund einer respiratorischen Ursache oder Tod bei Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-ILD




BID = zweimal täglich

Die Ergebnisse des wichtigsten sekundären Endpunkts waren unabhängig von einer Nintedanib-Hintergrundtherapie oder dem HRCT-Muster im Allgemeinen konsistent.

In der Analyse zum Studienende gab es 34 Todesfälle (9 %) in der 18 mg-Gruppe, 36 Todesfälle (9 %) in der 9 mg-Gruppe und 64 Todesfälle (16 %) in der Placebogruppe. Im Vergleich zu Placebo betrug die *Hazard Ratio* für die Zeit bis zum Tod 0,51 (95 % KI: 0,34-0,78) für die 18 mg-Dosis und 0,51 (95 % KI: 0,34-0,78) für die 9 mg-Dosis.


Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen die Analyse der Zeit bis zum Tod über die gesamte Studiendauer (Analyse zum Studienende) in den Nerandomilast-Dosisgruppen von 18 mg bzw. 9 mg im Vergleich zum entsprechenden Placebo für die Subgruppen, die nach Hintergrundtherapie, HRCT-Muster sowie zugrundeliegender klinischer ILD-Diagnose unterteilt sind.

Abbildung 13. Zeit bis zum Tod unter Patienten, die 18 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-ILD



BID = zweimal täglich

Abbildung 14. Zeit bis zum Tod unter Patienten, die 9 mg Nerandomilast erhielten, im Vergleich zu Placebo über die Dauer der Studie FIBRONEER-ILD



BID = zweimal täglich

Kinder und Jugendliche

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat für Jascayd eine Zurückstellung von der Verpflichtung zur Vorlage von Ergebnissen zu Studien in einer oder mehreren pädiatrischen Altersklassen in der fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankung gewährt (siehe Abschnitt 4.2 bzgl. Informationen zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Die Pharmakokinetik von Nerandomilast wurde an gesunden Probanden, Patienten mit IPF und Patienten mit PPF untersucht. Zwischen diesen Patientengruppen wurden keine klinisch relevanten Unterschiede in der Pharmakokinetik von Nerandomilast festgestellt.

Resorption

Nerandomilast erreichte nach oraler Anwendung von 9 mg- und 18 mg-Dosen nach im Median 1,00-1,25 Stunden (T_{max}) (Spanne: 0,5-4 Stunden) maximale Plasmakonzentrationen (C_{max}). Die absolute orale Bioverfügbarkeit von Nerandomilast betrug 73 % (90 % KI: 67-79 %).

Die Anwendung von 18 mg Nerandomilast zu einer fett- und kalorienreichen Mahlzeit veränderte die Exposition gegenüber Nerandomilast nicht in klinisch relevantem Ausmaß (die AUC stieg um ca. 15 %, während die C_{max} um ca. 14 % sank).

Verteilung

Nach einmaliger intravenöser Anwendung von Nerandomilast betrug das geometrische mittlere Verteilungsvolumen V_{ss} ca. 94 l (gCV 32,0 %). *In vitro* war Nerandomilast ein Substrat des Transporterproteins P-gp, jedoch nicht von BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 und OCT2.

Die humane Plasmaproteinbindung von Nerandomilast *in vitro* betrug 77 % und war nicht konzentrationsabhängig.

Bei Probanden verteilte sich Nerandomilast bevorzugt im Plasma mit einem Blut-Plasma-Verhältnis von 0,6-0,8.

Biotransformation

Nerandomilast wird hauptsächlich durch Oxidation über CYP3A und Glucuronidierung über verschiedene Uridin-5'-diphosphat-Glucuronosyltransferase-Enzyme metabolisiert.

Nach einmaliger oraler Anwendung war Nerandomilast der zirkulierende Hauptbestandteil und machte etwa 50 % der zirkulierenden Radioaktivität aus.

Nach mehrmaliger oraler Gabe von 12 mg Nerandomilast zweimal täglich war der einzige im *Steady State* im Plasma nachgewiesene Hauptmetabolit der dioxidative Metabolit BI 764333/M480(4). Dieser pharmakologisch inaktive Metabolit machte 12 % des gesamten Plasmamaterials im *Steady State* aus, das sowohl die Muttersubstanz als auch alle ihre Metaboliten umfasste.

Nerandomilast besitzt ein chirales Schwefelatom, und Jascayd enthält überwiegend chiral reines Nerandomilast (R-Enantiomer). Nach oraler Anwendung von Nerandomilast erfolgt durch Metabolisierung eine chirale Inversion vom R- zum S-Enantiomer. Das S-Enantiomer wurde als ein unbedeutender (3 % der gesamten zirkulierenden Radioaktivität) Metabolit von Nerandomilast identifiziert und ist pharmakologisch inaktiv. Das pharmakologisch aktive R-Enantiomer verblieb als das vorherrschende zirkulierende Enantiomer.

Elimination

Nach mehrmaliger oraler Anwendung von 18 mg Nerandomilast zweimal täglich betrug die terminale Halbwertszeit etwa 10 bis 17 Stunden und die geometrische mittlere scheinbare Plasma-Clearance im *Steady State* 274 ml/min mit einer interindividuellen Variabilität (gCV%) von 23,6 %. Nach oraler Anwendung einer Einzeldosis von 18 mg radioaktiv markiertem Nerandomilast wurden innerhalb von 9 Tagen nach der Dosierung etwa 95 % der Dosis wiedergefunden, davon 58 % in den Fäzes (13 % unverändert) und 36 % im Urin (12 % unverändert).

Linearität/Nicht-Linearität

Nerandomilast zeigte nach oraler Anwendung sowohl von Einzeldosen (0,06 bis 48 mg) als auch von Mehrfachdosen (1 bis 18 mg zweimal täglich) eine dosisproportionale Pharmakokinetik.

Nach zweimal täglicher oraler Anwendung von 18 mg Nerandomilast wurde innerhalb von 4 Tagen der *Steady State* erreicht, mit einem Akkumulationsverhältnis von bis zu 1,38, basierend auf AUC und C_{max} .

PK bei bestimmten Patientengruppen

Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Nieren- oder Leberfunktionsstörung

Es wurden keine klinisch relevanten Unterschiede in der Pharmakokinetik von Nerandomilast in Abhängigkeit von Alter (18-90 Jahre), Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit (hispanisch/lateinamerikanisch oder nicht hispanisch/lateinamerikanisch), leichter, mittelschwerer und schwerer Nierenfunktionsstörung ($eGFR \geq 15$ und < 90 ml/min, berechnet nach der CKD-EPI-Formel) oder leichter (Child-Pugh A) oder mittelschwerer (Child-Pugh B) Leberfunktionsstörung beobachtet. Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz und Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung (Child-Pugh C) wurden nicht untersucht.

Ethnische Zugehörigkeit

Bei asiatischen Patienten ist die Talspiegelkonzentration von Nerandomilast um bis zu 47 % höher als bei Patienten kaukasischer Herkunft. Dieser Effekt dürfte klinisch nicht relevant sein.

Körpergewicht

Eine populationspharmakokinetische Analyse ergab eine höhere Exposition gegenüber Nerandomilast bei Patienten mit niedrigerem Körpergewicht und eine niedrigere Exposition bei Patienten mit höherem Körpergewicht. Der Einfluss des Körpergewichts auf die Plasmakonzentrationen von Nerandomilast dürfte klinisch nicht relevant sein.

Pharmakokinetische/pharmakodynamische Zusammenhänge

Ein Anstieg der Nerandomilast-Talspiegel im *Steady State* ging bei Patienten mit IPF und PPF mit einer besseren Wirksamkeit einher, was sich in einem geringeren Rückgang der absoluten forcierten Vitalkapazität (FVC) gegenüber dem Ausgangswert über einen Zeitraum von 52 Wochen zeigte.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Allgemeine Toxikologie

Basierend auf den konventionellen Studien zur Sicherheitspharmakologie, Genotoxizität und zum kanzerogenen Potential lassen die präklinischen Daten keine besonderen Gefahren für den Menschen erkennen. Es gibt keine Hinweise auf ein phototoxisches Potenzial.

Studien zur Toxizität bei wiederholter Gabe wurden an Ratten, Minischweinen und Affen durchgeführt. Eine Vaskulopathie (Entzündung, Hämorrhagie und Nekrose von Gefäßwänden) war der Hauptbefund bei Ratten und Minischweinen. Bei Affen, denen bis zu 30 mg/kg/Tag verabreicht wurden (10-fache Humanexposition, basierend auf der AUC unter der maximal empfohlenen Humandosis [*Maximum Recommended Human Dose*, MRHD] [siehe Abschnitt 4.2]), wurden keine negativen Auswirkungen auf die Gefäße beobachtet. Die bei Ratten und Minischweinen beobachteten negativen Auswirkungen auf die Gefäße betrafen verschiedene Gewebe (z. B. Mesenterium und Gastrointestinaltrakt bei Ratten, Herz und Lunge bei Minischweinen). In Langzeitstudien wurden bei Ratten unter einer Dosierung von 2 mg/kg/Tag keine unerwünschten Gefäßveränderungen beobachtet, während bei einem Minischwein unter einer Dosierung von 3 mg/kg/Tag Gefäßveränderungen auftraten (beide Dosen entsprachen der Exposition beim Menschen, basierend auf der AUC unter der

MRHD). Die Expositionsspanne bei Affen, die als die für den Menschen relevanteste Spezies gelten, deutet darauf hin, dass Primaten weniger empfindlich auf Gefäßeffekte reagieren als andere Spezies.

In toxikologischen Studien an Affen mit Expositionen, die mehr als das 10-Fache der Humanexposition betrug (basierend auf der AUC unter der MRHD), wurden Erbrechen und Herzveränderungen (fokale Degeneration oder Nekrose ohne begleitende Gefäßveränderungen) beobachtet.

Reproduktions- und Entwicklungstoxizität

Fertilität und frühe Embryonalentwicklung

In einer Fertilitätsstudie an männlichen Ratten zeigte die Anwendung von Nerandomilast in einer Dosis von 6 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 4-fachen Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) keine Auswirkungen auf Paarung, Fertilität oder Spermienparameter.

Bei weiblichen Ratten wurden unter der höchsten getesteten Dosis von 9 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 9-fachen Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) geringere Indizien hinsichtlich Paarung und Fertilität beobachtet, zurückzuführen auf eine allgemeine Toxizität. Unter der Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkungen (*No Observed Adverse Effects Level*, NOAEL) von 6 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 4-fachen Humanexposition unter der MRHD) wurden keine derartigen Effekte beobachtet. In den Studien zur Fertilität, zur frühen Embryonalentwicklung und zur embryo-fötalen Entwicklung wurde bei Ratten bei Dosen von ≥ 6 mg/kg/Tag eine Zunahme früher Resorption beobachtet. Unter der NOAEL-Dosis von 3 mg/kg/Tag (etwa die 3-fache Humanexposition unter der MRHD) wurden keine derartigen Wirkungen beobachtet.

Bei geschlechtsreifen weiblichen Affen, denen Nerandomilast über einen Zeitraum von 39 Wochen verabreicht wurde, trat unter Dosierungen von 10 mg/kg/Tag und 30 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 3- bzw. 10-fachen Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) eine sporadische Verlängerung des Menstruationszyklus auf. Bei einer Dosierung von 3 mg/kg/Tag (entspricht der Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) wurden bei Affen keine Veränderungen des Menstruationszyklus beobachtet.

Bei Ratten wurden keine Veränderungen des Östruszyklus festgestellt.

Embryofetale Entwicklung

Nach Anwendung von radioaktiv markiertem Nerandomilast bei trächtigen Ratten wurde Radioaktivität in der Plazenta, im embryofetalen Blut und Gewebe nachgewiesen, was auf einen Übertritt durch die Plazentaschranke hindeutet.

Studien zur embryofetalen Entwicklung an Ratten und Kaninchen zeigten bis zu den höchsten getesteten Dosen von 9 mg/kg/Tag bzw. 15 mg/kg/Tag, entsprechend der 7- bzw. 4-fachen Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD, keine Teratogenität, keine Skelettveränderungen und keine Fetotoxizität. Bei Ratten wurde eine embryofetale Letalität aufgrund von Verlusten nach der Implantation in Verbindung mit einer Zunahme früher Resorption bei einer Dosis von 6 mg/kg/Tag (die 5-fache Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) beobachtet, die vom 6. bis zum 17. Trächtigkeitstag verabreicht wurde. Bei Ratten und Kaninchen wurde unter der NOAEL-Dosis von 3 mg/kg/Tag bzw. 15 mg/kg/Tag (etwa die 3- bzw. 4-fache Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) keine embryofetale Letalität beobachtet.

Prä- und postnatale Entwicklung

In einer Dosisfindungsstudie zur prä- und postnatalen Entwicklung an Ratten führte eine maternale Dosis von 6 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 5- bis 6-fachen Humanexposition unter der MRHD) vom 6. Trächtigkeitstag bis zum 6. Laktationstag zu einem geringeren Geburtsgewicht der Jungtiere. In der zulassungsrelevanten Studie zur prä- und postnatalen Entwicklung zeigte Nerandomilast, das trächtigen Ratten vom 6. Trächtigkeitstag bis zum 20. Laktationstag verabreicht wurde, bis zur

höchsten getesteten Dosis von 3 mg/kg/Tag (entspricht etwa der 2-fachen Humanexposition, basierend auf der AUC unter der MRHD) keine negativen Auswirkungen auf die Leistung der Muttertiere, keine Toxizität und keine Auswirkungen auf die Entwicklung, das Verhalten und die Reproduktionsleistung der F1-Generation (Nachkommen). In dieser Studie war Nerandomilast während der Laktationsphase im Plasma der Rattenjungen nachweisbar.

In einer Studie zur Milchsekretion nach Einmalgabe bei säugenden Ratten, denen radioaktiv markiertes Nerandomilast oral verabreicht wurde, wurden in der Milch und im Plasma der lactierenden Weibchen ähnliche Konzentrationen der Gesamtradioaktivität beobachtet, wobei die maximale radioaktive Konzentration 1 Stunde nach der Gabe erreicht wurde und 24 Stunden nach der Gabe signifikant abgenommen hatte. Die Konzentration der Gesamtradioaktivität in Tiermilch lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Konzentration des Wirkstoffs in Muttermilch zu.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

9 mg Filmtabletten

Lactose-Monohydrat
Mikrokristalline Cellulose
Hydroxypropylcellulose
Croscarmellose-Natrium
Magnesiumstearat
Hypromellose 2910
Talkum
Mannitol
Macrogol 8000
Eisen(III)-hydroxid-oxid $\times$ H₂O (E 172)

18 mg Filmtabletten

Lactose-Monohydrat
Mikrokristalline Cellulose
Hydroxypropylcellulose
Croscarmellose-Natrium
Magnesiumstearat
Hypromellose 2910
Talkum
Mannitol
Macrogol 8000
Eisen(III)-oxid (E 172)
Eisen(II, III)-oxid (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Perforierte PVC/Aluminium-Einzeldosis-Blisterpackungen
Packungsgrößen: 10 × 1, 30 × 1 oder 60 × 1 Filmtablette

HDPE-Flasche mit kindergesichertem Verschluss
Packungsgrößen: 60 oder 180 Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung [und sonstige Hinweise zur Handhabung]

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Jascayd 9 mg Filmtabletten

EU/1/26/2040/001
EU/1/26/2040/002
EU/1/26/2040/003
EU/1/26/2040/004
EU/1/26/2040/005

Jascayd 18 mg Filmtabletten

EU/1/26/2040/006
EU/1/26/2040/007
EU/1/26/2040/008
EU/1/26/2040/009
EU/1/26/2040/010

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

10. STAND DER INFORMATION

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <https://www.ema.europa.eu> verfügbar.

ANHANG II

- A. HERSTELLER, DER (DIE) FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST (SIND)**
- B. BEDINGUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE ABGABE UND DEN GEBRAUCH**
- C. SONSTIGE BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN DER GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN**
- D. BEDINGUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES ARZNEIMITTELS**

A. HERSTELLER, DER (DIE) FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST (SIND)

Name und Anschrift des (der) Hersteller(s), der (die) für die Chargenfreigabe verantwortlich ist (sind)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Frankreich

In der Druckversion der Packungsbeilage des Arzneimittels müssen Name und Anschrift des Herstellers, der für die Freigabe der betreffenden Charge verantwortlich ist, angegeben werden.

B. BEDINGUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE ABGABE UND DEN GEBRAUCH

Arzneimittel auf eingeschränkte ärztliche Verschreibung (siehe Anhang I: Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, Abschnitt 4.2)

C. SONSTIGE BEDINGUNGEN UND AUFLAGEN DER GENEHMIGUNG FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN

- **Regelmäßig aktualisierte Unbedenklichkeitsberichte [Periodic Safety Update Reports (PSURs)]**

Die Anforderungen an die Einreichung von PSURs für dieses Arzneimittel sind in der nach Artikel 107 c Absatz 7 der Richtlinie 2001/83/EG vorgesehenen und im europäischen Internetportal für Arzneimittel veröffentlichten Liste der in der Union festgelegten Stichtage (EURD-Liste) – und allen künftigen Aktualisierungen – festgelegt.

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) legt den ersten PSUR für dieses Arzneimittel innerhalb von 6 Monaten nach der Zulassung vor.

D. BEDINGUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES ARZNEIMITTELS

- **Risikomanagement-Plan (RMP)**

Der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen (MAH) führt die notwendigen, im vereinbarten RMP beschriebenen und in Modul 1.8.2 der Zulassung dargelegten Pharmakovigilanzaktivitäten und Maßnahmen sowie alle künftigen vereinbarten Aktualisierungen des RMP durch.

Ein aktualisierter RMP ist einzureichen:

- nach Aufforderung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur
- jedes Mal, wenn das Risikomanagement-System geändert wird, insbesondere infolge neuer eingegangener Informationen, die zu einer wesentlichen Änderung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses führen können oder infolge des Erreichens eines wichtigen Meilensteins (in Bezug auf Pharmakovigilanz oder Risikominimierung)

ANHANG III
ETIKETTIERUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. ETIKETTIERUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Jascayd 9 mg Filmtabletten
Nerandomilast

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Tablette enthält 9 mg Nerandomilast.

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Enthält Lactose. Siehe Packungsbeilage für weitere Informationen.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Filmtabletten

10 × 1 Filmtablette

30 × 1 Filmtablette

60 × 1 Filmtablette

60 Filmtabletten

180 Filmtabletten

5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Packungsbeilage beachten.
Zum Einnehmen

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

8. VERFALLDATUM

verwendbar bis

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

12. ZULASSUNGSNUMMER(N)

EU/1/26/2040/001 10 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/002 30 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/003 60 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/004 60 Filmtabletten
EU/1/26/2040/005 180 Filmtabletten

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

Jascayd 9 mg

17. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

2D-Barcode mit individuellem Erkennungsmerkmal

18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

PC
SN
NN

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**PERFORIERTE BLISTERPACKUNG****1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**

Jascayd 9 mg Tabletten
Nerandomilast

2. NAME DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Boehringer Ingelheim

3. VERFALLDATUM

verw. bis

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

5. WEITERE ANGABEN

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHENETIKETT****1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**

Jascayd 9 mg Filmtabletten
Nerandomilast

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Tablette enthält 9 mg Nerandomilast.

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Enthält Lactose. Siehe Packungsbeilage für weitere Informationen.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Filmtabletten
60 Filmtabletten
180 Filmtabletten

5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Packungsbeilage beachten.
Zum Einnehmen

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH**8. VERFALLDATUM**

verw. bis

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

12. ZULASSUNGSNUMMER(N)

EU/1/26/2040/004 60 Filmtabletten
EU/1/26/2040/005 180 Filmtabletten

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

17. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Jascayd 18 mg Filmtabletten
Nerandomilast

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Tablette enthält 18 mg Nerandomilast.

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Enthält Lactose. Siehe Packungsbeilage für weitere Informationen.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Filmtabletten

10 × 1 Filmtablette

30 × 1 Filmtablette

60 × 1 Filmtablette

60 Filmtabletten

180 Filmtabletten

5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Packungsbeilage beachten.
Zum Einnehmen

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

8. VERFALLDATUM

verwendbar bis

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

12. ZULASSUNGSNUMMER(N)

EU/1/26/2040/006 10 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/007 30 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/008 60 × 1 Filmtablette
EU/1/26/2040/009 60 Filmtabletten
EU/1/26/2040/010 180 Filmtabletten

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

Jascayd 18 mg

17. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

2D-Barcode mit individuellem Erkennungsmerkmal

18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

PC
SN
NN

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN
--

PERFORIERTE BLISTERPACKUNG

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Jascayd 18 mg Tabletten
Nerandomilast

2. NAME DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS
--

Boehringer Ingelheim

3. VERFALLDATUM

verw. bis

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

5. WEITERE ANGABEN

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHENETIKETT****1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS**

Jascayd 18 mg Filmtabletten
Nerandomilast

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Tablette enthält 18 mg Nerandomilast.

3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Enthält Lactose. Siehe Packungsbeilage für weitere Informationen.

4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Filmtabletten
60 Filmtabletten
180 Filmtabletten

5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Packungsbeilage beachten.
Zum Einnehmen

6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH**8. VERFALLDATUM**

verw. bis

9. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN

11. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

12. ZULASSUNGSNUMMER(N)

EU/1/26/2040/009 60 Filmtabletten
EU/1/26/2040/010 180 Filmtabletten

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

14. VERKAUFSABGRENZUNG

15. HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

16. ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT

17. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE

18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

B. PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Jascayd 9 mg Filmtabletten Jascayd 18 mg Filmtabletten Nerandomilast

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Jascayd und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Jascayd beachten?
3. Wie ist Jascayd einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Jascayd aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Jascayd und wofür wird es angewendet?

Jascayd enthält den Wirkstoff Nerandomilast.

Bei diesem Medikament handelt es sich um einen sogenannten Phosphodiesterase-4B-Hemmer, der dazu beiträgt, die Aktivität des Immunsystems zu regulieren und die Narbenbildung im Gewebe zu reduzieren.

Jascayd wird angewendet:

- zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose (IPF) bei Erwachsenen
- zur Behandlung von progredienter pulmonaler Fibrose (PPF) bei Erwachsenen

IPF und PPF sind Erkrankungen der Lunge, bei denen sich das Lungengewebe mit der Zeit verdickt, versteift und vernarbt. Durch die Vernarbung wird die Sauerstoffaufnahme aus der Lunge ins Blut erschwert, und die tiefe Atmung fällt schwer. Jascayd hilft dabei, die weitere Vernarbung und Versteifung der Lunge zu reduzieren und erleichtert Ihnen somit die Atmung.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Jascayd beachten?

Jascayd darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Nerandomilast oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Jascayd einnehmen:

- wenn Sie Nintedanib oder Pirfenidon einnehmen, da dies das Risiko für bestimmte Nebenwirkungen erhöhen kann
- wenn Sie Magen- oder Darmprobleme haben
- wenn Sie nach der Einnahme von Nintedanib oder Pirfenidon Magen- oder Darmprobleme haben oder in der Vergangenheit hatten
- wenn Sie psychische Probleme haben

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt während Ihrer Behandlung mit Jascayd:

- wenn bei Ihnen Durchfall oder Übelkeit einsetzt oder Sie Ihren Appetit verlieren
- wenn Sie ungewollt Gewicht verlieren

Kinder und Jugendliche

Dieses Arzneimittel darf bei Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden, da nicht bekannt ist, ob es in dieser Patientengruppe sicher und wirksam ist.

Einnahme von Jascayd zusammen mit anderen Arzneimitteln

Jascayd kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinflussen, und andere Arzneimittel können die Wirkung von Jascayd beeinflussen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Dies umfasst auch rezeptfreie Arzneimittel und pflanzliche Arzneimittel.

Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Pirfenidon (ein anderes Arzneimittel zur Behandlung von IPF) einnehmen, da es die Wirksamkeit von Jascayd beeinträchtigen kann.

Informieren Sie außerdem Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen, da diese die Wirksamkeit von Jascayd beeinträchtigen können:

- Carbamazepin: ein Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie und bestimmten Nervenschmerzen
- Johanniskraut: ein pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von leichten Depressionen, Wechseljahresbeschwerden und bestimmten Stimmungsstörungen wie Angstzuständen
- Rifampicin: ein Antibiotikum zur Behandlung von Tuberkulose und anderen bakteriellen Infektionen
- Phenytoin: ein Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie
- Bosentan: ein Arzneimittel zur Behandlung der pulmonal-arteriellen Hypertonie
- Metamizol: ein Arzneimittel zur Linderung von Schmerzen und zur Senkung von Fieber

Informieren Sie außerdem Ihren Arzt, wenn Sie eines der nachstehend aufgeführten Arzneimittel einnehmen. Ihr Arzt wird Ihre Jascayd-Dosis möglicherweise reduzieren, wenn Sie eines davon einnehmen, da sie die Konzentration von Jascayd in Ihrem Blut erhöhen können:

- Clarithromycin: ein Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionen
- Itraconazol: ein Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen
- Ritonavir: ein Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19 und HIV

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dieses Arzneimittel kann eine Fehlgeburt verursachen. Verwenden Sie während der Behandlung mit Jascayd eine zuverlässige Verhütungsmethode. Sollten Sie während der Behandlung mit diesem Arzneimittel schwanger werden, informieren Sie umgehend Ihren Arzt. Sie und Ihr Arzt werden gemeinsam entscheiden, ob der Nutzen des Arzneimittels das Risiko für Ihr ungeborenes Kind überwiegt.

Es ist nicht bekannt, ob dieses Arzneimittel in die Muttermilch übergeht. Verzichten Sie während der Behandlung mit Jascayd auf das Stillen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es ist nicht zu erwarten, dass dieses Arzneimittel Ihre Verkehrstüchtigkeit oder Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Jascayd enthält Lactose

Bitte nehmen Sie dieses Arzneimittel erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Jascayd enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Jascayd einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie viel Jascayd Sie einnehmen sollen und wann.

Die empfohlene Dosis beträgt zweimal täglich 1 Tablette Jascayd 18 mg. Nehmen Sie die Tabletten im Abstand von etwa 12 Stunden ein.

Ihr Arzt kann Ihre Jascayd-Dosis auf zweimal täglich 9 mg reduzieren, abhängig davon:

- wie gut Sie Jascayd vertragen
- welche anderen Arzneimittel Sie einnehmen

Einnahme des Arzneimittels

- Schlucken Sie die Tabletten im Ganzen mit Wasser.
- Sie können die Tabletten zu oder unabhängig von einer Mahlzeit einnehmen.

Falls Sie die Jascayd-Tabletten nicht im Ganzen schlucken können:

- Füllen Sie ein Glas mit etwa 100 ml stillem Wasser, das Raumtemperatur hat. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten.
- Geben Sie die Tablette unzerteilt in das Wasser.
- Rühren Sie regelmäßig für etwa 15 bis 20 Minuten um, bis die Tablette in sehr kleine Teile zerfallen ist (sie löst sich nicht vollständig auf).
- Trinken Sie die Mischung aus Jascayd und Wasser innerhalb von 2 Stunden nach dem Anrühren.
- Wenn Sie die Mischung nicht sofort trinken, rühren Sie sie vor dem Trinken erneut um.
- Füllen Sie das Glas erneut mit etwa 100 ml Wasser und trinken Sie dieses. So stellen Sie sicher, dass Sie die volle Dosis eingenommen haben.

Wenn Sie eine größere Menge von Jascayd eingenommen haben, als Sie sollten

Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie die Einnahme von Jascayd vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, nehmen Sie die nächste Dosis zur gewohnten Zeit ein. Nehmen Sie die vergessene Dosis **nicht** ein. Nehmen Sie **nicht** mehr als 2 Tabletten Jascayd 18 mg pro Tag ein.

Wenn Sie die Einnahme von Jascayd abbrechen

Nehmen Sie Jascayd so lange ein, bis Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Sie es absetzen sollen. Brechen Sie die Einnahme von Jascayd nicht ab, ohne zuvor mit Ihrem Arzt gesprochen zu haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten.

Idiopathische Lungenfibrose (IPF)

Sehr häufig (können mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

- Durchfall

Häufig (können bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):

- verminderter Appetit
- Übelkeit
- Rückenschmerzen
- Gewichtsverlust

Progrediente pulmonale Fibrose (PPF)

Sehr häufig (können mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen):

- Durchfall

Häufig (können bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen):

- verminderter Appetit
- Übelkeit
- Rückenschmerzen
- Gewichtsverlust

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in [Anhang V](#) aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Jascayd aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Blisterpackung oder dem Flaschenetikett nach „verw. bis“ sowie auf dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Jascayd enthält

Jascayd 9 mg Tabletten

Der Wirkstoff ist Nerandomilast. Jede Tablette enthält 9 mg Nerandomilast.

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Lactose-Monohydrat
- Mikrokristalline Cellulose
- Hydroxypropylcellulose
- Croscarmellose-Natrium
- Magnesiumstearat
- Hypromellose 2910
- Talkum
- Mannitol
- Macrogol 8000
- Eisen(III)-hydroxid-oxid × H₂O (E 172)

Jascayd 18 mg Tabletten

Der Wirkstoff ist Nerandomilast. Jede Tablette enthält 18 mg Nerandomilast.

Die sonstigen Bestandteile sind:

- Lactose-Monohydrat
- Mikrokristalline Cellulose
- Hydroxypropylcellulose
- Croscarmellose-Natrium
- Magnesiumstearat
- Hypromellose 2910
- Talkum

- Mannitol
- Macrogol 8000
- Eisen(III)-oxid (E 172)
- Eisen(II, III)-oxid (E 172)

Wie Jascayd aussieht und Inhalt der Packung

Jascayd 9 mg Filmtabletten sind hellgelb, oval und bikonvex. Sie haben „F9“ auf der einen und das Logo von Boehringer Ingelheim auf der anderen Seite. Die Tabletten sind 9,5 mm lang und 4,6 mm breit.

Jascayd 18 mg Filmtabletten sind hellrot, oval und bikonvex. Sie haben „F18“ auf der einen und das Logo von Boehringer Ingelheim auf der anderen Seite. Die Tabletten sind 12 mm lang und 5,9 mm breit.

Jascayd-Tabletten sind verfügbar in:

- Perforierten PVC/Aluminium-Einzeldosis-Blisterpackungen
Packungsgrößen: 10 × 1, 30 × 1 oder 60 × 1 Filmtablette
- HDPE-Flaschen mit kindergesichertem Verschluss
Packungsgrößen: 60 oder 180 Filmtabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

Hersteller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Deutschland

Boehringer Ingelheim France
100-104 Avenue de France
75013 Paris
Frankreich

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

België/Belgique/Belgien

Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Lietuvos filialas
Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -
клон България
Тел.: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

Boehringer Ingelheim SComm
Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.
Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
Tel.: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim B.V.
Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Eesti filiaal
Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Danmark A/S NUF
Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη
Α.Ε.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Tel.: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.
Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.
Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.
Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Viena - Sucursala Bucureşti
Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.
Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor ehf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
organizačná zložka
Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη
Α.Ε.
Τηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB
Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Latvijas filiāle
Tel: +371 67 240 011

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im.

Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <https://www.ema.europa.eu> verfügbar.