

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και Χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	10 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	32 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	100 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γατες	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (σκύλοι), Υποδόρια χρήση (γάτες)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	10 ml	1 φιαλίδιο	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Άλογα	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	100 ml	1 φιάλη	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 3 ημέρες
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Σκύλοι και γατες	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (σκύλοι), υποδόρια χρήση (γάτες)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδια	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	15 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	30 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδάδιμοι ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδάδιμοι ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες, ινδικά χοιρίδια	Από στόματος χρήση	Πολυαιθυλένιο φιάλη	15 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδάδιμοι ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	180 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Άλογα	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	250 ml	1 φιάλη	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 3 ημέρες
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	250 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή, χοίροι και άλογα	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), ενδομυϊκή χρήση (χοίροι), ενδοφλέβια χρήση (άλογα)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	250 ml	6 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι/άλογα) Γάλα: 5 ημέρες

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες, ινδικά χοιρίδια	Από στόματος χρήση	Πολυαιθυλένιο φιάλη	10 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες, ινδικά χοιρίδια	Από στόματος χρήση	Πολυαιθυλένιο φιάλη	3 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και χοίροι	Υποδόρια ή ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή), Ενδομυϊκή χρήση (χοίροι)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (χοίροι)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Γάτες	Υποδόρια χρήση	Φιαλίδιο (γυάλινο)	10 ml	1 φιαλίδιο	Δεν ισχύει

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Γάτες	Υποδόρια χρήση	Φιαλίδιο (γυάλινο)	20 ml	1 φιαλίδιο	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	100 ml	1 φιάλη	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Πόσιμο εναιώρημα	Χοίροι	Από στόματος χρήση	Φιάλη (πολυαιθυλένιο)	250 ml	1 φιάλη	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	1 blister (7 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	12 blisters (84 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	36 blisters (252 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	1 blister (7 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	12 blisters (84 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Μασώμενα δισκία	Σκύλοι	Από στόματος χρήση	Blisters (Alu/Alu)	7 δισκία	36 blisters (252 δισκία)	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg /ml	Πόσιμο εναιώρημα	Γάτες, ινδικά χοιρίδια	Από στόματος χρήση	Πολυαιθυλένιο φιάλη	30 ml	1 φιάλη	Δεν ισχύει
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και άλογα	Ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή και άλογα), υποδόρια χρήση (βοοειδή)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (άλογα) Γάλα: 5 ημέρες (βοοειδή)

Αριθμός EU	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και άλογα	Ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή και άλογα), υποδόρια χρήση (βοοειδή)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	1 φιαλίδιο	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (άλογα) Γάλα: 5 ημέρες (βοοειδή)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και άλογα	Ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή και άλογα), υποδόρια χρήση (βοοειδή)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	50 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (άλογα) Γάλα: 5 ημέρες (βοοειδή)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Βοοειδή και άλογα	Ενδοφλέβια χρήση (βοοειδή και άλογα), υποδόρια χρήση (βοοειδή)	Φιαλίδιο (γυάλινο)	100 ml	12 φιαλίδια	Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 15 ημέρες (βοοειδή), 5 ημέρες (άλογα) Γάλα: 5 ημέρες (βοοειδή)