

<u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u>	<u>(Επινοηθείσα) ονομασία</u>	<u>Περιεκ τικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνικ ή μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Στοιχειώδης συσκευασία</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>	<u>Μέγεθος συσκευασίας</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα + 1 βελόνα
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες + 10 βελόνες
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	50 προγεμισμένες σύριγγες
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- ¹	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	50 προγεμισμένες σύριγγες + 50 βελόνες

-- ¹ Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 1 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 3 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 4 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 5 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 6A ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 6B ^{1 2}	4,4 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 7F ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 8 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 9V ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 10A ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 11A ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 12F ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 14 ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 15B ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 18C ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 19A ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 19F ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 22F ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 23F ^{1 2}	2,2 μg
Πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό ορότυπο 33F ^{1 2}	2,2 μg

¹ Συζευγμένο με την CRM₁₉₇ πρωτεΐνη φορέα (περίπου 51 μg ανά δόση)

² προσροφημένο σε φωσφορικό αργίλιο (0,125 mg αργιλίου ανά δόση)