

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΔΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ**

Artiss και οι λοιπές εμπορικές ονομασίες του, Tisseel και οι λοιπές εμπορικές ονομασίες του, Tissucol και οι λοιπές εμπορικές ονομασίες του

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	ARTISS – Lösungen für einen Gewebekleber	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Αυστρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	ARTISS LYO – Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Αυστρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel - Lösungen für einen Gewebekleber	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Αυστρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Lyo - Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Βέλγιο	Baxter SA Boulevard René Branquart 80 7860 Lessines Belgium	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Βέλγιο	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol Duo 500	Σύριγγα TISSUCOL-ΑΠΡΟΤΙΝΙΝΗΣ: ολικές πρωτεΐνες 100-130 mg/ml, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης 75-115 mg/ml, εκ της οποίας ινωδογόνο 70-110 mg/ml και φιμπρονεκτίνη πλάσματος 2-9 mg/ml, παράγοντας XIII 10-50 IU/ml, πλασμινογόνο 0,04-0,12 mg/ml, απροτινίνη 3.000 KIU/ml (1,67 EPU/ml), Σύριγγα ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ-ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: πρωτεΐνες 50 mg/ml, θρομβίνη 500 IU/ml, χλωριούχο ασβέστιο 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Βέλγιο	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol Kit	Φιάλη 1: ολικές πρωτεΐνες 100-130 mg/ml, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης 75-115 mg/ml, παράγοντας XIII 10-50 IU/ml, πλασμινογόνο 0,04-0,12 mg/ml, Φιάλη 2: βόεια απροτινίνη 3.000 KIU/ml (1,67 EPU/ml), Φιάλη 3: ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml, πρωτεΐνες 50 mg/ml, Φιάλη 4: ανθρώπινη θρομβίνη 4 IU/ml, πρωτεΐνες 50 mg/ml, Φιάλη 5: χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Βέλγιο	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D	Ανθρώπινο ινωδογόνο (πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης): 72-110 mg/ml Παράγοντας XIII $\leq$ 10 IU/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Βέλγιο	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D Kit	Ανθρώπινο ινωδογόνο (πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης): 72-110 mg/ml Παράγοντας XIII $\leq$ 10 IU/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Βουλγαρία	Baxter d.o.o. Zelezna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Artiss solution for sealant frozen	Ανθρώπινο ινωδογόνο 91 mg/ml Απροτινίνη 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Βουλγαρία	Baxter d.o.o. Zelezna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Tisseel Lyo powders and solvents for sealant	Ανθρώπινο ινωδογόνο 91 mg/ml Απροτινίνη 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Βουλγαρία	Baxter d.o.o. Zelezna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenia	Tisseel solutions for sealant	Ανθρώπινο ινωδογόνο 72-110 mg/ml Απροτινίνη 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Tisseel	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Δημοκρατία της Τσεχίας	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliš 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	Tisseel Lyo	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Ενδοβλαβική χρήση
Δανία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	Ινωδογόνο 90 mg/ml Φιμπρονεκτίνη 6 mg/ml Απροτινίνη 3.000 KIU/ml Παράγοντας πήξης XIII 30 IU/ml Πλασμινογόνο 80 μg/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 40 μg/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Ενδοβλαβική χρήση
Δανία	Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark	Tisseel	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Ενδοβλαβική χρήση
Φινλανδία	Baxter Oy, PL 119, 00181 Helsinki Finland	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Τοπική
Φινλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel	Ινωδογόνο 72-110 mg/ml Ανθρώπινος παράγοντας πήξης XIII 10 IU/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Τοπική

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Φινλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel duo quick	Πρωτεΐνη ανθρώπινου πλάσματος 100-130 mg/ml: Ινωδογόνο 90 mg/ml Φιμπρονεκτίνη πλάσματος 5,5 mg/ml Ανθρώπινος παράγοντας πήξης XIII 30 IU/ml Απροτινίνη 1,67 EPU/ml Παράγοντας πήξης XIII 30 IU/ml Πλασμινογόνο 80 µg/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml Πρωτεΐνη ανθρώπινου πλάσματος 50 mg/ml Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 40 µg/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Τοπική
Γαλλία	BAXTER SAS 6 Avenue Louis Pasteur 78310 MAUREPAS FRANCE	ARTISS solution for sealant	Ινωδογόνο 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Γαλλία	BAXTER SAS 6 Avenue Louis Pasteur 78310 MAUREPAS FRANCE	TISSUCOL KIT	1° συστατικό: Ανθρώπινο ινωδογόνο 90,00 mg/ml Παράγοντας XIII: 10,00 IU/ml Φιμπρονεκτίνη: 5,50 mg/ml Πλασμινογόνο: 0,08 mg/ml Απροτινίνη 3.000,0 KIU***/ml 2° συστατικό: Θρομβίνη 500 IU/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική ή μορφή	Οδός χορήγησης
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Tissucol-Duo S 0,5 ml/1ml/2 ml Immuno	Συστατικό 1 Ινωδογόνο: 70-110 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 10-50 IU/ml Φιμπρονεκτίνη πλάσματος: 2-9 mg/ml Απροτινίνη (βόεια): 3.000 KIU/ml Συστατικό 2 Θρομβίνη (ανθρώπινη) 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,88 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Γερμανία	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Tissucol-Kit 1,0/2,0/5,0 Immuno	Συστατικό 1: Ινωδογόνο: 70 - 110 mg/ml Φιμπρονεκτίνη πλάσματος: 2 - 9 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 10 - 50 IU/ml Διάλυμα απροτινίνης: 3.000 KIU/ml Συστατικό 2: Λυοφιλοποιημένη θρομβίνη S: 500 IU/ml Λυοφιλοποιημένη θρομβίνη L: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,88 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ελλάδα	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	ARTISS	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ελλάδα	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	TISSEEL	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ελλάδα	BAXTER HELLAS LTD 3 Metsovou str, 14121-N Irakleio, Athens Greece	TISSEEL LYO	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επωνυμία ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. IX. em. 1138 Budapest Hungary	TISSEEL LYO por és oldószer szövetragasztóhoz	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ουγγαρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 1,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1° συστατικό: ολική πρωτεΐνη 100-130 mg, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης: 75-115 mg, εκ της οποίας ινωδογόνο 70-110 mg, φιμπρονεκτίνη πλάσματος 2-9 mg, παράγοντας XIII 10-50 IU, πλασμινογόνο 0,04-0,12 mg, απροτινίνη 3.000 KIU, 2° συστατικό: θρομβίνη 500 IU ή θρομβίνη 4 IU, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 5,88 mg	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ουγγαρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 2,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1° συστατικό: ολική πρωτεΐνη 200-260 mg, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης: 150-230 mg, εκ της οποίας ινωδογόνο 140-220 mg, φιμπρονεκτίνη πλάσματος 4-18 mg, παράγοντας XIII 20-100 IU, πλασμινογόνο 0,08-0,24 mg, απροτινίνη 6.000 KIU, 2° συστατικό: θρομβίνη 1.000 IU ή θρομβίνη 8 IU, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 11,76 mg	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική ή μορφή	Οδός χορήγησης
Ουγγαρία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSUCOL Kit 5,0 kétkomponensű fibrinragasztó	1° συστατικό: ολική πρωτεΐνη 500-650 mg, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης: 375-575 mg, εκ της οποίας ινωδογόνο 350-550 mg, φιμπρονεκτίνη πλάσματος 10-45 mg, παράγοντας XIII 50-250 IU, πλασμινογόνο 0,2-0,6 mg, απροτινίνη 15.000 KIU, 2° συστατικό: θρομβίνη 2.500 IU ή θρομβίνη 20 IU, χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό 29,4 mg	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ισλανδία	Baxter Medical AB, Isafjordsgatan 30B P.O. Box 63 164 94 Kista, Sweden	Artiss	Ανθρώπινο ινωδογόνο 91 mg/ml Απροτινίνη 3.000 KIU/ml (βόεια) Ανθρώπινη θρομβίνη 4 IU ³ /ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ισλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSEEL	Ανθρώπινο ινωδογόνο 91 mg/ml Ανθρώπινος παράγοντας XIII 10 IU/ml Βόεια απροτινίνη 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ισλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	Διάλυμα Tisseel ανά ml - Ινωδογόνο 90 mg Φιμπρονεκτίνη 5,5 mg Παράγοντας XIII 30 IU Απροτινίνη (βόεια) 3.000 KIU Πλασμινογόνο 80 μg Διάλυμα θρομβίνης ανά ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Artiss solutions for sealant, deep frozen	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 72-110 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tiseel Ready to use Solutions for Sealant	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 72-110 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ιρλανδία	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL Lyo	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 72-110 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ιταλία	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria, 20 00144 Roma Italy	ARTISS	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ιταλία	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	TISSEEL	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml Παράγοντας XIII ≤ 10 IU/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Λουξεμβούργο	Baxter SA Boulevard René Branquart 80 7860 Lessines Belgium	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απρωτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Λουξεμβούργο	Baxter AG Industriestraße 67 1221 Vienna Austria	Tissucol S/D Kit	Ανθρώπινο ινωδογόνο (πρωτεΐνες πήξης) 72-110 mg/ml Παράγοντας XIII ≤ 10 IU/ml Απρωτινίνη 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Μάλτα	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL KIT 2.0 ml, Two-Component Fibrin Sealant	Ινωδογόνο: 70-110 mg/ml Φιμπρονεκτίνη πλάσματος (CIG): 2-9 mg/ml Παράγοντας XIII: 10-50 U/ml Πλασμινογόνο: 0,04 – 0,12 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Δερματική χρήση
Μάλτα	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	TISSEEL Lyo, Two-Component Fibrin Sealant	Ινωδογόνο: 72-110 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml σε 45-55 mg ολικής πρωτεΐνης Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Δερματική χρήση
Νορβηγία	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Artiss	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 91 mg ¹ / ml Απροτινίνη: 3.000 KIU ² /ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 4 IU ³ /ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Νορβηγία	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Tisseel	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 91 mg ¹ /ml Απροτινίνη: 3.000 KIU ² /ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU ³ /ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Νορβηγία	Baxter AS, Gjerdrumsvei 11, 0484 Oslo, Norway	Tisseel	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 91 mg ¹ /ml Απροτινίνη: 3.000 KIU ² /ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU ³ /ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Tisseel	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Πολωνία	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	Tisseel Lyo	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Πορτογαλία	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Artiss	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU ² /ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 4 IU ³ /ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Πορτογαλία	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Tisseel	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 72-110 mg/ml Παράγοντας XIII: ≤10 IU Απροτινίνη: 3.000 KIU2/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU3/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Συγκολλητικό ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Πορτογαλία	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	Tisseellyo	Ανθρώπινο ινωδογόνο (72-110 mg/ml) Παράγοντας XIII (≤10 IU) Απροτινίνη (3.000 KIU2/ml) Ανθρώπινη θρομβίνη (500 IU3/ml) Χλωριούχο ασβέστιο (40 μmol/ml)	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ισπανία	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 246394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	ARTISS soluciones para adhesivo tisular Ultracongeladas	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Ενδοβλαβική χρήση
Ισπανία	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 246394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	TISSUCOL DUO 2,0 ml	Σύριγγα TISSUCOL-ΑΠΡΟΤΙΝΙΝΗΣ: ολικές πρωτεΐνες 100-130 mg/ml, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης 75-115 mg/ml, εκ της οποίας ινωδογόνο 70-110 mg/ml και φιβρονεκτίνη πλάσματος 2-9 mg/ml, παράγοντας XIII 10-50 IU/ml, πλασμινογόνο 0,04-0,12 mg/ml, απροτινίνη 3.000 KIU/ml (1,67 EPU/ml), Σύριγγα ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ-ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: πρωτεΐνες 50 mg/ml, θρομβίνη 500 IU/ml, χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ισπανία	BAXTER, S.L. Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia Valencia Spain	TISSUCOL DUO 5,0 ml	Σύριγγα TISSUCOL-ΑΠΡΟΤΙΝΙΝΗΣ: ολικές πρωτεΐνες 100-130 mg/ml, πρωτεΐνη με δυνατότητα πήξης 75-115 mg/ml, εκ της οποίας ινωδογόνο 70-110 mg/ml και φιβρονεκτίνη πλάσματος 2-9 mg/ml, παράγοντας XIII 10-50 IU/ml, πλασμινογόνο 0,04-0,12 mg/ml, απροτινίνη 3.000 KIU/ml (1,67 EPU/ml), Σύριγγα ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ-ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ: πρωτεΐνες 50 mg/ml, θρομβίνη 500 IU/ml, χλωριούχο ασβέστιο 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Σουηδία	Baxter Medical AB, Isafjordsgatan 30B P.O. Box 63 164 94 Kista, Sweden	Artiss	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Σουηδία	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml Παράγοντας XIII: 10 IU/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Σουηδία	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel Duo Quick	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml Παράγοντας XIII: 30 IU/ml Πλασμινογόνο: 0,08 mg/ml Φιβρονεκτίνη: 5,5 mg/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ολλανδία	Baxter B.V. Kobaltweg 49, 3542 CE Utrecht The Netherlands	ARTISS, oplossingen voor weefsellijm (RVG 100631)	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 4 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ολλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tisseel (RVG 35050/1/2)	Ινωδογόνο: 91 mg/ml Απροτινίνη (συνθετική): 3.000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 μmol/ml Παράγοντας XIII: ≤ 10 IU/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ολλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tissucol Duo (RVG 17099)	Ινωδογόνο: 70 - 110 mg/ml Φιμπρονεκτίνη: 2 - 9 mg/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml Παράγοντας XIII: 10-50 IU/ml Απροτινίνη (βόεια): 3.000 KIU/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ολλανδία	Baxter AG Industriestraße 67 A- 1221 Vienna Austria	Tissucol, Kit (RVG 17100/1/2/3)	Ινωδογόνο: 70 - 110 mg/ml Φιμπρονεκτίνη: 2 - 9 mg/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml Παράγοντας XIII: 10 - 50 IU/ml Απροτινίνη (βόεια): 3.000 KIU/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Artiss, solution for sealant deep frozen	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 110 mg/ml Απροτινίνη: 3.750 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 5 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 44 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tisseel Lyo Two-component Fibrin Sealant	Ινωδογόνο: 75 mg/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ηνωμένο Βασίλειο	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, United Kingdom	Tisseel Ready to use Solutions for Sealant	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 110 mg/ml Απροτινίνη: 3.000 KIU/ml Ανθρώπινη θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 40 µmol/ml	Διάλυμα για συγκόλληση ιστών	Χρήση επί της βλάβης

Beriplast και οι λοιπές εμπορικές ονομασίες του

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Αυστρία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set Pulver und Lösungsmittel für einen Gewebekleber	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU = 0,56 EPU Θρομβίνη: 500 IU /ml Χλωριούχο ασβέστιο (διυδρικό): 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Γαλλία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P 0.5 ml, 1 ml, 3 ml, powders and solvents for sealant Combi-Set	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU = 0,56 EPU Θρομβίνη: 500 IU /ml Χλωριούχο ασβέστιο (διυδρικό): 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Γερμανία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 0,5ml/1ml/3ml	Combi-Set 1: Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ελλάδα	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 UIC/ml Θρομβίνη: 500 UI/ml Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ελλάδα	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 UIC/ml Θρομβίνη: 500 UI/ml Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Ελλάδα	CSL BEHRING 5 Hadjiyianni Mexi str, 11528-Athens Greece	BERIPLAST P	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 UIC/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο διυδρικό: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ουγγαρία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 1 ml szövetragasztó készlet	Combi-Set 1: Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Θρομβίνη: 500 IU/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ουγγαρία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 3 ml szövetragasztó készlet	Combi-Set 1: Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU/ml=0.56 PEU/ml Combi-Set 2: Θρομβίνη: 500 IU/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ιταλία	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 D-35041 Marburg Germany	BERIPLAST P	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5.9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ολλανδία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set, weefsellijm - 26655/6/7	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Απροτινίνη (βόεια): 1000 KIU/ml Θρομβίνη: 500 IU/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,9 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης

Κράτος μέλος (στον ΕΟΧ)	Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Οδός χορήγησης
Δημοκρατία της Σλοβακίας	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 0,5 ml, Beriplast P Combi-Set 1 ml, Beriplast P Combi-Set 3 ml	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 90 mg Παράγοντας πήξης XIII: 60 UI Απροτινίνη: 1000 KUI Trombin: 7,6 mg Χλωριούχο ασβέστιο: 5,9 mg	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Σλοβενία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 1 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 e/ml Απροτινίνη: 1000 EIK/ml Θρομβίνη: 7,6 mg/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Σλοβενία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	Beriplast P Combi-Set 3 ml prašek in vehikel za lepilo za tkiva	Ανθρώπινο ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 e/ml Απροτινίνη: 1000 EIK/ml Θρομβίνη: 7,6 mg/ml Χλωριούχο ασβέστιο: 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ισπανία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 0,5 ml	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU = 0,56 EPU Θρομβίνη: 500 IU /ml Χλωριούχο ασβέστιο (διυδρικό): 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ισπανία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 1 ml	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU = 0,56 EPU Θρομβίνη: 500 IU /ml Χλωριούχο ασβέστιο (διυδρικό): 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης
Ισπανία	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg Germany	BERIPLAST P COMBI-SET 3 ml	Ινωδογόνο: 90 mg/ml Παράγοντας πήξης XIII: 60 U/ml Απροτινίνη: 1000 KIU = 0,56 EPU Θρομβίνη: 500 IU /ml Χλωριούχο ασβέστιο (διυδρικό): 5,9 mg/ml	Συγκολλητικό ιστών, κόνις και διαλύτης για παρασκευή	Χρήση επί της βλάβης