

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ**

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden - Gel		Γέλη	Δερματική χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden 20 Mg - Ampullen	20 mg	Αμπούλα	Παρεντερική χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden 20 Mg - Kapseln	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden 20 Mg - Kapseln	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden 20 Mg - Lösbare Tabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Pfizer Corporation Austria Gesmbh Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria	Felden Quick - Solve 20 Mg - Lyotabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austria	Pirocam 20 Mg - Ampullen	20 mg	Αμπούλα	Παρεντερική χρήση
Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austria	Pirocam 20 Mg - Tabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αυστρία	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 3 1140 Wien Austria	Pirocam 20 Mg - Zäpfchen	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austria	Pirorheum 10 Mg - Tabletten	10 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Hexal Pharma GmbH Carlberggasse 44 1235 Wien Austria	Pirorheum 20 Mg - Tabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Ci Pharma Arzneimittel HandelsgesmbH Thimiggasse 25 1180 Wien Austria	Piroxicam 'Ci Pharma' 20 Mg - Brausepulver	20 mg	Αναβράζουσα κόνις	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austria	Piroxistad 10 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	10 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Stada Arzneimittel GmbH. Heiligenstädterstraße 52/2/8 1190 Wien Austria	Piroxistad 20 Mg Tabs - Lösbare Tabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austria	Pirox 10 Mg - Kapseln	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Amat Pharma Trading GmbH Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austria	Pirox 20 Mg - Kapseln	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αυστρία	Amat Pharma Trading Gmbh Walfischgasse 6/2/1/3 1010 Wien Austria	Pirox 0,2% - Orale Suspension	2 mg/ml	Πόσιμο Εναιώρημα	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Boehringer InΓέληheim Austria Gmbh. Dr. Boehringer - Gasse 5-11 1121 Wien Austria	Tonimed - Gel		Γέλη	Τοπική χρήση
Αυστρία	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austria	Brexin 20 Mg – Tabletten	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Αυστρία	Torrex-Chiesi Pharma Gmbh. Gonzagagasse 16/16 A-1010 Wien Austria	Brexin -Pulver	20 mg	Πόσιμη κόνις	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Belgium	Piromed	0.50%	Γέλη	Διαδερμική χρήση
Βέλγιο	3ddd Pharma N.N. Diestersteenweg 349 B-3510 Hasselt Belgium	Piromed Dispers	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Brexine	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Brexine	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Feldene Dispersal	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Feldene	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Feldene Im	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή Χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Feldene Lyotabs	20 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Aktuapharma N.V. Ambachtenlaan 13e B-3001 Leuven Belgium	Piroxicam Eg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Belgium	Piroxicam Bexal	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Bexal S.P.R.L. Avenue Jules Bordet 168 B-1140 Brussels Belgium	Piroxicam Bexal	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Docpharma N.V. Ambachtenlaan B-3001 Heverlee Belgium	Dociproxi Dispers Ex Piroxicam	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Ethimed N.V. Leuvensestraat 28 Bus 2 B-1800 Vilvoorde Belgium	Piroxymed	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Eg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Eg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Eg	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Generix	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam Generix	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade 22 B-1020 Brussels Belgium	Piroxicamstada	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Belgium	Brexine	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Euro-Medic N.V. Astridlaan 20 B-8620 Nieuwpoort Belgium	Feldene Lyotabs	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Kela Laboratoria N.V. Sint Lenaartseweg 48/4 B-2320 Hoogstraten Belgium	Piroxicam Kela Ex Revalat	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Pastorale 16/28 B-1080 Brussels Belgium	Solicam	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Laboratoires S.M.B S. S.A. Rue De La Pastorale 16/28 B-1080 Brussels Belgium	Solicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Merck N.V. Brusselsesteenweg 288 B-3090 Overijse Belgium	Merck-Piroxicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Brexine	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Brexine - Dryfiz Ex Piroxidex	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Brexine	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Brexine	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Piroxidex	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Nycomed Belgium N.V. Gentsesteenweg 615 B-1080 Brussels Belgium	Piroxidex	20 mg	Σκόνη	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική Χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u> <u>a</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene	0.50%	Γέλη	Διαθερμική χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene Dispersal	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene Lyotabs	10 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pfizer S.A., Boulevard De La Plaine 17 B-1050 Brussels Belgium	Feldene Lyotabs	20 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Pharmapartner Nv Kolonel Begaultlaan 16 B-3012 Leuven Belgium	Feldene Lyotabs	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Ratiopharm Belgium S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgium	Piroxicam - Ratiopharm	20 mg	Υπόθετο	Ορθική Χρήση
Βέλγιο	Ratiopharm Belgium S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgium	Piroxicam- Ratiopharm	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	Ratiopharm Belgium S.A. Rue Saint-Lambert 141 B-1200 Bruxelles Belgium	Piroxicam- Ratiopharm	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Sandoz N.V. Telecom Ardens - Mediaaan 40 B-1800 Vilvoorde Belgium	Piroxicam Sandoz	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Socobom N.V. Luoizalaan 149 Bus 4 B-1050 Brussels Belgium	Polydene	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Teva Generics Belgium N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgium	Piroxicam Teva	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Teva Generics Belgium N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgium	Piroxicam Teva	20 mg	Υπόθετο	Ορθική Χρήση
Βέλγιο	Teva Generics Belgium N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgium	Piroxicam Teva	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Teva Generics Belgium N.V. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk Belgium	Piroxicam Teva	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βέλγιο	Topgen Esv E.Demunterlaan 1/8 B-1090 Brussels Belgium	Piroxitop	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βέλγιο	P.S.I. N.V. Kraanlei 27-29 B-900 Gent Belgium	Veralgesic	20 mg	Διασπειρόμενο δισκίο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Alkaloid Ltd 21 "Tzar Boris III" Blvd., 1000 Sofia Bulgaria	Piroxicam Alkaloid	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam Sopharma	10 mg	Καψάκιο σκληρό	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam Sopharma	20 mg	Καψάκιο σκληρό	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam Sopharma 1%	1 g/100 g - 40g	Γέλη	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Sopharma AD 16 "Iliensko Shose" str. 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam Sopharma 0.5%	0.5g/100g - 40g	Γέλη	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Boehringer InΓέληheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 InΓέληheim am Rhein Germany	Finalgel	0.5g/100g - 35g; 50g	Γέλη	Δερματική χρήση
Βουλγαρία	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Italy	Flamexin	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Βουλγαρία	Promedica S.p.A. Via Palermo 26 A 43100, Parma Italy	Flamexin	20 mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin 10 mg Capsule	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin 20 mg Capsule	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin Injection	20 mg/ml -1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	10 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Βουλγαρία	Egis Pharmaceuticals Public Limited Company Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	0.5g/50g - 50g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 243 15451 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 243 15451 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 243 15451 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 243 15451 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	0.50%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Κύπρος	Pfizer Hellas A.E. Λ. Μεσογείων 243 15451 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg/ml, 1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Κύπρος	Βαρνάβας Χατζηπαναγής Ανδροκλέους 7 Τ.Θ. 21229 1504 Λευκωσία Κύπρος	Brexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	Medochemie Ltd Τ.Θ. 51409, 3505 Λεμεσός, Κύπρος	Sotilen	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	Medochemie Ltd Τ.Θ. 51409, 3505 Λεμεσός, Κύπρος	Sotilen	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	Medochemie Ltd Τ.Θ. 51409, 3505 Λεμεσός,	Sotilen	1%	Γέλη	Εξωτερική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Κύπρος	Κύπρος Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Οδ. Αχαρνών Τ.Θ. 51706 3508 Λεμεσός	Roxitan	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Κύπρος	Κύπρος Remedica Ltd Limassol Industrial Estate Οδ. Αχαρνών Τ.Θ. 51706 3508 Λεμεσός	Roxitan	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Κύπρος Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	20MG/ML	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin 10 mg,	10 mg	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin 20 Mg	20 mg	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	10mg/gm	Κρέμα	Δερματική χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4	Pro-Roxikam 10 mg	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Δημοκρατία της Τσεχίας	Czech Republic Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 1 14000 Praha 4 Czech Republic	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg. Gottlieb-Daimler-Strasse 19 891 50 Laichingen Germany	Piroxicam Al 10 Piroxicam Al 20	10 mg 20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Δημοκρατία της Τσεχίας	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin Eff	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Piro 10mg Abz 10231.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Abz-Pharma Gmbh Dr. Georg-Spohn-Str. 7 D-89143 Blaubeuren Germany	Piro 20mg Abz 10231.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Acis Arzneimittel Gmbh Bajuwarenring 14 D-82041 Oberhaching	Piroxicam Acis 20mg Tabs 29562.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημειωμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Germany Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 10 30314.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 29583.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 BrauseΔισκίoten 31544.00.00	20mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Aliud Pharma Gmbh & Co.Kg Gottlieb-Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen	Piroxicam Al 20 Zäpfchen 6412895.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Germany	Brexidol 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 27116.00.01	20mg/3g	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Germany	Brexidol 20 Mg Δισκίoten 27116.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Germany	Pc-Fice 20 Mg Granulat Zur Herstellung Einer Lösung Zum Einnehmen 28887.00.01	20mg/3g	Κοκκία	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Asche Chiesi Gmbh Gasstr. 6 D-22761 Hamburg Germany	Pc-Fice 20 Mg Δισκίoten 28887.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning Germany	Fasax 10 Mg Tabs 26221.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Bc Biochemie Pharma Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D- 85737 Ismaning Germany	Fasax 20 Mg Tabs 24902.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Piroteta 10 37338.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Betapharm Arzneimittel Gmbh Kobelweg 95 D-86156 Augsburg Germany	Piroteta 20 37338.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ct-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin Germany	Pirox-Ct 20mg Δισκίoten 6156699.01.01	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	CT-Arzneimittel Gmbh Lengeder Str. 42a D-13407 Berlin Germany	Pirox-CT 20mg/1ml Ampullen 6061697.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kgaa Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal Germany	Piroxicam Pb 10mg 26223.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Docpharm Arznewimittelvertrieb Gmbh & Co.Kgaa Reetzstr. 83 D-76327 Pfinztal Germany	Piroxicam Pb 20mg 26223.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin Germany	Piro Kd 10 Tabs 36015.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik Gmbh Rigistr. 2 D-12277 Berlin Germany	Piro Kd 20 Tabs 34106.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Piroxicam 10 Heumann 12426.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany	Piroxicam 20 Heumann 12426.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	A.M. Piroxicam 20 10013.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Ig 20 I.M. 53304.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Maxiflam 20 I.M. 53303.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piro 20 I.M. 53307.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Pirorheum 20 I.M. 31511.00.01	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 10 Mg Tabs 9625.00.02	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 20 I.M. 53306.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 20 Mg BrauseΔισκίoten 31511.00.00	20mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 20 Mg Tabs 9625.01.02	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 20 Mg Zäpfchen 9625.00.01	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam Hexal 20mg/Μl 3000887.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u> <u>α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxiject 20 I.M. 53305.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Hexal Ag Industriestr. 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Traumahexal 20 29785.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Kohne Pharma Gmbh Schallbruch 1 D-42781 Haan Germany	Piroxicam 20 Mg Ako 37588.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt Germany	Durapirox 20mg 12638.00.00	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Merck Dura Gmbh Alsfelder Str. 19 D-64289 Darmstadt Germany	Durapirox 20mg Tabs 9627.01.01	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Germany	Pirocutan 10mg 29562.01.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Germany	Pirocutan 20mg 39340.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Germany	Pirocutan Ampullen 6829336.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Mibe Gmbh Arzneimittel Münchener Str. 15 D- 06796 Brehna Germany	Pirocutan Ampullen Mibe 48754.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Jenapirox I.M. 20 Mg 6413185.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Jenapirox Tabs 10mg 12637.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Jenapirox Tabs 20 Mg 9628.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 41597.00.00	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Piroxicam-Kapseln 10 Mg Jenapharm 6000413.01.00	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 41597.01.00	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Mibe Vertriebsgesellschaft Mbh Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena Germany	Piroxicam-Kapseln 20 Mg Jenapharm 6000413.00.00	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Pfizer Pharma Gmbh Pfizerstr. 1 D-76139 Karlsruhe Germany	Felden 20mg Tabs 871.01.02	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Piroxicam- Ratiopharm 10 Mg Tabs 6013244.01.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Injektionslösung 6362849.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg Tabs 6013244.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Piroxicam- Ratiopharm 20 Zäpfchen 6040355.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco-Str. 3 D-89079 Ulm Germany	Piroxicam- Ratiopharm 20mg Zäpfchen 10231.00.01	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Germany	Piroxicam Sandoz Parenteral 20mg Injektionslösung 6139399.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Germany	Piroxicam-Ac Suppos 20 30064.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Sandoz Pharmaceuticals Gmbh Carl-Zeiss-Ring 3 D-85737 Ismaning Germany	Piroxicam-Sandoz Parenteral 20 Mg Injektionslösung 53301.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.KgArzbacher Str. 78D- 56130 Bad Ems Germany	Piroxicam Hexal 10mg Δισκίoten 9627.00.01	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Siemens & Co Heilwasser Und Quellenprodukte Des Staatsbades Bad Ems Gmbh & Co.Kg Arzbacher Str. 78 D-56130 Bad Ems Germany	Piroxicam Hexal 20mg Δισκίoten 3000886.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Piroxi 10 Stada Tabs 44091.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Piroxi 20 Stada Tabs 44091.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Piroxicam Stada 6346224.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germany	Piroxicam Stada 10 Mg Kapseln 23046.00.00	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 10mg Tabs 6068067.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20 Mg Kapseln 23046.01.00	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20mg BrauseΔισκίoten 39728.00.00	20mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxicam Stada 20mg Tabs 6068067.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Piroxistad Injektionslösung 20 Mg/MI 48755.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Pxi-10 Stada Tabs 28449.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Stada Gmbh Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel	Pxi-20 Stada Tabs 28449.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 10 Tabs 6691665.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 10mg Tabs 9625.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase 20mg Tabs 9626.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase Ampullen 53300.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase S 29786.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γερμανία	Germany Tad Pharma Gmbh Heinz-Lohmann-Str. 5 D-27472 Cuxhaven	Flexase Uno 6691665.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Weimer Pharma Gmbh Im Steingerüst 30 D- 76437 Rastatt	Piroxicam Weimer Injektionslösung 20 Mg/MI 49635.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Germany Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20 Amp. 36620.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση
Γερμανία	Germany Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20 Mg 12428.00.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Germany Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co.Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog	Pirowieb 20mg Inj.- Lsg. 53302.00.00	20mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ένεση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γερμανία	Germany Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Germany	Piroflam 10 Mg 40937.00.00	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Germany	Piroflam 10 Mg Tabs Lichtenstein 6144727.00.00	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Germany	Piroflam 20mg Tabs Lichtenstein 6144727.01.00	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γερμανία	Winthrop Arzneimittel Gmbh Industriestr. 10 D-82256 Fürstenfeldbruck Germany	Piroflam Suppos Lichtenstein 6144779.00.00	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Δανία	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden	Piroxicam " Merck NM"	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm	Piroxicam "Merck NM"	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Δανία	Sweden Merck NM AB Ynglingagatan 14 11347, Post Box 23033 SE-10435 Stockholm Sweden	Piroxicam "Merck NM"	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Δανία	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup Denmark	Felden	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk-2750 Ballerup Denmark	Felden	0.5 %	Γέλη	Δερματική χρήση
Δανία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Denmark	Pirom	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Sandoz A/S C.F. Tietgens Boulevard 40 DK-5220 Odense SØ Denmark	Pirom	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre Denmark	Piroxigea	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Δανία	Hexal A/S Kanalholmen 8-12 Dk-2650 Hvidovre Denmark	Piroxigea	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	DEMO ABEE 21° χλμ Εθνικής Οδού	Oximezin	10 mg/tab	Γαστροανθεκτικό Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Αθηνών-Λαμίας 14565 Ελλάδα DEMO ABEE 21° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14565 Ελλάδα	Oximezin	20 mg/tab	Γαστροανθεκτικό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα DEMO ABEE 21° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14565 Ελλάδα	Oximezin	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα DEMO ABEE 21° χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας T.K. 14565 Ελλάδα	Oximezin	0.50%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg/tab	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	10 mg/tab	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243	Feldene	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	10 mg/tab	Δισκία ταχείας διάλυσης	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα Pfizer Hellas A.E. Μεσογείων 243 154 51 Ν. Ψυχικό Ελλάδα	Feldene	20 mg/tab	Δισκία ταχείας διάλυσης	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Biomedica-Chemica Γ. Λύρα 25, Κάτω Κηφισιά Ελλάδα	Valopon	10 mg/cap	Σκληρό Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Biomedica-Chemica Γ. Λύρα 25, Κάτω Κηφισιά Ελλάδα	Valopon	20 mg/cap	Σκληρό Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Biomedica-Chemica Γ. Λύρα 25, Κάτω Κηφισιά Ελλάδα	Valopon	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Biomedica-Chemica Γ. Λύρα 25, Κάτω Κηφισιά Ελλάδα	Valopon	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Remedina Γούναρη 25 & Άρεως Καματερό Αττική 13451 Ελλάδα	Flodeneu	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Φαρμακευτική Βιομηχανία Proel AE E.G. Koronis Δήλου 9	Zerospam	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Περιστερί 12134 Ελλάδα Φαρμακευτική Βιομηχανία Proel AE E.G. Koronis Δήλου 9 Περιστερί 12134 Ελλάδα	Zerospam	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Help AEBE Βαλαωρίτου 10 Μεταμόρφωση Αττικής 14452 Ελλάδα	Proponol	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Help AEBE Βαλαωρίτου 10 Μεταμόρφωση Αττικής 14452 Ελλάδα	Proponol	10 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Help AEBE Βαλαωρίτου 10 Μεταμόρφωση Αττικής 14452 Ελλάδα	Proponol	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Help AEBE Βαλαωρίτου 10 Μεταμόρφωση Αττικής 14452 Ελλάδα	Proponol	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Rafarm AEBE Κορίνθου 12 Νέο Ψυχικό 15451 Ελλάδα	Zitumex	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Rafarm AEBE Κορίνθου 12 Νέο Ψυχικό 15451 Ελλάδα	Zitumex	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Rafarm AEBE Κορίνθου 12	Zitumex	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Νέο Ψυχικό 15451 Ελλάδα Rafarm AEBE Κορίνθου 12 Νέο Ψυχικό 15451 Ελλάδα	Zitumex	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Vilco AE Πευκών 121 Νέο Ηράκλειο 14122 Ελλάδα	Pedifan	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Vilco AE Πευκών 121 Νέο Ηράκλειο 14122 Ελλάδα	Pedifan	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Αχαΐας & Τροιζήνας Νέα Κηφισιά 14564 Ελλάδα	Calmopyrol	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ Αχαΐας & Τροιζήνας Νέα Κηφισιά 14564 Ελλάδα	Calmopyrol	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	MENTINOVA AE 16 ^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής 15344 Ελλάδα	Conzila	20 mg/tab	Δισκία	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	MENTINOVA AE 16 ^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής 15344 Ελλάδα	Conzila	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	GENEPHARM AE 18 ^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος	Grecotens	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Παλλήνη Αττικής 15351 Ελλάδα GENEPHARM ΑΕ 18 ^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής 15351 Ελλάδα	Greco tens	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Coup Oe Kouparoussos & Sia Αγίας Βαρβάρας 53 Δάφνη 17235 Ελλάδα	Ruvamed	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Coup Oe Kouparoussos & Sia Αγίας Βαρβάρας 53 Δάφνη 17235 Ελλάδα	Ruvamed	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Pyrcost	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Pyrcost	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Pyrcost	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Pyrcost	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189	Felcam	10 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα Kleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Felcam	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Κleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Felcam	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Κleva ΕΠΕ Λεωφ. Πάρνηθος 189 Αχαρναί Αττικής 13671 Ελλάδα	Felcam	20 mg/sup	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ελλάδα	Viostam Κ. Μπουγιιάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 66 Ζωγράφου 157 71 Αθήνα	Painrelipt-D	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Norma Hellas ΑΕ Μενάνδρου 54 Αθήνα 10431 Ελλάδα	Neo Axedil	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Norma Hellas ΑΕ Μενάνδρου 54 Αθήνα 10431 Ελλάδα	Neo Axedil	20 mg/1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ελλάδα	Anfarm Hellas ΑΕ Κ. Παλαιολόγου & Περικλέους 27 Χαλάνδρι 15232 Ελλάδα	Bleduran	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Anfarm Hellas ΑΕ Κ. Παλαιολόγου & Περικλέους 27	Bleduran	0.5%	Γέλη	Εξωτερική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ελλάδα	Χαλάνδρι 15232 Ελλάδα Gap AE Αγησιλάου 46 Άγιος Δημήτριος 17341 Ελλάδα	Piroxicam/Gap	20 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Gap AE Αγησιλάου 46 Άγιος Δημήτριος 17341 Ελλάδα	Piroxicam/Gap	10 mg/cap	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Chiesi Ελλάς AEBE Λεωφ. Αναπαύσεως 30 Βριλήσσια 15235 Ελλάδα	Brexin	20 mg/sachet	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Chiesi Ελλάς AEBE Λεωφ. Αναπαύσεως 30 Βριλήσσια 15235 Ελλάδα	Brexin	20 mg/tab	Δισκία	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Chiesi Ελλάς AEBE Λεωφ. Αναπαύσεως 30 Βριλήσσια 15235 Ελλάδα	Brexin	20 mg/tab	Αναβράζοντα δισκία	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Pharmanel Pharmaceutical AE Μαραθώνος 106 Γέρακας 15344 Ελλάδα	Sinartrol	15 mg/tab	Δισκία	Από στόματος χρήση
Ελλάδα	Pharmanel Pharmaceutical AE Μαραθώνος 106 Γέρακας 15344 Ελλάδα	Sinartrol	1.5%	Κρέμα	Εξωτερική χρήση
Ελλάδα	Pharmanel Pharmaceutical AE Μαραθώνος 106	Sinartrol	30 mg/tab	Δισκία	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ισπανία	Γέρακας 15344 Ελλάδα Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene	10 mg	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene	20 mg	Σκληρό καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene	20mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	Feldene Flas	20 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Nefox Farma S.A. Avda. De Europa, 20 B 28108 Alcobendas Madrid Spain	FeldeΓέλη	10-60 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Ισπανία	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta	Brexinil	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ισπανία	08029 Barcelona Spain Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona Spain	Brexinil	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona Spain	Brexinil Sobres	20 mg	Σκόνη για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona Spain	Cycladol	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona Spain	Cycladol Dref	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Chiesi España, S.A. Av. Berlin, 38-48 7ª Planta 08029 Barcelona Spain	Cycladol	20 mg	Σκόνη για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona Spain	Doblexan	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona Spain	Doblexan	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ισπανία	Quimifar, S.A. Comadran 37 Barbera Del Valles 08210 Barcelona Spain	Doblexan	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spain	Improntal	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spain	Improntal	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spain	Improntal	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spain	Improntal	5mg/g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ισπανία	Rottapharm, S.L. Carretera De Barcelona 2 46132 Almacera Spain	Improntal	20mg/ml	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz-Chipi, 10. Polig. Areta 31620 Huarte Pamplona Spain	Piroxicam Cinfa	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Edigen, S.A Chile 8, 2º Oficina 203. Edificio Euromadrid	Piroxicam Edigen	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ισπανία	Las Matas 28290 Madrid Spain Pharmagenus ,S.A Passeig De Gracia, 55 5º 1ª. 08007 Barcelona Spain	Piroxicam Pharmagenus	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Spain	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Ratiopharm España, S.A. Avda. De Burgos 16 D - 5ª Planta 28036 Madrid Spain	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Spain	Salvacam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Salvat S.A.Gallo, 30-36 08950 Barcelona Spain	Salvacam	0.50%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ισπανία	Laboratorios faes Farma Sa maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spain	Sasulen	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spain	Sasulen	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Faes Farma Sa	Sasulen	0.50%	Γέλη	Δερματική

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spain				χρήση
Ισπανία	Laboratorios Faes Farma Sa Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Spain	Sasulen	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spain	Vitaxicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ισπανία	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spain	Vitaxicam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ισπανία	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spain	Vitaxicam Topico	0.50%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ισπανία	Laboratorios Robert, S.A. Gran Via Carlos Iii 94 08028 Barcelona Spain	Vitaxicam	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Εστονία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Εστονία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20mg	Κόνις για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Εστονία	Pfizer Europe Ma Eeig Ramsgate Road Sandwich Kent Ct13 9nj United Kingdom	Feldene	0.5 %	Γέλη	Διαδερμική χρήση
Φινλανδία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexidol	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Finland	Felden	0.5 %	Γέλη	Δερματική χρήση
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Finland	Felden	20 mg	Καψάκιο σκληρό	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Pfizer Oy Tietokuja 3 00330 Helsinki Finland	Felden	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Alpharma A/S Harbitzalleen 3 158 Skoyen 0212 Oslo Norway	Piroxal	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Φινλανδία	Merckle Gmbh Ludwig-Merckle-Strasse 3 P.O. Box 1161 89143 Blaubeuren Germany	Piroxin	0.5 %	Γέλη	Δερματική χρήση
Γαλλία	Ajc Pharma	Zofora 20 Mg,	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	18, Rue Du Docteur Ragnaud 16000 Angoulême France	Suppositoire			
Γαλλία	Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex France	Piroxicam Biogaran 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο,σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Biogaran 15, Boulevard Charles De Gaulle 92707 Colombes Cedex France	Piroxicam Biogaran 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο,σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye France	Zofora 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο,σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye France	Zofora 20 Mg/1 Ml, Solution Injectable (I.M.)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Laboratoire Pharmy II 26 rue des Gaudines 78100 Saint-Germain-Laye France	Zofora 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο,σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Cephalon France 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex France	Proxalyoc 20 Mg, Lyophilisat Oral	20 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Cephalon France 20, Rue Charles Martigny 94701 Maisons-Alfort Cedex France	Proxalyoc 10 Mg, Lyophilisat Oral	10 mg	Επιγλώσσιο δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Chiesi	Cycladol 20 Mg,	20 mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie France	Comprimé Αναβράζον			χρήση
Γαλλία	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie France	Cycladol 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable En Sachet	20 mg	Σκόνη	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie France	Cycladol 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Chiesi 11, Avenue Dubonnet 92400 Courbevoie France	Cycladol 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex France	Inflaced 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex France	Inflaced 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Dexo 179, Bureaux De La Colline 92213 Saint-Cloud Cedex France	Inflaced 20 Mg, Poudre Αναβράζον En Sachet	20 mg	Σκόνη	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics "Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	Piroxicam Eg 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	Eg Labo - Laboratoires Eurogenerics "Le Quintet" - Bâtiment A 12, Rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	Piroxicam Eg 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angoulême t France	Piroxicam Expanpharm 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Expanpharm International 6, rue de la Rochefoucauld 16000 Angoulême France	Piroxicam Expanpharm 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratories Fournier S.A. 42, Rue De Longvic 21300 Chenove France	Piroxicam Fournier 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex France	Pirotec 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex France	Piroxicam Innotech International 20 Mg/1 ML, Solution Injectable	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex France	Piroxicam Innotech International 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex	Piroxicam Innotech International 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	France Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex France	Pirotec 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	France Innotech International 7-9, Avenue François-Vincent Raspail Bp 32, 94111 Arcueil Cedex France	Piroxicam Innothera 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes France	Piroxicam Ivax 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes France	Piroxicam Ivax 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes France	Piroxicam Ivax 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Ivax Pharmaceuticals 34, Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes France	Piroxicam Ivax 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris France	Piroxicam Rpg 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Laboratoire Rpg - Ranbaxy Pharmacie Generiques 4, Place Louis Armand, 75012 Paris	Piroxicam Rpg 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επισημασμένη Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	France Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg/1 ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	France Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Comprimé Διασπειρόμενο	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	France Merck Generiques 34, Rue Saint-Romain, 69359 Lyon Cedex 08	Piroxicam Merck 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos	Piroxicam Palbian 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Palbian Eurasanté - Parc Galénis, 85 C Rue Nelson Mandela 59120 Loos	Piroxicam Palbian 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Pfizer	Feldene 10 Mg,	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Gélule			χρήση
Γαλλία	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Feldene 20 Mg/1 Ml, Solution Injectable En Ampoule (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Feldene 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Feldene Διασπειρόμενο 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Feldene 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pfizer 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75668 Paris Cedex 14 France	Γέληdene 0,5 Pour Cent, Γέλη Pour Application Locale	0,500 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Piroxicam Beral 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Piroxicam Beral 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France	Piroxicam Beral	20 mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Διασπειρόμενο20 Mg, Comprimé ΔιασπειρόμενοSécabl e			χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Piroxicam Beral 20 Mg/1 ML, Solution Injectable En Ampoule (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Piroxicam Beral 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pfizer Holding France 23-25, Avenue Du Docteur Lannelongue 75014 Paris France	Piroxicam Beral 0,5 Pour Cent, Γέλη	0,5 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Γαλλία	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex France	Brexin 20 Mg, Poudre Pour Suspension Buvable	20 mg	Σκόνη	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex France	Brexin 20 Mg, Suppositoire	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Γαλλία	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex France	Brexin 20 Mg, Comprimé Αναβράζον	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Pierre Fabre Medicament 45, Place Abel Gance 92654 Boulogne Cedex France	Brexin 20 Mg, Comprimé Sécable	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	Ratiopharm 5, Rue Charles Martigny, Bp 42, 94702 Maisons-Alfort Cedex France	Piroxicam- Ratiopharm 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	Piroxicam Sandoz 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Sandoz 49, Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	Piroxicam Gnr 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex France	Piroxicam Teva 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex France	Piroxicam Teva 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Teva Classics Le Palatin 1, 1, Cours Du Triangle, 92936 Paris La Défense Cedex France	Piroxicam Teva 20 Mg/1 Ml, Solution Injectable (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht The Netherlands	Piroxicam Teva Pharma 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217, 3640 Ae Mijdrecht The Netherlands	Piroxicam Teva Pharma 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Flexirox 20 Mg/ML, Solution Injectable (Im)	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Flexirox 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Flexirox 20 Mg, Poudre Αναβράζονε En Sachet-Dose	20 mg	Σκόνη	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Flexirox 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Meda Pharma 25, Boulevard de l'Amiral Bruix 75016 Paris France	Flexirox 2 Mg/ML, Suspension Buvable En Flacon	200 mg	Εναιώρημα	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	Piroxicam Winthrop 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris	Piroxicam Winthrop 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Γαλλία	France Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris	Olcam 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Winthrop Medicaments 1/13, Boulevard Romain Rolland 75014 Paris	Olcam 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Zydus France 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre	Piroxicam Zydus 20 Mg, Gélule	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Γαλλία	France Zydus France 25, Rue Des Peupliers, Zac Les Hautes Pâtures - Parc D'activités Des Peupliers, 92000 Nanterre	Piroxicam Zydus 10 Mg, Gélule	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	France Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen	Piroxicam Al	10mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Germany Aliud Pharma Gmbh &Co. Kg. Gottlieb-Daimler Str. 19 89150 Laichingen	Piroxicam Al	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Germany Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Flamexin	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Italy Torrex Chiesi Pharma Gmbh	Brexin	20mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Gonzagagasse 16/16 1010 Vienna Austria				χρήση
Ουγγαρία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	10mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ουγγαρία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	10m/1g	Κρέμα	Τοπική χρήση
Ουγγαρία	Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8. Hungary	Pirorheum	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Sandoz Hungaria Kft. 1034 Budapest, Tímár U. 8. Hungary	Pirorheum	20mg	Ενέσιμο	Παρεντερική χρήση
Ουγγαρία	Pfizer Kft.	Feldene	10mg	Καψάκιο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Thurzó U. 5/C 1133 Budapest Hungary				χρήση
Ουγγαρία	Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest Hungary	Feldene Dispersal	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Pfizer Kft. Thurzó U. 5/C 1133 Budapest Hungary	Feldene Flash	20mg	Δισκίο	Υπογλώσσια χρήση
Ουγγαρία	Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest Hungary	Piroxicam-B	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Biogal-Teva Pharma Rákóczi U. 70-72 1074 Budapest Hungary	Piroxicam-B	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen Hungary	Huma-Pirocam	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi U. 13 4042 Debrecen Hungary	Huma-Pirocam	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ουγγαρία	Slovakofarma As Nitrianská 100 92027 Hlomovec Hungary	Reumador	5mg/1g	Γέλη	Διαδερμική χρήση
Ιρλανδία	Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd	Brexidol 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Sk8 3gy United Kingdom	tablets			χρήση
Ιρλανδία	Trinity Chiesi Pharmaceuticals Ltd Cheadle Royal Business Park Highfield, Cheadle Sk8 3gy United Kingdom	Brexidol 20mg Αναβράζον tablets	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-on-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene 10 Mg Καψάκιος	10mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-on-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene 20mg Καψάκιος	20mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιρλανδία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-on-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Suppositories 20mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιρλανδία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-on-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Gel 0.5%	0.50%	Γέλη	Τοπική χρήση
Ιρλανδία	Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24	Feldene TopiGel		Γέλη	Τοπική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u> <u>a</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ισλανδία	Ireland Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Denmark	Felden	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ισλανδία	Pfizer Aps Lautrupvang 8 Dk 2750 Ballerup Denmark	Felden gel	0.5 %	Γέλη	Τοπική χρήση
Ιταλία	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Piroxicam Abc	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Piroxicam Abc	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso Vittorio Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Piroxicam Abc	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Aesculapius Farmaceutici Srl Via Cozzaglio, 24 25125 Brescia Italy	Clevian	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma Italy	Oxicam	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Bioprogress S.P.A. Via Aurelia, 58 00165 Roma	Oxicam	1%	Γέλη	Δερματική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Italy Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova	Bruxicam	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova	Bruxicam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Italy Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova	Bruxicam	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Bruschettini S.R.L. Via Isonzo, 6 16147 Genova	Piroftal	0,5%	Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα	Οφθαλμική χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexidol	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexidol	20 mg	Αναβράζον δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexidol	20 mg	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexidol	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Brexin L	20 mg/2 ml	Σκόνη και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	30 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	2%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	30 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	50 g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	40 g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma	Pivaloxicam	30 g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br)	Euroxi	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Italy Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br)	Euroxi	50 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Copernico S.R.L. Via Oria, 32 72028 Torre Santa Susanna (Br)	Spirox	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Italy Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano	Piroxicam Doc	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano	Piroxicam Doc	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano	Piroxicam Doc	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Italy Doc Generici Srl Via Manuzio, 7 20124 Milano	Piroxicam Doc Generici	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Dorom S.R.L. Viale G. Ricsληρό, 7 20143 Milano	Piroxicam	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Dorom S.R.L. Viale G. Ricsληρό, 7 20143 Milano	Piroxicam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u> <u>a</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Italy Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano	Piroxicam Eg	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Italy Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano	Piroxicam Eg	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Eg S.P.A. Via Scarlatti Domenico, 31 20124 Milano	Piroxicam Eg	20 mg	Διαλυτό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz	IpsOflog	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz	IpsOflog	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz	IpsOflog	20 mg/ 1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Italy Epifarma S.R.L Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia Pz	IpsOflog	20 mg	Διαλυτό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze	Antiflog	10 mg	Καψάκιο, μαλακό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u> <u>a</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Italy F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze	Antiflog	20 mg	Καψάκιο, μαλακό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze	Antiflog	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Italy F.I.R.M.A. S.P.A. Via Di Scandicci, 37 50143 Firenze	Antiflog	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano	Flodol	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Farma 1 S.R.L. Via Privata Maria Teresa, 11 20123 Milano	Flodol	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma	Roxenil	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Italy Farmaceutici Caber S.P.A. Viale Citta' D'europa, 681 00100 Roma	Roxenil	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Italy Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda	Piroxicam Hexal	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi) Italy Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi) Italy	Piroxicam Hexal	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Hexal S.P.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Via Paracelso, 16 20041 Agrate Brianza (Mi) Italy	Piroxicam Hexal	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Jet Generici S.R.L. Via Mario Lalli, 8 56127 Pisa Italy	Piroxicam	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr) Italy	Reumagil	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	K.B.R. Kroton Biologic Researches S.R.L. V.Emanuele, 73 88074 Crotone (Kr) Italy	Reumagil	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Laboratori Alter S.R.L. Via Egadi, 7 20144 Milano Italy	Piroxicam Alter	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone	Roxiden	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Italy				χρήση
Ιταλία	Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Italy	Roxiden	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Italy	Roxiden	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro E Gazzone S.R.L. Via Pavia, 6 20136 Milano Italy	Roxiden	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italy	Reucam	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italy	Reucam	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L. Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italy	Reucam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L.	Reucam	1%	Κρέμα	Δερματική

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Strada Solaro, 75/77 18038 Villa Sayonara – Sanremo (Im) Italy				χρήση
Ιταλία	Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano Italy	Lampoflex	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano Italy	Lampoflex	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Lampugnani Farmaceutici Spa Bianca Maria Visconti, 33 20100 Milano Italy	Lampoflex	1%	Δερματικός Αφρός	Δερματική χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy	Cicladol	20 mg	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy	Cicladol	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy	Cicladol	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy	Cicladol	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L.	Ciclafast	30 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy				χρήση
Ιταλία	Master Pharma S.R.L. Via Giacomo Chiesi 43100 Parma Italy	Ciclafast	2%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Italy	Polipirox	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Italy	Polipirox	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Mayne Pharma S.R.L. Via Orazio, 20/22 80122 Napoli Italy	Polipirox	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Merck Generics Italia S.P.A. Via Aquileia, 35 20092 Cinisello Balsamo (Mi)	Piroxicam	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Italy	Dexicam	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Italy	Dexicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L.	Dexicam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ιταλία	Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Italy Officina Farmaceutica Fiorentina S.R.L. Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14 55049 Viareggio (Lu) Italy	Dexicam	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Pfizer Consumer Health Care S.R.L. Strada Statale 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Raia	20 mg	Υπογλώσσιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene	20 mg	Διαλυτό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene Cremadol	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L.	Feldene Fast	20 mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy				χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene Fast	20 mg	Υπογλώσσιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Pfizer Italia S.R.L. S.S. 156 Km 50 04010 Borgo San Michele (Lt) Italy	Feldene Lipo	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ιταλία	Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italy	Roxene	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italy	Roxene	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Pliva Pharma S.P.A. Via Tranquillo Cremona 10 20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italy	Roxene	20 mg	Διαλυτό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L.	Brexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy				χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexivel	2 ml	Σκόνη και διαλύτης για Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexivel	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexivel	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexivel	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Brexivel	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Riacen	10 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L.	Riacen	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy				χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Riacen	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Promedica S.R.L. Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Riacen	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Germany	Piroxicam Ratiopharm	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Germany	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89070 Ulm Germany	Piroxicam Ratiopharm	20 mg	Διαλυτό Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va) Italy	Piroxicam Sandoz	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	Sandoz S.P.A. Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va) Italy	Piroxicam Sandoz	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Ιταλία	Sandoz S.P.A.	Piroxicam Sandoz	1%	Κρέμα	Δερματική

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
	Largo Boccioni, 1 21040 Origgio (Va) Italy				χρήση
Ιταλία	So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm) Italy	Artroxicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ιταλία	So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm) Italy	Artroxicam	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ιταλία	So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm) Italy	Artroxicam	1%	Κρέμα	Τοπική χρήση
Ιταλία	So.Se.Pharm S.R.L. Societa' Di Servizio Per L'industria Farmaceutica Ed Affini Via Dei Castelli Romani, 22 00040 Pomezia (Rm) Italy	Artroxicam	1%	Δερματικός Αφρός	Δερματική χρήση
Ιταλία	Tad Pharma Italia S.R.L. Via Felice Casati, 16 20124 Milano Italy	Errekam	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Ιταλία	Teva Pharma Italia S.R.L. Viale G. Riccigliano, 7 20143 Milano Italy	Piroxicam	1%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ιταλία	Winthrop Pharmaceuticals Italia S.R.L. Viale Bodio, 37/B	Piroxicam Winthrop	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Λιθουανία	20158 Milano Italy Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Δισκίο	χρήση Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg/3 mg	Κοκκία για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Boehringer Ingelheim International Gmbh Binger Straße 173 55216 InΓέληheim Am Rhein Germany	FinalGel Sport	0,5 g/100 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Λιθουανία	Egis Pharmaceuticals Ltd. Keresztúri Út 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	500 mg/50 g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Λιθουανία	Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21 58-500 Jelenia Gora Poland	Piroxicam	20 mg	Επικαλυμμένο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λιθουανία	Pharmaceutical Works Jelfa Sa Ul. W.Pola 21	Piroxicam	10 mg	Επικαλυμμένο Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Λουξεμβούργο	58-500 Jelenia Gora Poland Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Λουξεμβούργο	Pfizer S.A. 17, Boulevards De La Plaine B-1050 Bruxelles Belgium	Feldene Dispersal	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22 B-1020 Bruxelles Belgium	Lampoflex	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel, B 22	Lampoflex	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Λουξεμβούργο	B-1020 Bruxelles Belgium Eurogenerics S.A. Esplanade Heysel B 22 B-1020 Bruxelles Belgium	Lampoflex	0.50%	Γέλη	Δερματική χρήση
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Brexine	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Brexine	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Brexine	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Nycomed Belgium S.A. 615, Chaussee De Gand B-1080 Bruxelles Belgium	Brexine	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Smb Laboratories 26-28 Rue De La Pastorale B-1080 Bruxelles Belgium	Solicam	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Smb Laboratories 26-28 Rue De La Pastorale B-1080 Bruxelles Belgium	Solicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Docpharma S.A. Ambachtenlaan 13h	Docpiroxi Dispers	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Λουξεμβούργο	B-3001 Heverlee Belgium Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Germany	Piroxicam-Rpm	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Rationpharm Gmbh Postfach 3380 D-89070 Ulm Germany	Piroxicam-Rpm	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Hexal AG Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam-HEXAL	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λουξεμβούργο	Hexal Ag Industriestrasse 25 D-83607 Holzkirchen Germany	Piroxicam-Hexal	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Λετονία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Brexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher Surrey Kt10 9qr United Kingdom	Pirox Γέλη	0,5 %	Γέλη	Δερματική χρήση
Λετονία	Cipla (Uk) Limited 53a High Street Esher	Pirox-20	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Λετονία	Surrey Kt10 9qr United Kingdom Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Sopharma Ad Iliensko Shose Str. 16 1220 Sofia Bulgaria	Piroxicam	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Poland	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Pharmaceutical Works Jelfa S.A. Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Gora Poland	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Λετονία	Tallinna Farmaatsiatehase As 33 Tondi Street Ee – 11316, Tallinn Estonia	Piroxicam Tft	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Μάλτα	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Italy	Bruxicam	1g	Κρέμα	Τοπική χρήση
Μάλτα	Bruschettini SRL Via Isonzo 4 16147 Genova Italy	Bruxicam	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Μάλτα	Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti	Flodol	1g	Γέλη	Τοπική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Μάλτα	00144 Rome Italy Alta Care Laboratories Ltd. 188 Via Ilderbrando Vivanti 00144 Rome Italy	Flodol	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn The Netherlands	Piroxicam Actavis Disper 20 mg	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn The Netherlands	Piroxicam Actavis 10 mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Actavis B.V. Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn The Netherlands	Piroxicam Actavis 20 mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur The Netherlands	Piroxicam Cf 10 mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur The Netherlands	Piroxicam Cf 20 mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ολλανδία	Centrafarm Services B.V. Postbus 289 4870 Ag Etten Leur The Netherlands	Piroxicam Disper Cf 20 mg	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Sandoz B.V Veluwezoon 22 1327 Ah Almere The Netherlands	Piroxicam Sandoz Disper 10 mg	10 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Sandoz B.V Veluwezoon 22 1327 Ah Almere The Netherlands	Piroxicam Sandoz Disper 20 mg	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Sandoz B.V Veluwezoon 22 1327 Ah Almere The Netherlands	Piroxicam Sandoz 20 Mg Zetpil	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ολλανδία	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom	Piroxicam Flx 10 mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Karib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom	Piroxicam Flx 20 mg,	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Katwijk Farma B.V. Postbus 408 2300 Ak Leiden The Netherlands	Piroxicam Katwijk 20 Mg Dispers Δισκίoten	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5	Brexine Bruis	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ολλανδία	4823 Ae Breda The Netherlands Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda The Netherlands	Brexine	20 mg	Πόσιμη σκόνη	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	4823 Ae Breda The Netherlands Nycomed Nederland B.V. Nikkelstraat 5 4823 Ae Breda The Netherlands	Brexine	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem The Netherlands	Piroxicam Disp. 10 PCH	10 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem The Netherlands	Piroxicam Disp. 20 PCH	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem The Netherlands	Piroxicam 10 PCH	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Pharmachemie B.V. Postbus 552 2003 RN Haarlem The Netherlands	Piroxicam 20 PCH	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam The Netherlands	Piroxicam Ratiopharm Dispergeerbaar 20 Mg	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ολλανδία	1500 Gb Zaandam The Netherlands Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam The Netherlands	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	1500 Gb Zaandam The Netherlands Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam The Netherlands	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	1500 Gb Zaandam The Netherlands Ratiopharm Nederland Bv, Postbus 2062 1500 Gb Zaandam The Netherlands	Piroxicam Ratiopharm 20 Mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	2800 Bd Gouda The Netherlands Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda The Netherlands	Piroxicam Albic 10 Mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	2800 Bd Gouda The Netherlands Sanofi-Synthelabo B.V. Postbus 2043 2800 Bd Gouda The Netherlands	Piroxicam Albic 20 Mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Unit No.7, Σληρόικερ Street M19 2rb Manchester United Kingdom Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park	Piroxicam 10 Mg	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Ολλανδία	Unit No.7, Σληρόικερ Street M19 2rb Manchester United Kingdom Wise Pharmaceuticals Ltd. Hamwells Business Park	Piroxicam 20 Mg	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Νορβηγία	Pfizer PO Box 3 N-1324 Lysaker Norway	Felden	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norway	Brexidol	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Nycomed Pharma As P.O. Box 205, N-1372 Asker 0010 Oslo Norway	Brexidol	20 mg	Πόσιμη σκόνη σε φακελάκι	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Alpharma P.O. Box 158 Skøyen N-0212 Oslo Norway	Pirox	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Νορβηγία	Merck NM P.O.Box 23033 S-10435 Stockholm Sweden	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 10	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Apotex Europe Ltd. Rowan House 41 London Street Reading, Berkshire, Rg1 4ps	Apo-Piroxicam 20	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Pfizer Europe MA EEIG Sandwich Kent Ct13 9nj	Feldene	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πολωνία	United Kingdom Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Poland	Piroxicam 10	10 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Πολωνία	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Poland	Piroxicam 20	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Πολωνία	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Poland	Piroxicam	50 mg/g	Αλοιφή	Δερματική χρήση
Πολωνία	Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A Grunwaldzka St. 189 60-322, Poznań Poland	Piroxicam	50 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση
Πολωνία	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Poland	Piroxicam Jelfa	10 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. Wincentego St. Pola 21 58-500, Jelenia Góra Poland	Piroxicam Jelfa	20 mg	Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest Hungary	Hotemin	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest	Hotemin	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πολωνία	Hungary Egis Pharmaceuticals Ltd. Kereszturi Ut 30-38 H-1106, Budapest	Hotemin	20 mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Πολωνία	Hungary Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa	Flamexin	20 mg	Σκόνη για Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Πολωνία	Poland Torrex Chiesi Polska Sp. z o.o. ul. Biala 3 00-895 Warszawa	Flamexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πολωνία	Poland Boehringer Ingelheim International Gmbh Binger Str 173 55216, InΓέληheim Am Rhein	Finalgel Sport	5 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση
Πολωνία	Germany Sankyo Pharma Gmbh MünchenZielstattstr. 48 81379, München	Mobilat P Gel	5 mg/g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Portugal Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa	Brexin	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Portugal Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa	Brexin	20 mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Portugal Neo-Farmacêutica, Lda. Av. D. João Ii	Brexin	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πορτογαλία	Lote 1.02.2.1 D - 2º 1990-090 Lisboa Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Feldene	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Feldene	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Feldene	5 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Feldene	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Pfizer, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal	Feldene	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Πορτογαλία	A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães Nº 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πορτογαλία	Portugal A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Portugal A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	5 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Portugal A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. Quinta Da Fonte Edifício D. Manuel I - Piso 2 Rua Dos Malhães N° 1 2770-071 Paço De Arcos	Flexar	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Πορτογαλία	Portugal A. Menarini Portugal - Farmacêutica, S.A. Rua General Ferreira Martins, 8 - 7º Miraflores 1495-137 Algés	Flexar	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Portugal Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora	Flogocan 10	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Portugal Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Estrada Nacional 117-2 Edifícios Azevedos - Alfragide 2724-503 Amadora	Flogocan 20	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Portugal Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda.	Piroxicam Ratiopharm 10 Mg	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πορτογαλία	Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugal Ratiopharm - Comércio E Indústria De Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Quinta Do Pinheiro - Edifício Tejo - 6º Piso 2790-143 Carnaxide Portugal	Comprimidos Piroxicam Ratiopharm 20 Mg Comprimidos	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	10 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	10 mg/g	Κρέμα	Δερματική χρήση
Πορτογαλία	Biosaúde - Produtos Farmacêuticos, Lda Av. José Malhoa - Edifício Malhoa Plaza Nº 2, Piso-Escritório 2.2 1070-325 Lisboa Portugal	Remisil	5 mg/g	Γέλη	Δερματική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	20 mg/1 ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Πορτογαλία	Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A. Rua Do Padrão, 98 3000-312 Coimbra Portugal	Roxazin	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua Manuel Ribeiro De Pavia, 1 - 1º - Venda Nova 2700-547 Amadora Portugal	Reumoxican S.A.	20 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Πορτογαλία	Cinfa Portugal, Lda. Av. Tomás Ribeiro, 43 - Bloco 2, 3º F - Edifício Neopark 2790-221 Carnaxide Portugal	Piroxicam Cinfa 20 Mg Comprimidos Dispersíveis	20 mg	Διασπειρόμενο Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Bruschettini S.R.L. Via Isonzo 6 16147 Genova Italy	Bruxicam 0,5%	0.50%	Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα	Οφθαλμική χρήση
Ρουμανία	Egis Pharmaceuticals Plc Kereszturi Ut 30-38 H-1106 Budapest Hungary	Hotemin	20mg/Μl - 1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή
Ρουμανία	Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT 13 9 NJ	FELDENE 20mg/Μl	20mg/Μl - 1ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ρουμανία	United Kingdom Boehringer InΓέληheim Pharma Gmbh & Co.Kg, Binger Strasse 173 D-55216 InΓέληheim Am Rhein Germany	FinalGel	5mg/G	Γέλη	Δερματική
Ρουμανία	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin	20mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Chiesi Farmaceutici Spa, Via Palermo, 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin	20mg	Σκόνη για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Romania	Piroxsal gel 0,5g%	0,5g%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ρουμανία	S.C. Meduman S.A. Aleea Eroilor Nr.28 Viseu De Sus Jud. Maramures Romania	N-Piroxicam 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Romania	Piroxicam	3%	Κρέμα	Τοπική χρήση
Ρουμανία	S.C. Laropharm S.R.L. Sos. Alexandriei 145a	Piroxicam	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ρουμανία	Comuna Bragadiru Jud. Ilfov Romania S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi	Piroxicam	0.50%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi	Piroxicam 20mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest	Piroxicam 20mg	20mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Sintofarm S.A. Str. Ziduri Intre Vii Nr.22 Sector 2, Bucurest	Piroxicam 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr.124 Cluj-Napoca Jud. Cluj	Piroxicam	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Fabiol S.A. B-UI Timisoara Nr.50 Sector 6, Bucuresti	Piroxicam	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Romania S.C. Ac Helcor S.R.L. Str. Victor Babes Nr.50 Baia Mare, Jud Maramures Romania	Piroxicam 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ρουμανία	S.C. Arena Group S.A. Str. Stefan Mihaileanu Nr.31 Etaj 1, Ap. 1 Sector 2, Bucuresti Romania	Piroxicam 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Antibiotice S.A. Str. Valea Lupului Nr.1 Iasi Romania	Piroxicam 40mg	40mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Ρουμανία	S.C. Labormed-Pharma S.A. Splaiul Independentei Nr. 319e Sector 6, Bucuresti Romania	Piroxicam LPH 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Romania	Piroxicam Mk Crema	3%	Κρέμα	Δερματική χρήση
Ρουμανία	S.C. Mark Pharmaceuticals S.R.L. Str Moara De Foc Nr. 35 Iasi, Jud Iasi Romania	Piroxicam MkGel	1%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ρουμανία	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Romania	Piroxsal	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	S.C. Slavia Pharm S.R.L. Str. Stirbei Voda Nr. 53-55 Sector 1, Bucuresti Romania	Piroxsal Γέλη 0,5g%	0,5g%	Γέλη	Δερματική χρήση
Ρουμανία	Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road	Piroxicam 1%	1%	Γέλη	Δερματική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Ρουμανία	Knightsbridge, SW3 1ES London United Kingdom Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London United Kingdom	Piroxicam 20mg	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Ρουμανία	Ozone Laboratories Ltd. 38 Princes Court 88 Brompton Road Knightsbridge, SW3 1ES London United Kingdom	Piroxicam 3% Brexidol	3% 20 mg	Κρέμα Δισκίο	Δερματική χρήση Από στόματος χρήση
Σουηδία	Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Sweden	Brexidol	20 mg	Σκόνη για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Σουηδία	Nycomed Ab Box 27264 Se-102 53 Stockholm Sweden	Piroxicam Merck Nm	10 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σουηδία	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Sweden	Piroxicam Merck Nm	20 mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Σουηδία	Merck Nm Ab Box 23033 Se-104 35 Stockholm Sweden	Flamexin 20 Mg	20 mg	Κοκκία	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy				

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Σλοβακία	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo 26/A 43100 Parma Italy	Flamexin 20 Mg	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	1x50 g/0,5 g	Δερματική κρέμα	Τοπική χρήση
Σλοβακία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin	10 mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Egis Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri U. 30-38 1106 Budapest Hungary	Hotemin 20mg	20 mg	Ενέσιμο διάλυμα	Παρεντερική χρήση
Σλοβακία	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Czech Republic	Pro-Roxikam 10 Mg	10 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Σλοβακία	Pro.Med.Cs Praha A.S. Telčská 114000 Praha 4 Czech Republic	Pro-Roxikam 20 Mg	20 mg	Δισκία	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovenia	Erazon	20 mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Σλοβενία	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovenia	Erazon	10 mg/1 g	Κρέμα	Δερματική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Σλοβενία	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovenia	Erazon	10 mg/1 g	Γέλη	Δερματική χρήση
Σλοβενία	Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Šmarješka Cesta 6 Si-8501 Novo Mesto Slovenia	Erazon	20 mg	Υπόθετο	Ορθική χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-0n-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Capsules 10 Mg	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-0n-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene 20 (20mg Capsules)	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-0n-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Dispersable Tablets 10mg	10mg	Δισκίο για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-0n-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Dispersible Tablets-20 Mg	20mg	Δισκίο για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-0n-The-Hill Surrey KT20 7NS	Feldene Gel 0.5% W/W	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αγγλία	United Kingdom Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Intramuscular Injection 20mg/MI	20mg/ml	Ενέσιμο διάλυμα	Ενδομυϊκή χρήση
Αγγλία	Pfizer Limited Walton Oaks, Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene Melt 20mg Tablets	20mg	Δισκίο για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns United Kingdom	Piroxicam Capsules 10mg	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Actavis Uk Limited Whiddon Vally Barnstaple Devon Ex32 8ns United Kingdom	Piroxicam Capsules 20mg	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Kentene,Piroflam, Piroflex	10mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Clonmel Healthcare Limited Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Kentene,Piroflam, Piroflex	20mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon	Piroxicam 10 Mg Capsules	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αγγλία	Hampshire Gu35 9qe United Kingdom Sandoz Limited Unit 37, Woolmer Way Bordon Hampshire Gu35 9qe United Kingdom	Piroxicam 20 Mg Capsules	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ United Kingdom	Piroxicam 10mg Capsules Bp	10mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pharmvit Limited Unit 13, Metropolitan Centre Derby Road, Greenford Middlesex UB6 8UJ United Kingdom	Piroxicam 20mg Capsules Bp	20mg	Καψάκιο, σκληρό	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG United Kingdom	Piroxicam Capsules 10mg	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG United Kingdom	Piroxicam Capsules 20mg	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG United Kingdom	Piroxicam Dispersible Tablets 10mg	10mg	Δισκίο για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Generics Uk Limited Albany Gate, Darkes Lane, Potters Bar Herts EN6 1AG	Piroxicam Dispersible Tablets 20mg	20mg	Δισκίο για πόσιμο διάλυμα	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αγγλία	United Kingdom Waymade Plc Sovereign House Miles Gray Road Basildon, Essex SS14 3FR United Kingdom	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF United Kingdom	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Neolab Limited 57 High Street Odiham, Hampshire RG29 1LF United Kingdom	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Dr Reddy's Laboratories (Uk) Limited 6 Riverview Road Beverley, E Yorks HU17 0LD United Kingdom	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY United Kingdom	Brexidol 20mg Tablets	20mg	Δισκίο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Trinity-Chiesi Pharmaceuticals Limited Cheadlw Royal Business Park Highfield, Cheadle SK8 3GY United Kingdom	Brexidol 20 Mg Effervescent Tablets	20mg	Αναβράζον Δισκίο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pliva Pharma Limited Vision House, Bedford Road Petersfield, Hampsire GU32 3QB United Kingdom	Piroxicam 0.5% Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon	Pirozip 10	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αγγλία	St. Neots, Cambs PE19 3ET United Kingdom Tillomed Laboratories Limited 3 Howard Road, Eaton Socon St. Neots, Cambs PE19 3ET United Kingdom	Pirozip 20	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Manx Healthcare Taylor Group House Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA United Kingdom	Piroxicam Gel 0.5%W/W	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht The Netherlands	Flamatrol 10mg Capsules	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Teva Pharma Bv Industrieweg 23 Po Box 217 3640 Ae Mijdrecht The Netherlands	Flamatrol 20mg Capsules	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Pfizer Consumer Healthcare Walton Oaks Dorking Road Walton-On-The-Hill Surrey KT20 7NS United Kingdom	Feldene P Gel	0.5% w/w	Γέλη	Δερματική χρήση
Αγγλία	Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units Polhampton Lane Overton, Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Piroxicam Capsules Bp 10mg	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

<u>Κράτος Μέλος</u>	<u>Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας</u>	<u>Επινοηθείσα Ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα α</u>	<u>Φαρμακοτεχνική Μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>
Αγγλία	Crescent Pharma Limited Units 3&4, Quidhampton Business Units Polhampton Lane Overton, Hampshire RG25 3ED United Kingdom	Piroxicam Capsules Bp 20mg	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ United Kingdom	Piroxicam 10mg Capsules	10mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση
Αγγλία	Strides Arcolab International Limited 201 Jersey Road Isleworth, Middx TW7 4QJ United Kingdom	Piroxicam 20mg Capsules	20mg	Καψάκιο	Από στόματος χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ**

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ (βλ. Παράρτημα Ι)

Η πιροξικάμη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) με αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Η πιροξικάμη έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η CHMP προέβη σε επανεξέταση των δεδομένων για την ασφάλεια των μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2005, χωρίς να προκύψουν καινούργιες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της ομάδας των ΜΣΑΦ εν γένει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης η επιτροπή εξέδωσε συστάσεις για αλλαγές στις πληροφορίες του προϊόντος, ή τα αλλιώς λεγόμενα «ουσιώδη στοιχεία» τα οποία αντικατοπτρίζουν μια κοινή θέση σχετικά με τα γνωστά ζητήματα ασφαλείας στις πληροφορίες προϊόντος των μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ. Τα εν λόγω ουσιώδη στοιχεία δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΜΕΑ (αριθ. εγγρ. αναφ.: ΕΜΕΑ/CHMP/343456/2005).

Εντούτοις διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης της σχέσης οφέλους/κινδύνου ορισμένων μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, περιλαμβανομένης της πιροξικάμης. Η επανεξέταση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2006 και κατέδειξε ότι περιορισμένα μόνο επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα από αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου συνιστούσαν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου γαστρεντερικών και δερματικών αντιδράσεων (περιλαμβανομένων αντιδράσεων απειλητικών για τη ζωή) σε σύγκριση με άλλα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ. Η CHMP έκρινε ότι η αξιολόγηση έθεσε ανησυχίες για τη σχέση οφέλους/κινδύνου της πιροξικάμης και ενημέρωσε σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, η CHMP διατύπωσε συστάσεις για τη συμπερίληψη αλλαγών, ή των λεγόμενων «ουσιωδών στοιχείων», στις πληροφορίες προϊόντος της πιροξικάμης, καθώς και ορισμένων άλλων μη εκλεκτικών ΜΣΑΦ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΜΕΑ τον Σεπτέμβριο του 2006 (αριθ. εγγρ. αναφ.: ΕΜΕΑ/CHMP/381615/2006).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η διεξαγωγή μιας καινούργιας αξιολόγησης της σχέσης οφέλους/κινδύνου της πιροξικάμης αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση, η οποία παραλήφθηκε από τον ΕΜΕΑ στις 2 Αυγούστου 2006, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου 2006 κινήθηκε διαδικασία παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την CHMP να διατυπώσει γνώμη σχετικά με το εάν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν πιροξικάμη πρέπει να διατηρηθούν, να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να ανακληθούν.

Η CHMP εξέτασε τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών, των επιδημιολογικών μελετών και των αναφορών αυθόρμητων ανεπιθύμητων ενεργειών που υποβλήθηκαν από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας.

Στις 21 Ιουνίου 2007, η CHMP αποφάσισε ότι οι επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα συστημικά σκευάσματα της πιροξικάμης σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής γαστρεντερικής τοξικότητας σε σχέση με άλλα ΜΣΑΦ καθώς και με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών δερματικών αντιδράσεων σε σύγκριση με άλλα ΜΣΑΦ που δεν περιέχουν οξικάμες. Για το λόγο αυτό, η επιτροπή διατύπωσε μια σειρά συστάσεων οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια και στηρίζονται σε προηγούμενα ουσιώδη στοιχεία για την πιροξικάμη, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2006 και πρέπει να περιληφθούν στις πληροφορίες του προϊόντος.

Σε ό,τι αφορά τα τοπικά σκευάσματα πιροξικάμης, η CHMP συμφώνησε ότι δεν απαιτούνται περιορισμοί. Η χρήση τοπικών ΜΣΑΦ συνοδεύεται από εμφανώς μειωμένη συστημική έκθεση σε σύγκριση με τη συστημική δόσολογία και κατ' επέκταση το ποσοστό των συστημικών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναμένεται με τη χρήση τοπικών σκευασμάτων είναι μικρότερο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συστάσεις που διατυπώνονται στη συνέχεια ισχύουν μόνο για συστημικά σκευάσματα πιροξικάμης:

- η πιροξικάμη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία οξέων καταστάσεων λόγω του παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής διάρκειας 50 ωρών και του προφίλ ασφάλειας, καθώς υπάρχουν εξίσου αποτελεσματικές αλλά και ασφαλέστερες θεραπείες,
- τα οφέλη της πιροξικάμης υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν στη συμπτωματική ανακούφιση της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας,
- η πιροξικάμη δεν αποτελεί πλέον επιλογή πρώτης γραμμής σε περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η χορήγηση ΜΣΑΦ,
- η συνταγογράφηση της πιροξικάμης πρέπει να γίνεται από ιατρούς έμπειρους στη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας,
- στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος έχουν προστεθεί καινούργιες αντενδείξεις και ενισχυμένες προειδοποιήσεις, προκειμένου η έκθεση στην πιροξικάμη να περιοριστεί σε ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου γαστρεντερικών και δερματικών αντιδράσεων,
- τα επιπρόσθετα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου περιλαμβάνουν τη μείωση της δόσης της πιροξικάμης σε 20 mg ημερησίως και συστάσεις σχετικά με τη βραχύτερη δυνατή θεραπεία των ασθενών για την ανακούφιση συμπτωμάτων, με επανεξέταση των ασθενών εντός 14 ημερών. Η χορήγηση θεραπείας συνδυασμού με γαστροπροστατευτικούς παράγοντες (όπως για παράδειγμα μισοπροστόλη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων) πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για όλους τους ασθενείς και ειδικότερα για τους ηλικιωμένους.

Η CHMP συμφώνησε ότι οι συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 726/2004 (ΕΚ) οι οποίες εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2006 και δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΜΕΑ (αριθ. εγγρ. αναφ. ΕΜΕΑ/413136/2006) παραμένουν σε ισχύ για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν πιροξικάμη. Η επανεξέταση κατέληξε στο ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας κατά τι αυξημένος απόλυτος κίνδυνος θρομβωτικών επεισοδίων που σχετίζονται με μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ, παρά το γεγονός ότι η συνολική σχέση οφέλους/κινδύνου παραμένει θετική.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εκτιμώντας ότι,

- η CHMP εξέτασε την παραπομπή που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν πιροξικάμη,
- λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων δεδομένων, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος γαστρεντερικών και σοβαρών δερματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με τα συστηματικά σκευάσματα πιροξικάμης σε σύγκριση με άλλα ΜΣΑΦ,
- η CHMP έκρινε ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου για τα συστηματικά σκευάσματα πιροξικάμης είναι θετική στη θεραπεία της συμπτωματικής ανακούφισης της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Ωστόσο, η CHMP εκτιμά ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου της πιροξικάμης για τη θεραπεία οξέων καταστάσεων είναι αρνητική και ότι οι σχετικές ενδείξεις πρέπει να ανακληθούν. Στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης έχει προστεθεί μια σειρά περιορισμών για τη χρήση, ενισχυμένες προειδοποιήσεις και αντενδείξεις σχετικά με την ασφάλεια του γαστρεντερικού συστήματος και του δέρματος,
- η CHMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν συστηματικά σκευάσματα πιροξικάμης είναι θετική για τις εγκεκριμένες ενδείξεις,

- η CHMP συμφώνησε ότι δεν απαιτούνται περιορισμοί σχετικά με τα τοπικά σκευάσματα πιροξικάμης και ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου παραμένει θετική,

κατά συνέπεια, η CHMP εισηγήθηκε τη διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα I της γνώμης και την τροποποίηση των σχετικών ενοτήτων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης των συστημικών σκευασμάτων πιροξικάμης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα III της γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/EK, όπως τροποποιήθηκε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Το παρόν τμήμα του SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος) αποτελούσε παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το παραπεμπτικό σύμφωνα με το Άρθρο 31. Το κείμενο ήταν τότε έγκυρο.

Το παρόν τμήμα του Φυλλαδίου Οδηγιών αποτελούσε παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το παραπεμπτικό σύμφωνα με το Άρθρο 31. Το κείμενο ήταν τότε έγκυρο.

Μετά την Απόφαση της Επιτροπής, οι Αρμόδιες Αρχές του Κράτους Μέλους θα ενημερώσουν τις πληροφορίες του προϊόντος όπως απαιτείται. Ως εκ τούτου, η παρούσα διατύπωση πιθανά να μην αντανακλά το τρέχον κείμενο.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Οι ενδείξεις σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα θα πρέπει να διατυπωθούν ως εξής:

Η πιροξικάμη ενδείκνυται για τη συμπτωματική ανακούφιση της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Λόγω του προφίλ ασφαλείας της (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.3 και 4.4), η πιροξικάμη δεν αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής σε περίπτωση που ενδείκνυται ΜΣΑΦ.

Η απόφαση για τη συνταγογράφηση της πιροξικάμης θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των συνολικών κινδύνων για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4).

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να διαγραφούν από αυτή την παράγραφο:

Οξεία ουρική αρθρίτιδα

Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια

Μετεγχειρητικό άλγος

Οδοντιατρικές θεραπείες και κατά την διάρκεια λοιμώξεων

Ανακούφιση του πυρετού και του πόνου που σχετίζεται με οξεία φλεγμονή της ανώτερης αναπνευστικής οδού

Οξείες μυοσκελετικές διαταραχές (π.χ. θυλακίτιδα, τενοντίτιδα)

Οξείες μετατραυματικές διαταραχές

Άλγος ρίζας νωτιαίου νεύρου

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η δοσολογία που σχετίζεται με τις ενδείξεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.1, θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

Η συνταγογράφηση της πιροξικάμης θα πρέπει να αρχίζει από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με φλεγμονώδεις ή εκφυλιστικές ρευματικές νόσους.

Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 20 mg.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να ελαχιστοποιηθούν με τη χρήση της χαμηλότερης αποτελεσματικής δόσης για τη μικρότερη διάρκεια, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Το όφελος και η ανοχή στη θεραπεία θα πρέπει να εκτιμώνται μέσα σε 14 ημέρες. Εάν η συνέχιση της θεραπείας θεωρείται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται συχνή επανεκτίμηση.

Δεδομένου ότι η πιροξικάμη έχει δειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο γαστρεντερικών επιπλοκών, η πιθανή ανάγκη για συνδυασμένη θεραπεία με γαστροπροστατευτικούς παράγοντες (π.χ. μισοπροστόλη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων) θα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά, ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Η δοσολογία που σχετίζεται με τις ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να διαγραφεί από αυτή την παράγραφο, σε συμφωνία με την παράγραφο 4.1:

Οξεία ουρική αρθρίτιδα

Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια

Μετεγχειρητικό άλγος

Μετά από οδοντιατρικές θεραπείες και κατά την διάρκεια λοιμώξεων

Ανακούφιση του πυρετού και του πόνου που σχετίζεται με οξεία φλεγμονή της ανώτερης αναπνευστικής οδού

Οξείες μυοσκελετικές διαταραχές (π.χ. θυλακίτιδα, τενοντίτιδα)

Οξείες μετατραυματικές διαταραχές
Άλγος ρίζας νωτιαίου νεύρου

4.3 Αντενδείξεις

- Ιστορικό γαστρεντερικού έλκους, αιμορραγίας ή διάτρησης
- Ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών οι οποίες προδιαθέτουν σε αιμορραγικές διαταραχές, όπως η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, ο καρκίνος του γαστρεντερικού ή η εκκολπωματίτιδα
- Ασθενείς με ενεργό πεπτικό έλκος, φλεγμονώδη γαστρεντερική διαταραχή ή γαστρεντερική αιμορραγία
- Ταυτόχρονη χρήση άλλων ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών για την COX-2 ΜΣΑΦ και του ακετυλοσαλικυλικού οξέος σε αναλγητικές δόσεις
- Ταυτόχρονη χρήση αντιπηκτικών
- Ιστορικό προηγούμενης σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης οποιουδήποτε τύπου, ειδικά δερματικές αντιδράσεις όπως το πολύμορφο ερύθημα, το σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική επιδερμική νεκρόλυση
- Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία, προηγούμενη δερματική αντίδραση (ανεξαρτήτως σοβαρότητας) στην πιροξικάμη, σε άλλα ΜΣΑΦ και σε άλλα φάρμακα.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη χρήση της χαμηλότερης αποτελεσματικής δόσης για τη μικρότερη διάρκεια, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Το κλινικό όφελος και η ανοχή θα πρέπει να επανεκτιμώνται περιοδικά και η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται άμεσα στην πρώτη εμφάνιση δερματικών αντιδράσεων ή σχετικών γαστρεντερικών συμβαμάτων.

Επιδράσεις στο γαστρεντερικό (GI), Κίνδυνος γαστρεντερικού έλκους, Αιμορραγίας και Διάτρησης.

Τα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένης της πιροξικάμης, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά γαστρεντερικά συμβλήματα τα οποία περιλαμβάνουν αιμορραγία, έλκος και διάτρηση του στομάχου, του λεπτού και του παχέος εντέρου που μπορεί να είναι θανατηφόρα. Αυτές οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα, σε ασθενείς υπό θεραπεία με ΜΣΑΦ.

Η βραχείας και μακράς διάρκειας έκθεση στα ΜΣΑΦ έχουν αμφότερες αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών γαστρεντερικών συμβαμάτων. Στοιχεία από μελέτες παρατήρησης υποδηλώνουν ότι η πιροξικάμη μπορεί να σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο σοβαρής γαστρεντερικής τοξικότητας σε σχέση με τα άλλα ΜΣΑΦ.

Ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρά συμβλήματα από το γαστρεντερικό θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με πιροξικάμη μόνο ύστερα από προσεκτική εκτίμηση (βλέπε παραγράφους 4.3 και παρακάτω).

Η ενδεχόμενη ανάγκη για συνδυασμένη θεραπεία με γαστροπροστατευτικούς παράγοντες (π.χ. μισοπροστόλη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων) θα πρέπει να εκτιμάται με προσοχή (βλέπε παράγραφο 4.2).

Σοβαρές Γαστρεντερικές Επιπλοκές

Ταυτοποίηση ατόμων υψηλού κινδύνου

Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών από το γαστρεντερικό αυξάνει με την ηλικία. Ηλικία άνω των 70 ετών σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Η χορήγηση σε ασθενείς μεγαλύτερους των 80 ετών θα πρέπει να αποφεύγεται.

Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα κορτικοστεροειδή από το στόμα, εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες όπως χαμηλή δόση ακετυλοσαλικυλικού οξέος, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών γαστρεντερικών

επιπλοκών (βλέπε παρακάτω και παράγραφο 4.5). Όπως και με άλλα ΜΣΑΦ, η χρήση της πιροξικάμης σε συνδυασμό με προστατευτικούς παράγοντες (π.χ. μισοπροστόλη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων), θα πρέπει να εκτιμάται σε αυτούς τους υψηλού κινδύνου ασθενείς

Οι ασθενείς και οι ιατροί θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση σημείων και συμπτωμάτων γαστρεντερικού έλκους και/ή αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας με πιροξικάμη. Θα πρέπει να ζητείται από τους ασθενείς να αναφέρουν οποιοδήποτε νέο ή ασύνηθες κοιλιακό σύμπτωμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εάν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υπάρχει υποψία μίας γαστρεντερικής επιπλοκής, η πιροξικάμη θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπρόσθετης κλινικής αξιολόγησης και θεραπείας.

Δερματικές αντιδράσεις

Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, μερικές από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο, που περιλαμβάνουν αποφολιδωτική δερματίτιδα, σύνδρομο Steven-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια σε σχέση με τη χρήση των ΜΣΑΦ (βλέπε παράγραφο 4.8). Στοιχεία από μελέτες παρατήρησης υποδεικνύουν ότι η πιροξικάμη μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση σοβαρών δερματικών αντιδράσεων σε σχέση με άλλα ΜΣΑΦ τα οποία δεν είναι οξικάμες. Φαίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση τέτοιων αντιδράσεων στην αρχή της θεραπείας με την έναρξη της αντίδρασης να λαμβάνει χώρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μέσα στον πρώτο μήνα θεραπείας. Η χορήγηση της πιροξικάμης πρέπει να διακόπτεται με την πρώτη εμφάνιση δερματικού εξανθήματος, βλάβης του βλεννογόνου ή οποιουδήποτε άλλου σημείου υπερευαισθησίας.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Όπως και με άλλα ΜΣΑΦ, η χρήση της πιροξικάμης μαζί με ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή η ταυτόχρονη χρήση με άλλα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων άλλων φαρμακοτεχνικών μορφών της πιροξικάμης, πρέπει να αποφεύγεται καθώς τα δεδομένα δεν είναι επαρκή προκειμένου ναδειχθεί ότι τέτοιοι συνδυασμοί οδηγούν σε μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με αυτή που επιτυγχάνεται με την πιροξικάμη μόνη της. Επιπλέον, η πιθανότητα για ανεπιθύμητες ενέργειες ενισχύεται (βλέπε παράγραφο 4.4). Μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η ταυτόχρονη χρήση της πιροξικάμης και του ακετυλοσαλικυλικού οξέος μειώνει τη συγκέντρωση της πιροξικάμης στο πλάσμα περίπου στο 80 % της συνήθους τιμής.

Κορτικοστεροειδή: αυξημένος κίνδυνος γαστρεντερικού έλκους ή αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.4).

Αντιπηκτικά: Τα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένης της πιροξικάμης, μπορεί να ενισχύσουν τις δράσεις των αντιπηκτικών, όπως η βαρφαρίνη. Επομένως, η χρήση της πιροξικάμης ταυτόχρονα με αντιπηκτικά όπως η βαρφαρίνη θα πρέπει να αποφεύγεται (βλέπε παράγραφο 4.3).

Αντισταθμιστικοί παράγοντες και εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs): αυξημένος κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας (βλέπε παράγραφο 4.4).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: Πληροφορίες για το χρήστη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ [FELDENE] ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Πριν σας συνταγογραφήσει πιροξικάμη ο γιατρός σας θα εκτιμήσει τα οφέλη που αυτό το φάρμακο μπορεί να σας δώσει σε σχέση με τον κίνδυνο για εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να σας συστήσει γενικές ιατρικές εξετάσεις και θα σας πει πόσο συχνά πρέπει να διεξάγεται έλεγχος λόγω της λήψης πιροξικάμης.

Η πιροξικάμη [Feldene] χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει συμπτώματα που προκαλούνται από την οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων), τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ρευματισμοί της σπονδυλικής στήλης) όπως οίδημα (πρήξιμο), δυσκαμψία και αρθραλγία. Δεν θεραπεύει την αρθρίτιδα και θα σας βοηθήσει μόνο για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να τη λαμβάνετε.

Ο γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει πιροξικάμη μόνο εάν δεν έχετε ικανοποιητική ανακούφιση των συμπτωμάτων από άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ:

- Εάν είχατε προηγούμενα έλκος του στομάχου ή του εντέρου, αιμορραγία ή διάτρηση.
- Εάν έχετε τώρα έλκος του στομάχου ή του εντέρου, αιμορραγία ή διάτρηση.
- Εάν έχετε ή είχατε ιστορικό γαστρεντερικών διαταραχών (φλεγμονή του στομάχου ή των εντέρων), το οποίο προδιαθέτει για αιμορραγικές διαταραχές όπως η ελκώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn, ο καρκίνος του γαστρεντερικού, η εκκολπωματίτιδα (φλεγμαίνοντες ή μολυσμένοι θύλακες του παχέος εντέρου).
- Εάν λαμβάνετε άλλα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών για την COX-2 ΜΣΑΦ και ακετυλοσαλικυλικό οξύ, μία ουσία η οποία είναι παρούσα σε πολλά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση του πόνου και την ελάττωση του πυρετού.
- Εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη, προκειμένου να παρεμποδισθεί η δημιουργία θρόμβων στο αίμα.
- Εάν προηγουμένως είχατε μία σοβαρή αλλεργική αντίδραση στην πιροξικάμη, σε άλλα ΜΣΑΦ και άλλα φάρμακα, ιδίως σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (ανεξαρτήτως σοβαρότητας), όπως αποφολιδωτική δερματίτιδα (έντονη ερυθρότητα του δέρματος με ξεφλούδισμα με μορφή λεπιών ή στιβάδων), φυσαλιδώδεις-πομφολυγώδεις αντιδράσεις (σύνδρομο Stevens-Johnson, μία κατάσταση με ερυθρό, φυσαλιδώδες, διαβρωμένο, αιμορραγικό ή εσχαροποιημένο δέρμα) και τοξική επιδερμική νεκρόλυση (μία νόσος που εμφανίζει φυσαλιδοποίηση και ξεφλούδισμα της επιφανειακής στιβάδας του δέρματος).

Εάν κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει για εσάς, δε θα πρέπει να σας δοθεί πιροξικάμη.
Ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ

Προσέξτε ιδιαίτερα με το Feldene: πάντα να ενημερώνετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Feldene. Όπως όλα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, έτσι και το Feldene μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στο στομάχι και το έντερο, όπως πόνο, αιμορραγία, έλκος και διάτρηση.

Θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να λαμβάνετε πιροξικάμη και να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχετε πόνο στο στομάχι ή οποιοδήποτε σημείο αιμορραγίας από το στομάχι ή το έντερο, όπως μέλαινες ή αιματηρές κενώσεις ή αιματέμεση.

Θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να λαμβάνετε πιροξικάμη και να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν έχετε οποιοδήποτε αλλεργική αντίδραση, όπως εξάνθημα του δέρματος, οίδημα (πρήξιμο) του προσώπου, συριγμό ή δυσκολία στην αναπνοή.

Εάν είστε άνω των 70 ετών, ο γιατρός σας ίσως χρειασθεί να μειώσει στο ελάχιστο τη διάρκεια της θεραπείας και να σας βλέπει συχνότερα όσο λαμβάνετε πιροξικάμη.

Εάν είστε άνω των 70 ετών ή εάν λαμβάνετε άλλα φάρμακα όπως κορτικοστεροειδή ή κάποια φάρμακα για την κατάθλιψη τα οποία καλούνται εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) ή ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) για την παρεμπόδιση της θρόμβωσης του αίματος, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει μαζί με το Feldene ένα φάρμακο για την προστασία του στομάχου και του εντέρου.

Δε θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο εάν είστε άνω των 80 ετών.

Εάν έχετε ή είχατε οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα ή κάποια αλλεργία ή εάν δεν είστε σίγουροι για το εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιροξικάμη, ενημερώστε το γιατρό σας πριν λάβετε αυτό το φάρμακο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το γιατρό σας για οποιαδήποτε άλλα φάρμακα λαμβάνετε, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που λαμβάνετε χωρίς ιατρική συνταγή.

ΛΗΨΗ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Παρακαλείστε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα (την τελευταία εβδομάδα) άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Τα φάρμακα κάποιες φορές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο γιατρός σας μπορεί να περιορίσει τη χρήση της πιροξικάμης ή άλλων φαρμάκων ή μπορεί να χρειασθεί να λάβετε ένα διαφορετικό φάρμακο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρετε:

- εάν λαμβάνετε ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα για την ανακούφιση του πόνου
- εάν λαμβάνετε κορτικοστεροειδή, τα οποία είναι φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία πλήθους καταστάσεων, όπως οι αλλεργίες και οι ορμονικές διαταραχές
- εάν λαμβάνετε αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη για την παρεμπόδιση εμφάνισης θρόμβων του αίματος
- εάν λαμβάνετε συγκεκριμένα φάρμακα για την κατάθλιψη τα οποία καλούνται εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI)
- εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε φάρμακα, όπως ακετυλοσαλικυλικό οξύ, για την παρεμπόδιση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων
-

Εάν λαμβάνετε κάποιο από τα παραπάνω φάρμακα, ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΡΟΞΙΚΑΜΗ

Πάντοτε να παίρνετε την πιροξικάμη αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Ο γιατρός σας θα σας δώσει τακτικές γενικές ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνετε τη βέλτιστη δόση πιροξικάμης. Ο γιατρός σας θα προσαρμόσει τη θεραπεία σας, δίνοντάς σας τη χαμηλότερη δόση που απαιτείται για τον έλεγχο των συμπτωμάτων σας. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αλλάξετε τη δόση χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.

Ενήλικες και ηλικιωμένοι:

Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 20 mg πιροξικάμης, ως μία εφάπαξ δόση.

Εάν είστε μεγαλύτερος των 70 ετών, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει χαμηλότερη ημερήσια δόση και να μειώσει τη διάρκεια της θεραπείας.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει την πιροξικάμη με άλλα φάρμακα, προκειμένου να προστατεύσει το στομάχι και το έντερο από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μην αυξάνετε τη δόση

Εάν αισθάνεσθε ότι το φάρμακο δεν είναι πολύ αποτελεσματικό, να ενημερώνετε πάντα το γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε πιροξικάμη:

Πάρτε τη δόση αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση σας, μη λάβετε τη δόση που παραλείψατε αλλά συνεχίστε κανονικά με την επόμενη. **Μη διπλασιάζετε τη δόση.**

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό σας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Σε όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας οι οποίοι συνταγογραφούν πιροξικάμη σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές πρέπει να αποσταλεί άμεση κοινοποίηση (DHPC). Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να ενημερώνει τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σχετικά με τις γαστρεντερικές και δερματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με την πιροξικάμη και πρέπει να εναρμονίζεται με την εγκεκριμένη από την CHMP άμεση κοινοποίηση.