

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/17/1240/001	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	1 siringa preriempita in un blister + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/002	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	2 siringhe preriempite, ciascuna in un blister, + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/003	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	4 siringhe preriempite, ciascuna in un blister, + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/004	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	6 siringhe preriempite, ciascuna in un blister, + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/005	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	1 penna preriempita in un blister + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/006	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	2 penne preriempite, ciascuna in un blister, + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/007	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	4 penne preriempite, ciascuna in un blister + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/17/1240/008	Cyltezo	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	6 penne preriempite, ciascuna in un blister + 6 tamponi imbevuti di alcool