

<u>Numer UE</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Docelowe gatunki zwierząt</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>	<u>Okres karencji</u>
EU/2/11/128/001	Emdocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podanie podskórne lub dożylnie Świnie: podanie domięśniowe Konie: podanie dożylnie	Fiolka (ze szkła)	50 ml	1 fiolka	Bydło: tkanki jadalne: 15 dni mleko: 5 dni Świnie i konie: tkanki jadalne: 5 dni
EU/2/11/128/002	Emdocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podanie podskórne lub dożylnie Świnie: podanie domięśniowe Konie: podanie dożylnie	Fiolka (ze szkła)	100 ml	1 fiolka	Bydło: tkanki jadalne: 15 dni mleko: 5 dni Świnie i konie: tkanki jadalne: 5 dni
EU/2/11/128/003	Emdocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Bydło: podanie podskórne lub dożylnie Świnie: podanie domięśniowe Konie: podanie dożylnie	Fiolka (ze szkła)	250 ml	1 fiolka	Bydło: tkanki jadalne: 15 dni mleko: 5 dni Świnie i konie: tkanki jadalne: 5 dni