

<u>Αριθμός διαδικασίας στον ΕΜΑ</u> <u>ΕΥ Αριθμός Έγκρισης</u>	<u>(Επινοηθείσα) ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Στοιχειώδης Συσκευασία</u>	<u>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</u>	<u>Συσκευασία</u>
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/001	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Φιαλίδιο (γυαλί)	0,5 ml	10 φιαλίδια
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/002	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/003	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/004	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα + 1 βελόνα
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/005	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες + 10 βελόνες
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/006	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	1 προγεμισμένη σύριγγα + 2 βελόνες
ΕΜΕΑ/Η/С/002702/007	Hexacima	--1	Ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	Προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί)	0,5 ml	10 προγεμισμένες σύριγγες + 20 βελόνες

--1 Μία δόση¹ (0,5 mL) περιέχει:

Διφθεριτική ανατοξίνη

όχι λιγότερο από 20 IU (30 Lf)

Τετανική ανατοξίνη

όχι λιγότερο από 40 IU (10 Lf)

Αντιγόνα *Bordetella pertussis*

Τοξοειδές του κοκκύτη

25 μικρογραμμάρια

Νηματοειδής αιματοσυγκολλητίνη

25 μικρογραμμάρια

Ιό πολιομυελίτιδας (αδρανοποιημένο)

Τύπου 1 (Mahoney)

29 μονάδες D-αντιγόνου

Τύπου 2 (MEF-1)

7 μονάδες D-αντιγόνου

Τύπου 3 (Saukett)

26 μονάδες D-αντιγόνου

Αντιγόνο επιφανείας Ηπατίτιδας Β

10 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίδιο *Αιμόφιλου ινφλουέντζας* τύπου β

12 μικρογραμμάρια

(Φωσφορική Πολυριβοσυλριβιτόλη)

συζευγμένο σε πρωτεΐνη τετάνου

22-36 μικρογραμμάρια

¹ Προσροφημένο σε ένυδρο υδροξείδιο αργιλίου (0,6 mg Al³⁺)