Numéro AMM UE	**Nom de fantaisie**	**Dosage**	**Forme pharmaceutique**	**Voie d'administration**	**Conditionnement primaire**	**Contenu (Concentration)**	**Présentation**
EU/1/13/828/001	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0,5 ml	10 flacons
EU/1/13/828/002	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie
EU/1/13/828/003	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies
EU/1/13/828/004	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 1 aiguille
EU/1/13/828/005	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 10 aiguilles
EU/1/13/828/006	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 2 aiguilles
EU/1/13/828/007	Hexacima	--[1]	Suspension pour injection	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 20 aiguilles

--[1] Une dose[1] (0,5 mL) contient:

Anatoxine diphtérique	pas moins de 20 UI (30 Lf)
Anatoxine téténique	pas moins de 40 UI (10 Lf)
Antigènes de *Bordetella pertussis*	
Anatoxine pertussique	25 microgrammes
Hémaglutinine filamenteuse	25 microgrammes
Virus poliomyélitique (Inactivaté)	
Type 1 (Mahoney)	29 Unités d'antigène D
Type 2 (MEF-1)	7 Unités d'antigène D
Type 3 (Saukett)	26 Unités d'antigène D
Antigène de surface de l'hépatite B	10 microgrammes
Polyoside d'*Haemophilus influenzae* type b (Phosphate de Polyribosy Ribitol) conjugué à la protéine tétanique	12 microgrammes 22-36 microgrammes

[1] Adsorbée sur hydroxide d'aluminium hydraté (0,6 mg Al^{3+})