

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome di fantasia</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Dimensione della confezione</u>
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0,5 ml	10 flaconcini
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	1 siringa preriempita + 1 ago separato
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	10 siringhe preriempite + 10 aghi separati
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	1 siringa preriempita + 2 aghi separati
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 ml	10 siringhe preriempite + 20 aghi separati

--1 Una dose¹ (0,5 mL) contiene:

Tossoide difterico	non meno di 20 UI (30 Lf)
Tossoide tetanico	non meno di 40 UI (10 Lf)
Antigeni della <i>Bordetella pertussis</i>	
Tossoide pertossico	25 microgrammi
Emoagglutinina filamentosa	25 microgrammi
Poliovirus (inattivato)	
Tipo 1 (Mahoney)	29 unità di antigene D
Tipo 2 (MEF-1)	7 unità di antigene D
Tipo 3 (Saukett)	26 unità di antigene D
Antigeni di superficie dell'epatite B	10 microgrammi
Polisaccaride dell' <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b (poliribosilribitol fosfato) coniugato alla proteina del tetano	12 microgrammi
	22-36 microgrammi

¹ Adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (0,6 mg Al³⁺)

