

<u>Numer Pozwoleń EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość (steżenie)</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/13/828/001	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	fiolka (ze szkła)	0.5 ml	10 fiolek
EU/1/13/828/002	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułko-strzykawka
EU/1/13/828/003	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk
EU/1/13/828/004	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułko-strzykawka + 1 igła
EU/1/13/828/005	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk + 10 igieł
EU/1/13/828/006	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	1 ampułko-strzykawka + 2 igły
EU/1/13/828/007	Hexacima	--1	Zawiesina do wstrzykiwań	Podanie domięśniowe	ampułko-strzykawka (ze szkła)	0.5 ml	10 ampułko-strzykawk + 20 igieł

--1 Jedna dawka¹ (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy	nie mniej niż 20 j.m. (30 Lf)
Toksoid tężcowy	nie mniej niż 40 j.m. (10 Lf)
Antygeny <i>Bordetella pertussis</i>	
Toksoid krztuścowy	25 mikrogramów
Hemaglutynina włókienkowa	25 mikrogramów
Wirus poliomyelitis (inaktywowany)	
Typ 1 (Mahoney)	29 jednostek antygeny D
Typ 2 (MEF-1)	7 jednostek antygeny D
Typ 3 (Saukett)	26 jednostki antygeny D
Antygen powierzchniowy wirusa wzw B	10 mikrogramów
Polisacharyd <i>Haemophilus influenzae</i> typ b (fosforan polirybozylorybitolu) skoniugowany z białkiem tężcowym	12 mikrogramów
	22-36 mikrogramów

¹ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,6 mg Al³⁺)