

<u>Número (UE) da AIM</u>	<u>Nome (de fantasia)</u>	<u>Dosagem</u>	<u>Forma farmacêutica</u>	<u>Via de administração</u>	<u>Acondicionamento Primário</u>	<u>Conteúdo (Concentração)</u>	<u>Dimensão da embalagem</u>
EU/1/13/828/001	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Frasco para injetáveis (vidro)	0,5 ml	10 frascos para injetáveis
EU/1/13/828/002	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia
EU/1/13/828/003	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias
EU/1/13/828/004	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia + 1 agulha
EU/1/13/828/005	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias + 10 agulhas
EU/1/13/828/006	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	1 seringa pré-cheia + 2 agulhas
EU/1/13/828/007	Hexacima	-- ¹	Suspensão injetável	Via intramuscular	Seringa pré-cheia (vidro)	0,5 ml	10 seringas pré-cheias + 20 agulhas

-- ¹	Uma dose ¹ (0,5 ml) contém:						
	Anatoxina diftérica			não inferior a 20 UI (30 Lf)			
	Anatoxina tetânica			não inferior a 40 UI (10 Lf)			
	Antigénios de <i>Bordetella pertussis</i>						
	Anatoxina da tosse convulsa			25 microgramas			
	Hemaglutinina filamentosa			25 microgramas			
	Poliovírus (inativado)						
	Tipo 1 (Mahoney)			29 unidades do antigénio D			
	Tipo 2 (MEF-1)			7 unidades do antigénio D			
	Tipo 3 (Saukett)			26 unidades do antigénio D			
	Antigénio de superfície da hepatite B			10 microgramas			
	Polissacárido de <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (fosfato de poliribosilribitol) conjugado com proteína tetânica			12 microgramas			
				22-36 microgramas			

¹ Adsorvida em hidróxido de alumínio, hidratado (0,6 mg de Al³⁺)