

Παράρτημα Α

Αριθμός ΕΥ	Επινοηθείσα ονομασία	Περιεκτικότητα	Φαρμακοτεχνική μορφή	Είδος στόχος	Οδός χορήγησης	Συσκευασία	Περιεχόμενο	Μέγεθος συσκευασίας	Χρόνος αναμονής
ΕΥ/2/10/114/00 1	Hiprabovis IBR Marker Live	-- ¹	Λυοφιλοποιημένο και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα.	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση	Λυοφιλοποιημένο: φιάλη (Τύπου I γυάλινη), Διαλύτης: φιάλη (Τύπου I γυάλινη ή PET)	Λυοφιλοποιημένο: 5 δόσεων, Διαλύτης: 10 ml	Λυοφιλοποιημένο: 1 φιάλη, Διαλύτης: 1 φιάλη	Μηδέν ημέρες
ΕΥ/2/10/114/00 2	Hiprabovis IBR Marker Live	-- ¹	Λυοφιλοποιημένο και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα.	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση	Λυοφιλοποιημένο: φιάλη (Τύπου I γυάλινη), Διαλύτης: φιάλη (Τύπου II γυάλινη ή PET)	Λυοφιλοποιημένο: 25 δόσεων, Διαλύτης: 50 ml	Λυοφιλοποιημένο: 1 φιάλη, Διαλύτης: 1 φιάλη	Μηδέν ημέρες
ΕΥ/2/10/114/00 3	Hiprabovis IBR Marker Live	-- ¹	Λυοφιλοποιημένο και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα.	Βοοειδή	Ενδομυϊκή χρήση	Λυοφιλοποιημένο: φιάλη (Τύπου I γυάλινη), Διαλύτης: φιάλη (Τύπου II γυάλινη ή PET)	Λυοφιλοποιημένο: 30 δόσεων, Διαλύτης: 60 ml	Λυοφιλοποιημένο: 1 φιάλη Διαλύτης: 1 φιάλη	Μηδέν ημέρες

--¹ Ζωντανός Βόειος Ερπητοϊός τύπου 1 (BoHV-1), με gE⁻ tk⁻ διπλή γονιδιακή εξάλειψη, στέλεχος CEDDEL: 10^{6.3} – 10^{7.3} CCID₅₀ (2 ml)
(gE⁻: εξάλειψη γλυκοπρωτεΐνης E, tk⁻: εξάλειψη θυμιδινικής κινάσης, CCID: κυτταροκαλλιέργειας μολυσματική δόση)