

## Bilaga A

EU:s godkännandenummer	Fantasinamn	Styrka	Läkemedelsform	Djurslag	Administreringsätt	Förpackning	Innehåll	Förpackningsstorlek	Karenstid
EU/2/10/114/001	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.	Nötkreatur	Intramuskulär användning	Frystorkat pulver: flaska (typ I-glas); spädningsvätska: flaska (typ I-glas ali PET)	Frystorkat pulver: 5 doser; spädningsvätska: 10 ml	Frystorkat pulver 1 flaska; spädningsvätska: 1 flaska	Noll dagar
EU/2/10/114/002	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.	Nötkreatur	Intramuskulär användning	Frystorkat pulver: flaska (typ I-glas); spädningsvätska: flaska (typ II-glas ali PET)	Frystorkat pulver: 25 doser; spädningsvätska: 50 ml	Frystorkat pulver 1 flaska; spädningsvätska: 1 flaska	Noll dagar
EU/2/10/114/003	Hiprabovis IBR Marker Live	-- <sup>1</sup>	Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.	Nötkreatur	Intramuskulär användning	Frystorkat pulver: flaska (typ I-glas); spädningsvätska: flaska (typ II-glas ali PET)	Frystorkat pulver: 30 doser; spädningsvätska: 60 ml	Frystorkat pulver 1 flaska Spädningsvätska: 1 flaska	Noll dagar

--<sup>1</sup> Levande gE<sup>-</sup> tk<sup>-</sup> Bovint Herpesvirus typ 1 (BHV-1) med dubbel gendeletion, av stammen CEDDEL:  $10^{6.3} - 10^{7.3}$  CCID<sub>50</sub> (2 ml)  
(gE<sup>-</sup>:glykoprotein E deletion; tk<sup>-</sup>: thymidine kinase deletion; CCID: cellkultur infektiös dos)