

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/17/1216/001	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/002	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/003	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/004	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	6 siringhe preriempite + 6 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/005	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/006	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti d'alcool
EU/1/17/1216/007	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti d'alcool

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/17/1216/008	Imraldi	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0,8 mL (40 mg/0,8 mL)	6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti d'alcool