

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/20/258/001	Increxxa	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, ovins	Voie sous-cutanée (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	20 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours; porcins: 13 jours; ovins: 16 jours;
EU/2/20/258/002	Increxxa	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, ovins	Voie sous-cutanée (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours; porcins: 13 jours; ovins: 16 jours;
EU/2/20/258/003	Increxxa	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, ovins	Voie sous-cutanée (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours; porcins: 13 jours; ovins: 16 jours;
EU/2/20/258/004	Increxxa	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, ovins	Voie sous-cutanée (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours; porcins: 13 jours; ovins: 16 jours;
EU/2/20/258/005	Increxxa	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins,	Voie sous-cutanée	Flacon (verre)	500 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours;
EU/2/20/258/006	Increxxa	25 mg/ml	Solution injectable	Porcins	voie intramusculaire	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: porcins: 13 jours;
EU/2/20/258/007	Increxxa	25 mg/ml	Solution injectable	Porcins	voie intramusculaire	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: porcins: 13 jours;
EU/2/20/258/008	Increxxa	25 mg/ml	Solution injectable	Porcins	voie intramusculaire	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: porcins: 13 jours;