

Процедурен номер	Търговско наименование На ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Перорална суспензия	Кучета	перорално приложение	Бутилка (HDPE) спринцовка (PP)	15 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Перорална суспензия	Кучета	перорално приложение	Бутилка (PET) спринцовка (PP)	42 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Перорална суспензия	Кучета	перорално приложение	Бутилка (PET) спринцовка (PP)	100 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Перорална суспензия	Кучета	перорално приложение	Бутилка (PET) спринцовка (PP)	200 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, коне и свине	Подкожно, интравенозно и интрамускулно приложение	флакон (стъкло)	20 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда) Мляко: 5 дни (говеда). Месо и вътрешни органи 5 дни. (Коне:) Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)

EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, коне и свине	Подкожно, интравенозно и интрамускулно приложение	флакон (стъкло)	50 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда) Мляко: 5 дни (говеда). Месо и вътрешни органи 5 дни. (Коне:) Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, коне и свине	Подкожно, интравенозно и интрамускулно приложение	флакон (стъкло)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда) Мляко: 5 дни (говеда). Месо и вътрешни органи 5 дни. (Коне:) Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)
EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, коне и свине	Подкожно, интравенозно и интрамускулно приложение	флакон (стъкло)	250 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда) Мляко: 5 дни (говеда). Месо и вътрешни органи 5 дни. (Коне:) Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)

EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Перорална суспензия	Коне	перорално приложение	Бутилка (HDPE) спринцовка (PP)	100 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EU/2/11/134/010	Inflacam	15 mg/ml	Перорална суспензия	Коне	перорално приложение	Бутилка (HDPE) спринцовка (PP)	250 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	таблети за дъвчене за кучета	Кучета	перорално приложение	блистер (PVC/PVDC)		20 x 1 таблети (Единична доза)	не е приложимо
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	таблети за дъвчене за кучета	Кучета	перорално приложение	блистер (PVC/PVDC)		100 x 1 таблети (Единична доза)	не е приложимо
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	таблети за дъвчене за кучета	Кучета	перорално приложение	блистер (PVC/PVDC)		20 x 1 таблети (Единична доза)	не е приложимо
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	таблети за дъвчене за кучета	Кучета	перорално приложение	блистер (PVC/PVDC)		100 x 1 таблети (Единична доза)	не е приложимо
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета и котки.	Кучета:, интравенозно или Подкожно Котки: Подкожно	флакон (стъкло)	10 ml	1 флакон	не е приложимо
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета и котки	Кучета:, интравенозно или Подкожно Котки: Подкожно	флакон (стъкло)	20 ml	1 флакон	не е приложимо
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	Кучета и котки	Кучета:, интравенозно или Подкожно Котки: Подкожно	флакон (стъкло)	100 ml	1 флакон	не е приложимо

EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда и свине	говеда: интравенозно или Подкожно свине: интрамускулно	флакон (стъкло)	20 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда) Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)
EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда и свине	говеда: интравенозно или Подкожно свине: интрамускулно	флакон (стъкло)	50 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 15 дни. (говеда)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда и свине	говеда: интравенозно или Подкожно свине: интрамускулно	флакон (стъкло)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 5 дни. (Свине)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Гранули в сашета	Коне	Използвайте с храна	сашета (хартия/PE / алуминий/PE)		100 сашета	Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Гранули в сашета	Коне	Използвайте с храна	сашета (хартия/PE / алуминий/PE)		20 сашета	Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Перорална суспензия	котки	перорално приложение	Бутилка (HDPE) спринцовка (PP)	10 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Перорална суспензия	котки	перорално приложение	Бутилка (HDPE) спринцовка (PP)	15 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Перорална суспензия	котки	перорално приложение	Бутилка (PP) спринцовка (PP)	3 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо

EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Перорална суспензия	котки	перорално приложение	Бутилка (PP) спринцовка (PP)	5 ml	1 бутилка + 1 спринцовка	не е приложимо
-----------------	----------	-----------	---------------------	-------	----------------------	---------------------------------	------	--------------------------	----------------