

| Número de autorización en la UE | Nombre de fantasía | Concentración | Forma farmacéutica | Especies de destino | Vía de administración | Tipo de envase | Contenido | Formato | Tiempo de espera |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---|----------------|-----------|---------|---|
| EU/2/20/253/001 | Lydaxx | 100 mg/ml | Solution inyectable | Bovino, porcino y ovino | Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino) | Vial (vidrio) | 50 ml | 1 vial | Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días |
| EU/2/20/253/002 | Lydaxx | 100 mg/ml | Solution inyectable | Bovino, porcino y ovino | Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino) | Vial (vidrio) | 100 ml | 1 vial | Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días |
| EU/2/20/253/003 | Lydaxx | 100 mg/ml | Solution inyectable | Bovino, porcino y ovino | Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino) | Vial (vidrio) | 250 ml | 1 vial | Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días |
| EU/2/20/253/004 | Lydaxx | 100 mg/ml | Solution inyectable | Bovino | Uso subcutáneo | Vial (vidrio) | 500 ml | 1 vial | Carne: 22 días; |