

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/20/253/001	Lydaxx	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins Porcins Ovins	Voie sous-cutanée, (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours ; porcins : 13 jours ; ovins : 16 jours
EU/2/20/253/002	Lydaxx	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins Porcins Ovins	Voie sous-cutanée, (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours ; porcins : 13 jours ; ovins : 16 jours
EU/2/20/253/003	Lydaxx	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins Porcins Ovins	Voie sous-cutanée, (bovins), voie intramusculaire (porcins, ovins)	Flacon (verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: bovins: 22 jours ; porcins : 13 jours ; ovins : 16 jours
EU/2/20/253/004	Lydaxx	100 mg/ml	Solution injectable	Bovins	Voie sous-cutanée	Flacon (verre)	500 ml	1 flacon	Viande et abats: 22 jours