

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/20/253/001	Lydaxx	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso sottocutaneo (bovini), uso intramuscolare (suini, ovini)	Flacone (vetro)	50 ml	1 Flacone	Carne e visceri: bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/253/002	Lydaxx	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso sottocutaneo (bovini), uso intramuscolare (suini, ovini)	Flacone (vetro)	100 ml	1 Flacone	Carne e visceri: bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/253/003	Lydaxx	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso sottocutaneo (bovini), uso intramuscolare (suini, ovini)	Flacone (vetro)	250 ml	1 Flacone	Carne e visceri: bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/253/004	Lydaxx	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo	Flacone (vetro)	500 ml	1 Flacone	Carne e visceri: 22 giorni;