

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatás-erősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: injekciós üveg (üveg)	0,5 ml	1 db injekciós üveg + 1 db injekciós üveg
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: injekciós üveg (üveg)	0,5 ml	10 db injekciós üveg + 10 db injekciós üveg
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 db injekciós üveg + 1 db előretöltött fecskendő, tű nélkül
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 db injekciós üveg + 10 db előretöltött fecskendő, tű nélkül
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	20 db injekciós üveg + 20 db előretöltött fecskendő, tű nélkül
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 db injekciós üveg + 1 db előretöltött fecskendő + 1 db tű
EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 db injekciós üveg + 10 db előretöltött fecskendő + 10 db tű
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	20 db injekciós üveg + 20 db előretöltött fecskendő + 20 db tű

EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	1 db injekciós üveg + 1 db előretöltött fecskendő + 2 db tű
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	10 db injekciós üveg + 10 db előretöltött fecskendő + 20 db tű
EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	0,5 ml	20 db injekciós üveg + 20 db előretöltött fecskendő + 40 db tű
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Subcutan vagy intramuscularis alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: injekciós üveg (üveg)	0,5 ml	5 db injekciós üveg + 5 db injekciós üveg

--1 Enders-féle Edmonston törzshöz tartozó morbillivírus¹ (élő, attenuált) ≥ 1x10³ TCID₅₀*
Jerry Lynn™ (B szint) törzshöz tartozó mumpszvírus¹ (élő, attenuált) ≥ 12,5x10³ TCID₅₀*
Wistar RA 27/2 törzshöz tartozó rubeolavírus² (élő, attenuált) ≥ 1x10³ TCID₅₀*

*a szövetkultúra 50%-át megfertőző adag

¹ csirkeembrió sejteken előállítva.

² humán diploid tüdő fibroblast sejteken (WI-38) előállítva