

EU številka	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Ciljna živalska vrsta	Način uporabe zdravila	Ovojnina	Vsebina	Velikost pakiranja	Karenca
EU/2/09/098/001	Melovem	5 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Intramuskularna uporaba Subkutana uporaba	Stekleno vialo tipa I	100 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči)
EU/2/09/098/002	Melovem	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, prašiči in konji	Intramuskularna uporaba Intravenska uporaba Subkutana uporaba	Stekleno vialo tipa I	50 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči, konji) Mleko: 5 dni (goveda)
EU/2/09/098/003	Melovem	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, prašiči in konji	Intramuskularna uporaba Intravenska uporaba Subkutana uporaba	Stekleno vialo tipa I	100 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči, konji) Mleko: 5 dni (goveda)
EU/2/09/098/004	Melovem	20 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda, prašiči in konji	Intramuskularna uporaba Intravenska uporaba Subkutana uporaba	Stekleno vialo tipa I	250 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči, konji) Mleko: 5 dni (goveda)
EU/2/09/098/005	Melovem	30 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Intramuskularna uporaba Subkutana uporaba	stekleno vialo tipa I	50 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči) Mleko: 5 dni (goveda)
EU/2/09/098/006	Melovem	30 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Intramuskularna uporaba Subkutana uporaba	stekleno vialo tipa I	100 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči) Mleko: 5 dni (goveda)
EU/2/09/098/007	Melovem	30 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Goveda in prašiči	Intramuskularna uporaba Subkutana uporaba	stekleno vialo tipa I	250 ml	1 vialo	Meso in organi: 15 dni (goveda), 5 dni (prašiči) Mleko: 5 dni (goveda)