

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/06/070/001	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Suspension buvable	Chiens	Voie orale	Flacon + seringue	10 ml	1 Flacon + 2 seringues	Sans objet
EU/2/06/070/002	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Suspension buvable	Chiens	Voie orale	Flacon + seringue	10 ml	1 Flacon + 2 seringues	Sans objet
EU/2/06/070/003	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Suspension buvable	Chiens	Voie orale	Flacon + seringue	10 ml	1 Flacon + 2 seringues	Sans objet
EU/2/06/070/004	Meloxidyl	5 mg/ml	Solution injectable	Chiens et chats	Voie sous cutanée et intraveineuse	Flacon verre type I	10 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/06/070/005	Meloxidyl	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, chevaux.	Voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse	Flacon (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats : 15 jours (bovins) 5 jours (chevaux, porcins) Lait: 5 jours (bovins)
EU/2/06/070/006	Meloxidyl	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, chevaux.	Voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse	Flacon dans boîte carton	100 ml	1 flacon	Viande et abats : 15 jours (bovins) 5 jours (chevaux, porcins) Lait: 5 jours (bovins)

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/06/070/007	Meloxidyl	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins, chevaux.	Voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse	Flacon dans boîte carton	250 ml	1 flacon	Viande et abats : 15 jours (bovins) 5 jours (chevaux, porcins) Lait: 5 jours (bovins)
EU/2/06/070/008	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Voie orale	Flacon polyéthylène haute densité + seringue doseuse	15 ml	1 flacon + 1 seringue	Sans objet.
EU/2/06/070/010	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Voie orale	Flacon verre + seringue doseuse	5 ml	1 flacon + 1 seringue	Sans objet