

A. melléklet

EU-szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerelési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/11/135/002	Panacur AquaSol	200 mg/ml	Belsőleges szuszpenzió	Sertés és házityúk	Ivóvízbe keverve alkalmazandó	Tartály (HDPE)	1 l	1 tartály	<p><u>Sertés:</u> Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap</p> <p><u>Házityúk:</u> Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap az 1 mg fenbendazol/ttkg adag esetében; 9 nap a 2 mg fenbendazol/ttkg adag esetében</p> <p>Tojás: nulla nap</p>
EU/2/11/135/003	Panacur AquaSol	200 mg/ml	Belsőleges szuszpenzió	Sertés és házityúk	Ivóvízbe keverve alkalmazandó	Tartály (HDPE)	4 l	1 tartály	<p><u>Sertés:</u> Hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap</p> <p><u>Házityúk:</u> Hús és egyéb ehető szövetek: 6 nap az 1 mg fenbendazol/ttkg adag esetében; 9 nap a 2 mg fenbendazol/ttkg adag esetében</p> <p>Tojás: nulla nap</p>