

<b>EU Αριθμός Έγκρισης</b>	<b>(Επινοηθείσα) ονομασία</b>	<b>Περιεκτικότητα</b>	<b>Φαρμακοτεχνική μορφή</b>	<b>Οδός χορήγησης</b>	<b>Στοιχειώδης Συσκευασία</b>	<b>Περιεχόμενο (συγκέντρωση)</b>	<b>Συσκευασία</b>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	1 φιαλίδιο + 1 φιαλίδιο
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	10 φιαλίδια + 10 φιαλίδια
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα χωρίς βελόνα
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	10 φιαλίδια + 10 προγεμισμένες σύριγγες χωρίς βελόνα
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	20 φιαλίδια + 20 προγεμισμένες σύριγγες χωρίς βελόνα

EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα + 1 βελόνα
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	10 φιαλίδια + 10 προγεμισμένες σύριγγες + 10 βελόνες
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	1 φιαλίδιο + 1 προγεμισμένη σύριγγα + 2 βελόνες
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	10 φιαλίδια + 10 προγεμισμένες σύριγγες + 20 βελόνες
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	20 φιαλίδια + 20 προγεμισμένες σύριγγες + 20 βελόνες

EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα	Υποδόρια ή ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυαλί Τύπου I), διαλύτης: προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί Τύπου I)	0,5 ml	20 φιαλίδια + 20 προγεμισμένες σύριγγες + 40 βελόνες
-----------------	---------	---	--	----------------------------	---	--------	--

§	<p>Ιό<sup>1</sup> ιλαράς του στελέχους Edmonston του Enders (ζώντα, εξασθενημένο)</p> <p>Ιό<sup>1</sup> παρωτίτιδας του στελέχους Jeryl Lynn™ (Level B) (ζώντα, εξασθενημένο)</p> <p>Ιό<sup>2</sup> ερυθράς του στελέχους Wistar RA 27/3 (ζώντα, εξασθενημένο)</p> <p>Ιό<sup>3</sup> ανεμευλογιάς του στελέχους Oka/Merck (ζώντα, εξασθενημένο)</p>	<p>όχι λιγότερο από 3,00 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub> *</p> <p>όχι λιγότερο από 4,30 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub> *</p> <p>όχι λιγότερο από 3,00 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub> *</p> <p>όχι λιγότερο από 3,99 log<sub>10</sub> PFU**</p>
---	---	---

\* 50% μολυσματικής δόσης ιστοκαλλιέργειας

\*\* μονάδες σχηματισμού πλάκας

(<sup>1</sup>) Παραγόμενος σε κύτταρα εμβρύου όρνιθας.

(<sup>2</sup>) Παραγόμενος σε ανθρώπινους διπλοειδείς πνευμονικούς (WI-38) ινοβλάστες.

(<sup>3</sup>) Παραγόμενος σε ανθρώπινα διπλοειδή (MRC-5) κύτταρα.