

<b><u>Numéro AMM UE</u></b>	<b><u>Nom (de fantaisie)</u></b>	<b><u>Dosage</u></b>	<b><u>Forme pharmaceutique</u></b>	<b><u>Voie d'administration</u></b>	<b><u>Conditionnement primaire</u></b>	<b><u>Contenu (Concentration)</u></b>	<b><u>Présentation</u></b>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : flacon (verre de Type I)	0,5 ml	1 flacon + 1 flacon
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : flacon (verre de Type I)	0,5 ml	10 flacons + 10 flacons
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	1 flacon + 1 seringue pré-remplie sans aiguille jointe
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	10 flacons + 10 seringues pré-remplies sans aiguille jointe
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	20 flacons + 20 seringues pré-remplies sans aiguille jointe
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	1 flacon + 1 seringue pré-remplie + 1 aiguille
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	10 flacons + 10 seringues pré-remplies +10 aiguilles
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	1 flacon + 1 seringue pré-remplie + 2 aiguilles

EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	10 flacons + 10 seringues pré-remplies + 20 aiguilles
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	20 flacons + 20 seringues pré-remplies +20 aiguilles
EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Poudre et solvant pour suspension injectable	voie sous-cutanée ou intramusculaire	poudre : flacon (verre de Type I) solvant : seringue pré-remplie (verre de Type I)	0,5 ml	20 flacons + 20 seringues pré-remplies +40 aiguilles

§ Virus de la rougeole<sup>1</sup> souche Edmonston Enders (vivant, atténué) au minimum 3,00 log<sub>10</sub> DICT<sub>50</sub>\*  
 Virus des oreillons<sup>1</sup> souche Jeryl Lynn<sup>TM</sup> (niveau B) (vivant, atténué) au minimum 4,30 log<sub>10</sub> DICT<sub>50</sub>\*  
 Virus de la rubéole<sup>2</sup> souche Wistar RA 27/3 (vivant, atténué)..... au minimum 3,00 log<sub>10</sub> DICT<sub>50</sub>\*  
 Virus de la varicelle<sup>3</sup> souche Oka/Merck (vivant, atténué)..... au minimum 3,99 log<sub>10</sub> UFP\*\*

\* dose infectant 50 % des cultures tissulaires

\*\* unités formant plages

(<sup>1</sup>) Produit sur cellules d'embryon de poulet

(<sup>2</sup>) Produit sur fibroblastes diploïdes humains pulmonaires (WI-38)

(<sup>3</sup>) Produit sur cellules diploïdes humaines (MRC-5)