

EU-nummer	Særnavn	Styrke	Lægemiddelform	Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til	Indgivelsesvej	Emballage	Indhold	Paknings-tørrelse	Tilbageholdelsestid
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning.	Kvæg, svin og får	Subkutan anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (svin, får)	Hætteglas (glas)	50 ml	1 hætteglas	Slagtning: Kvæg: 22 dage; Svin: 13 dage; Får: 16 dage
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning.	Kvæg, svin og får	Subkutan anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (svin, får)	Hætteglas (glas)	100 ml	1 hætteglas	Slagtning: Kvæg: 22 dage; Svin: 13 dage; Får: 16 dage
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionsvæske, opløsning.	Kvæg, svin og får	Subkutan anvendelse (kvæg), intramuskulær anvendelse (svin, får)	Hætteglas (glas)	250 ml	1 hætteglas	Slagtning: Kvæg: 22 dage; Svin: 13 dage; Får: 16 dage