

EU-Nummern	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungs- größe	Wartezeit
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein und Schaf	Subkutane Anwendung (Rind), Intramuskuläre Anwendung (Schwein und Schaf)	Flasche (Glas)	50 ml	1 Flasche	essbares Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein und Schaf	Subkutane Anwendung (Rind), Intramuskuläre Anwendung (Schwein und Schaf)	Flasche (Glas)	100 ml	1 Flasche	essbares Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein und Schaf	Subkutane Anwendung (Rind), Intramuskuläre Anwendung (Schwein und Schaf)	Flasche (Glas)	250 ml	1 Flasche	essbares Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage