

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/20/263/00 1	Rexxolide	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), Podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szklana)	50 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni
EU/2/20/263/00 2	Rexxolide	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), Podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szklana)	100 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni
EU/2/20/263/00 3	Rexxolide	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), Podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szklana)	250 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni