

Referenčné číslo v EÚ	Obchodný názov	Sila	Lieková forma	Cieľový druh	Spôsob podávania	Balenie	Obsah	Veľkosť balenia	Ochranná lehota
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a ovce	Hovädzí dobytok: subkutánnepodanie Ošípané a ovce: intramuskulárne podanie	Liekovka (sklenená)	50 ml	1 liekovka	Hovädzí dobytok (mäso a vnútornosti): 22 dní. Ošípané (mäso a vnútornosti): 13 dní. Ovce (mäso a vnútornosti): 16 dní
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a ovce	Hovädzí dobytok: subkutánnepodanie Ošípané a ovce: intramuskulárne podanie	Liekovka (sklenená)	100 ml	1 liekovka	Hovädzí dobytok (mäso a vnútornosti): 22 dní. Ošípané (mäso a vnútornosti): 13 dní. Ovce (mäso a vnútornosti): 16 dní
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Injekčný roztok	Hovädzí dobytok, ošípané a ovce	Hovädzí dobytok: subkutánnepodanie Ošípané a ovce: intramuskulárne podanie	Liekovka (sklenená)	250 ml	1 liekovka	Hovädzí dobytok (mäso a vnútornosti): 22 dní. Ošípané (mäso a vnútornosti): 13 dní. Ovce (mäso a vnútornosti): 16 dní